

Paciente: LUIS FERNANDO BETANCUR LONDOÃ'O	
Documento: :70579755	Sexo: :M
Edad: 42 AÃ'O(S)	Fecha: 2016-02-01
Estudio: TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y	
ARTICULACIONES	
Tecnica: CONTRASTADO	Lado: N/A
Extremidad:	
EPS / Aseguradora: EPS DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	
Adicional:	

Tecnica:

TAC DE PIE CONTRASTADO.

TECNICASe realizan cortes axiales del pie con equipo multidetector según protocolo.

posterior a la administración de contraste iodado no iónico intravenoso (Optiray) a través de (conector de baja presión), el cual es bien tolerado por el paciente, observando:

pie izquierdo

densidad ósea normal

aumento de la densidad y grosor de la piel y la grasa y los planos musculares cercanos al tobillo izquierdo. por edema de tejidos blandos Realce de la sinovial en topografía de la articulación tibio astragalina en el cuello del pie descartar sinovitis

morfología de demas estructuras osteoarticulares sin cambios

relaciones articulares conservadas

estructuras vasculares visualizadas sin cambios

]

opinión

aumento de la densidad y grosor de la piel y la grasa y los planos musculares cercanos al tobillo izquierdo. por edema de tejidos blandos Realce de la sinovial en topografía de la articulación tibio astragalina en el cuello del pie descartar sinovitis ONTS

Dr(a).OSCAR HERNANDO TELLEZ SANCHEZ ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA DE TRAUMA Y URGENCIAS Reg. Medico: 684486-00 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA