



Paciente: SANTIAGO DE JESUS GUARIN AGUDELO	
Documento: :3363932	Sexo: :M
Edad: 57 AÑOS	Fecha: 2016-01-30
Estudio: RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ABDOMEN	
Tecnica: CONTRASTADO	Lado: N/A
Extremidad:	
EPS / Aseguradora: Cafesalud EPS	
Adicional:	

INDICACIÓN: Paciente con antecedente de carcinoma de células renales derecho manejo con nefrectomía, ahora en seguimiento.

TÉCNICA: En resonador magnético de 1.5 tesla se realizan adquisiciones en topografía del abdomen superior en los diferentes planos de T1 y T2, secuencias de T1 pre-postgadolinio, secuencias de difusión con mapa de ADC. Se realizan secuencias de colangiografía de corte único y múltiple.

ESTUDIOS PREVIOS: Tomografía de abdomen contrastada fecha 05/08/2013.

HALLAZGOS:

En lo incluido de las bases pulmonares no se observa compromiso del espacio aéreo ni líquido pleural.

El hígado es de forma, tamaño y configuración normal, sus contornos son regulares y bien definidos, su intensidad de señal es homogénea sin observarse lesiones focales sólidas ni quísticas en su parénquima. Se observa marcada caída de la señal en las secuencias de fuera de fase por esteatosis.

La vesícula biliar está distendida, sin engrosamiento de paredes ni lesiones en su luz.

No hay dilatación de la vía biliar intra ni extrahepática.

El páncreas conserva su intensidad de señal normal, con captación adecuada del medio de contraste sin identificarse lesiones focales sólidas ni quísticas ni dilatación del ducto pancreático.

La vena porta y las venas suprahepáticas permeables.

El bazo es de tamaño normal.

Las glándulas suprarrenales sin alteraciones.

El riñón derecho ausente por antecedente quirúrgico sin visualizarse masas en esta topografía.

El riñón izquierdo de tamaño y configuración normal, conserva la diferenciación corticomedular, con adecuada captación del medio de contraste. Se identifican dos lesiones focales una de 9 mm en polo superior y otra de 14 mm en el polo inferior con intensidad similar al líquido en todas las secuencias, sin realce con el medio de contraste, sugieren quistes simples. No hay dilatación de cavidades pieloclectoras.

En el retroperitoneo no se observan masas. Ganglio retrocavo de 7 mm y paraaórticos izquierdos menores de 6 mm, de tipo inespecífico. Se visualiza pequeña imagen nodular localizada anterior a vena cólica media, en probable relación con ganglio de 7 mm de diámetro, sin aumento en tamaño respecto a estudio previo.

Las estructuras vasculares del retroperitoneo permeables.

No hay líquido libre en abdomen.

En las estructuras óseas no se definen lesiones.

CONCLUSION

Cambios posquirúrgicos por nefrectomía derecha sin observarse masas sugestivas de recidiva tumoral.

Quistes renales simples izquierdos.

Esteatosis hepática difusa.

Dr(a).DIANA VICTORIA GOMEZ
ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA - IMAGEN CORPORAL
Reg. Medico: 51481-08
N/A