



Paciente: HERNAN DARIO SALDARRIAGA MORALES	
Documento: :6790572	Sexo: :M
Edad: 61 AÑOS(S)	Fecha: 2016-01-21
Estudio: TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA (CORTES AXIALES Y CORONALES)	
Técnica: SIMPLE	Lado: N/A
Extremidad:	
EPS / Aseguradora: Coomeva EPS S.A.	
Adicional:	

Técnica:

Se realizaron cortes en fase simple milimétricos de los senos paranasales y las imágenes se analizaron mediante reformatos multiplanares.

Plano esfenoidal, foveas etmoidales, regiones selar, supraselar y para celar son normales.

Globos oculares, órbitas, tejidos blandos retrorbitarios y laminas papiráceas son normales.

Hendiduras oftálmicas y agujeros ópticos de manera bilateral son normales

Senos frontal, etmoidal, esfenoidal y maxilar Desarrollados y neumatizados. Imágenes con densidad de tejido blando en el interior del seno frontal derecho, en el interior de las celdillas etmoidales de manera bilateral, en el interior de ambos senos maxilares, de predominio derecho y en el interior del seno esfenoidal derecho en relación con cambios inflamatorios pansinusales sin que se observe compromiso óseo de las paredes de estos senos

Imágenes con densidad de tejido blando que ocupan el interior del ostium de drenaje de ambos senos maxilares, de predominio derecho, en relación con cambios inflamatorios a este nivel. Imágenes con densidad de tejido blando que ocupan el interior del ostium de drenaje del seno frontal y esfenoidal derecho, en relación con cambios inflamatorios a este nivel

Huesos propios nasales y tabique nasal son normales. Atrofia de los cornetes superior, medio e inferior de manera bilateral. Concha bulosa derecha sin patología en su interior

Láminas terigoides son normales.

Espacios masticador y temporal superficial son normales.

Estructuras óseas a nivel de la base del cráneo y forámenes neurovasculares son normales.

Unión craneocervical es normal.

Tracto aéreo digestivo superior es normal.

Estructuras óseas a nivel del esqueleto axial cervical central son normales.

Articulaciones temporomandibulares y arcos cigomáticos son normales.

Mastoides, oídos interno, medio y externo de manera bilateral son normales.

Dr(a).JUAN GONZALO VELEZ RESTREPO
ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA
Reg. Medico: 9915-91
UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA