



Paciente: OMAR DE JESUS CASTAÑO USUGA	
Documento: :84039945	Sexo: :M
Edad: 54 AÑOS(S)	Fecha: 2016-01-27
Estudio: UROTAC	
Técnica: SIMPLE	Lado: N/A
Extremidad:	
EPS / Aseguradora: Coomeva EPS S.A.	
Adicional:	

Técnica:

Se ha efectuado una tomografía computada con cortes axiales simples del abdomen con énfasis en vías urinarias, sin administración de medio de contraste, con reconstrucción 3D, encontrando:

Atelectasias que comprometen segmentos medial del lóbulo medio y lingular inferior

Hígado Presenta quiste subcapsular a nivel de la unión entre los segmentos 7 y 8 del lóbulo derecho, que no condiciona retracción de la cápsula, de paredes delgadas y contornos lobulados, de 17 x 10 mm

vesícula biliar, vía biliar, venas suprahepáticas, porta, hilio hepático, arcada duodenal, páncreas, bazo y glándulas suprarrenales son normales.

Cámara gástrica, asas de intestino delgado y grueso son normales.

Estructuras vasculares retroperitoneales son normales.

No hay adenomegalias retroperitoneales, pélvicas ni obturadoras.

Cálculo en el interior de la luz de la unión entre el segmento proximal y medio del uréter derecho, con densidad calcificada, de 4. 9 x 9. 8 mm, que condiciona dilatación ureteropieloinfundibular y calicial derecha, sin pionefrosis. No hay signos de pielitis ni de periureteritis.

Cálculos con densidad calcificada en el interior de los infundíbulos de los segmentos anterior y posterior del tercio medio del riñón izquierdo, que alcanzan unas medidas de 7. 7 x 4. 6 mm y de 7. 6 x 6. 5 mm. Que no condicionan dilatación del sistema colector adyacente, en relación con nefrolitiasis

riñones tienen tamaño, contornos, posición, forma y densidad normales. Densidad de la grasa perirrenal es normal. No hay colecciones perirrenales

trayecto ureteral izquierdo, uniones ureterovesical derecha y vejiga son normales

Piellectasia renal izquierda sin pionefrosis, pielitis ni peri ureteritis

se observa cálculo enclavado a nivel del segmento intravesical del meato ureterovesical izquierdo, con densidad calcificada, de 4. 4 x 4. 6 mm que no condiciona dilatación del sistema colector ipsilateral

Riñones, sistemas colectores, uniones ureterovesicales y vejiga son normales.

Adecuados planos de clivaje entre las diferentes estructuras pélvicas.

Próstata y vesículas seminales son normales

No hay ascitis.

Pared abdominal es normal.

Incipientes cambios degenerativos del esqueleto axial lumbar distal sin espondilolistesis ni colapsos vertebrales

Dr(a). JUAN GONZALO VELEZ RESTREPO
ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA
Reg. Medico: 9915-91
UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA