



<b>Paciente:</b> MARIA DOLLY MONTOYA GIRALDO	
<b>Documento:</b> :43401115	<b>Sexo:</b> :F
<b>Edad:</b> 55 AÑOS(S)	<b>Fecha:</b> 2016-01-28
<b>Estudio:</b> TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL)	
<b>Técnica:</b> CONTRASTADO	<b>Lado:</b> N/A
<b>Extremidad:</b>	
<b>EPS / Aseguradora:</b> SAVIA SALUD EPS	
<b>Adicional:</b>	

**Técnica:**

**Técnica:**

Utilizando técnica multidetector, se obtuvieron múltiples cortes axiales de abdomen y pelvis, desde las cúpulas diafragmáticas hasta el pubis, después de inyectar con jeringa ( 100 cc Optiray) de medio de contraste iodado no iónico por vía endovenosa a través de (conector de baja presión), guiada por una radiografía digital previa donde se señalan los mismos. Se suministró sustancia de contraste oral ( 50 cc Meglumina via oral- Conray ) a fin de opacificar el tubo digestivo

No cuento con historia clínica, antecedentes personales ni estudios previos para comparar al momento de la lectura

En lo visualizado de ambos hemitórax, de localización intra o extrapulmonar no hay lesiones.

Hígado Presenta quistes simples, De paredes delgadas, a nivel de los segmentos 4 y 6. El del segmento VI presenta contornos lobulados. No presentan patología en su interior. Los quistes tienen densidad de líquido. Captan periféricamente el contraste. Sus paredes son delgadas. No condicionan retracción de la cápsula. El de mayor tamaño a nivel del segmento 6 mide aproximadamente 44 x 52 x 34 mm. Hipodensidad difusa del parénquima hepático en relación con esteatosis hepática. No hay hepatomegalia

vesícula biliar, vía biliar, venas suprahepáticas, porta, hilio hepático, arcada duodenal, páncreas, bazo y glándulas suprarrenales son normales.

Cámara gástrica, asas de intestino delgado y grueso son normales.

Estructuras vasculares retroperitoneales son normales.

No hay adenomegalias retroperitoneales, pélvicas ni obturadoras. Ganglios linfáticos de tamaño y aspecto normales que comprometen la grasa paralela a los vasos ileo ceco apendiculares en relación con adenitis lo más probablemente

Riñones Concentran simétricamente el contraste. Presentan nefrograma simétrico. Tienen tamaño, contornos, posición, forma y densidad normales. Densidad de la grasa perirrenal es normal. No hay colecciones perirrenales

Sistema colector derecho, trayectos ureterales, uniones ureterovesicales y vejiga son normales

Cálculo con densidad calcificada, que no sobrepasa los 5 mm a nivel del cáliz del grupo colector de la unión entre el polo superior y tercio medio del riñón izquierdo, en relación con nefrolitiasis, que no condiciona dilatación del sistema colector adyacente

Adecuados planos de clivaje entre las diferentes estructuras pélvicas.

Histerectomía previa

cúpula vaginal normal. En topografía anexial derecha no se observan lesiones

en topografía anexial izquierda se observa masa compleja, de aspecto sólido, circunscrita, de contornos lobulados, que capta heterogeneamente el contraste, de origen ovárico lo más probablemente, que alcanza unas medidas de aproximadamente 51 x 44 x 66 mm, sin signos de celulitis o ascitis a su alrededor. Para correlacionar con niveles de antígeno Ca. 125 en sangre

flebolitos en pelvis menor de manera bilateral

varices hipogástricas bilaterales no trombosadas

ganglios linfáticos inguinales superficiales bilaterales de tamaño y aspecto normales

No hay ascitis.

Hernia umbilical con contenido graso en su interior

Estructuras óseas sin evidencia de alteraciones.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Velez Restrepo', with a horizontal line underneath.

Dr(a).JUAN GONZALO VELEZ RESTREPO  
ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA  
Reg. Medico: 9915-91  
UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA