



<b>Paciente:</b> JUAN MARTIN BRICEÑO GOMEZ	
<b>Documento:</b> :1021938428	<b>Sexo:</b> :M
<b>Edad:</b> 4 MES(S)	<b>Fecha:</b> 2016-02-02
<b>Estudio:</b> RADIOGRAFIA DE PELVIS CADERA ARTICULACIONES SACRO-ILIACAS Y COXO-FEMORALES	
<b>Técnica:</b> SIMPLE	<b>Lado:</b> N/A
<b>Extremidad:</b>	
<b>EPS / Aseguradora:</b> Coomeva EPS S.A.	
<b>Adicional:</b> COMPARATIVA	

#### RX DE PELVIS AP Y RANA

HALLAZGOS: Mineralización ósea normal. La configuración anatómica del anillo pélvico esta preservada. No se aprecia aun osificación de las epífisis. No hay desplazamiento cefálico de las metáfisis femorales. La toma AP tiene abducción de ambas caderas más notorio el compromiso de la derecha. Los ángulos acetabulares normales con un valor de 24° en el lado derecho y 22° en el izquierdo. No hay desplazamiento de las líneas grasas profundas. En la posición rana no se aprecian alteraciones.

CONCLUSION: No hay criterios radiológicos de luxación de caderas. Las proyecciones fueron tomadas con abducción de las caderas. Por la no osificación de las epífisis femorales se recomienda valoración ecográfica complementaria para descartar cadera luxable.

Dr(a).SOL MARIA VELEZ POSADA  
ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA  
Reg. Medico: 180194  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA