



<b>Paciente:</b> MARIA GRACIELA ECHAVARRIA DURAN	
<b>Documento:</b> :42784992	<b>Sexo:</b> :F
<b>Edad:</b> 46 AÑOS(S)	<b>Fecha:</b> 2016-02-02
<b>Estudio:</b> RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ABDOMEN	
<b>Técnica:</b> CONTRASTADO	<b>Lado:</b> N/A
<b>Extremidad:</b>	
<b>EPS / Aseguradora:</b> Cruzblanca S.A.	
<b>Adicional:</b>	

INDICACIÓN:Dolor.

TECNICA: Con resonador magnetico de 1.5 Teslas y previo consentimiento firmado, se obtienen imágenes multiplanares multisequencia en topografía del abdomen desde la cupula diafragmatica hasta las crestas iliacas, antes y luego de la administración de 15cc de gadolino intravenoso sin complicaciones.

ESTUDIOS PREVIOS: No se dispone de imagenes previas para realizar análisis comparativo.

HALLAZGOS:

El hígado aumentado de tamaño con un diámetro craneocaudal de 24 cm. Se asocia a marcada caída en la intensidad de señal en el espacio fuera de fase por esteatosis hepática difusa severa. No se definen lesiones hepáticas focales.

Artificio por susceptibilidad magnética general por clip en el lecho vesicular. Hay ausencia quirúrgica de la vesícula biliar.

No hay dilatación de la vía biliar intra ni extra hepática. No se observa compresiones extrínsecas o imágenes de defecto que sugieran cálculos evidentes por resonancia.

Páncreas de tamaño e intensidad normal sin definirse lesiones expansivas, alteraciones en la grasa peripancreatica ni dilatación del ducto pancreático principal.

El bazo de tamaño e intensidad de señal normal sin lesiones focales.

Glándulas adrenales sin alteraciones.

Riñones de tamaño, posición e intensidad de señal normal sin dilatación del sistema pielocalicial. No presentan lesiones Focales.

Aorta de calibre normal.

Lo visualizado de la porta y venas hepaticas sin alteraciones.

No se observan adenopatías retroperitoneales ni liquido libre en cavidad abdominal.

No se definen signos de obstrucción intestinal.

Diástasis de los rectos abdominales en mesogastrio y de predominio en hipogastrio asociado a protrusión de grasa mesentérica en este último y discreta protrusión de colon Transverso a la altura del mesogastrio.

CONCLUSION:

Esteatosis hepática severa asociada a hepatomegalia.

Diástasis de los rectos abdominales en mesogastrio y de predominio en hipogastrio asociado a protrusión de grasa mesentérica en este último y discreta protrusión de colon Transverso a la altura del mesogastrio.

Dr(a).DIEGO ALBERTO OSORIO ISAZA  
ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA - IMAGEN CORPORAL  
Reg. Medico: 0514901  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA