



Paciente: JESUS ANTONIO TORO ALZATE	
Documento: :70035890	Sexo: :M
Edad: 64 AÑOS(S)	Fecha: 2016-02-03
Estudio: TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	
Técnica: CONTRASTADO	Lado: N/A
Extremidad:	
EPS / Aseguradora: SAVIA SALUD EPS	
Adicional:	

Indicacion: Cursa con síntomas respiratorios.

Técnica: Se verifica una adecuada función renal y se firma el consentimiento informado. El estudio incluye desde la base del cuello hasta el abdomen superior, administrado por vía endovenosa medio de contraste hidrosoluble yodado no iónico. Se presentan imágenes multiplanares en ventana de mediastino y parénquima pulmonar.

Hallazgos: Se observa una lesión en el lóbulo superior derecho, en el segmento anterior, de mediana densidad, con vasculatura intra lesional, de bordes irregulares con tracción al hilio y cola a la pleura. Mide 35 x 28 x 23 mm. Hay contacto con el bronquio fuente, No hace contacto con estructuras vasculares del mediastino. Se asocia a adenopatías hiliares y mediastinales de 10 a 12 ,mm de diámetro, son de densidad blanda y homogéneas.

También se observan pequeñas adenopatías sobre la topografía de la ventana aortopulmonar.

Hay neumonitis probablemente postobstructiva asociada.

No observan lesiones nodulares en otros topografía del hemitórax derecho ni izquierdo.

Moderados cambios enfisematosos ccon bronquiolectasias posteriores derechas.

Bulas centroacinar y subpleurales.

Escaso derrame pleural posterior derecho.

Cámaras cardíacas y saco pericárdico normal. Arteria pulmonar tiene un diámetro de 26 mm. Es normal. Adecuada opacificacion de las ramas centrales y periféricas.

Aorta de diámetro normal sin lesiones endoluminales. Vasos supraaórticos normales.

Tráquea normal. Esófago sin lesiones.

Lo incluido del cuello sin adenopatías ni lesiones en los vasos de la glándula tiroides.

Lo incluido del abdomen demuestra las glándulas adrenales normales. El hígado demuestra múltiples lesiones focales hipodensas de variado diametro.

Arbol biliar normal. Vena cava y venas hepáticas normales. Eje esplenomesentérico portal normal. Bazo normal.

Los riñones concentran adecuadamente el medio de contraste. Quiste simple de 15 mm en el aspecto posterior y medial del riñón izquierdo.

No observo adenopatías retroperitoneales. Aorta visible normal.

Tejidos blandos normales.

Las estructuras óseas demuestran multiples iamgenes de baja densidad en los cuerpos vertebrales torácicos.

Los diafragmas son laxos en su aspecto posterior permitiendo protrusión de grasa del abdomen al tórax.

Opinion: La lesion descrita en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, es compatible con una neoplasia y se clasifica: por su tamaño, por el contacto con la pleura y el hilio se calcificada T2. Hay adenopatías hiliares y mediastinales se clasifica N2. Las imágenes hepáticas sugieren metástasis M1.

Estadio; IV.

Firma 

Dr(a).JOSE VICTOR DE FEX ROMERO
RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS
Reg. Medico: 000100/84
N/A