Qui ci andranno gli esercizi già fatti

	Fare Gauss per il rango, creare il sistema (prendo le x in comune e le tratto
- C	come libere), isolo le x, sostituisco le x trovate nel vettore X, eseguo $X \cdot v = 0$,
ESELCIZIO 1	isolo una x, sostituisco nuovamente e poi costruisco il vettore prendendo i
	coefficienti
Esercizio 2	

$\sqrt{25} = 5$ $\sqrt{100} = 10$	$\sqrt{225} = 15$	$\sqrt{400} = 20$	$\sqrt{625} = 25$	$\sqrt{900} = 30$
$\sqrt{16} = 4$ $\sqrt{81} = 9$	$\sqrt{196} = 14$	$\sqrt{361} = 19$	$\sqrt{576} = 24$	$\sqrt{841} = 29$
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{64} = 8$	$\sqrt{169} = 13$	$\sqrt{324} = 18$	$\sqrt{529} = 23$	$\sqrt{784} = 28$
$\sqrt{4} = 2$ $\sqrt{49} = 7$	$\sqrt{144} = 12$	$\sqrt{289} = 17$	$\sqrt{484} = 22$	$\sqrt{729} = 27$
$\sqrt{1} = 1$ $\sqrt{36} = 6$	$\sqrt{121} = 11$	$\sqrt{256} = 16$	$\sqrt{441} = 21$	$\sqrt{676} = 26$