


EXERCICES — CHAPITRE 3

- Exercice 1 (★)** – Déterminer, dans chacun des cas,
- 1. l'image de $-2, 0$ et 3 par la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = 3x^2 + 5x + 1$,
 - 2. l'image de $-3, 0$ et 1 par la fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3}{2}\right\}$ par $g(x) = \frac{4x+1}{2x-3}$,
 - 3. l'image de $-1, 0$ et 3 par la fonction h définie sur \mathbb{R} par $h(x) = (2x-5)(3x+1)$.
- Exercice 2 (★★)** – Déterminer, dans chacun des cas et s'ils existent,
- 1. les antécédents de $2, -1$ et 0 par la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = -2x$,
 - 2. les antécédents de $2, -1$ et 0 par la fonction g définie sur \mathbb{R} par $g(x) = 5x + 1$,
 - 3. les antécédents de 2 et 0 par la fonction h définie sur \mathbb{R} par $h(x) = 2x^2 + 1$,
 - 4. les antécédents de $2, -1$ et 0 par la fonction i définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{3}\right\}$ par $i(x) = \frac{2x+1}{3x-2}$,
 - 5. les antécédents de 5 et 1 par la fonction j définie sur \mathbb{R} par $j(x) = x^2 + 5x + 5$.
- Exercice 3 (★)** – Sur la figure ci-dessous, on donne la courbe représentative \mathcal{C}_f d'une fonction f . Déterminer graphiquement (aucune justification n'est demandée),



- 1. l'image de 3 par f ,
- 2. $f(8)$ et $f(0)$,
- 3. l'ordonnée du point de \mathcal{C}_f d'abscisse 5 ,
- 4. les éventuels antécédents de -7 par f ,
- 5. les solutions de l'équation $f(x) = 0$,
- 6. le tableau de signe de $f(x)$,
- 7. le tableau de variation de f ,
- 8. le maximum de f et pour quelle valeur il est atteint,
- 9. les solutions de l'inéquation $f(x) > 5$.

- Exercice 4 (★)** – Étudier la parité de la fonction f dans chacun des cas suivants.
- | | |
|--|--|
| 1. f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = 3x$ | 5. f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ par $f(x) = \frac{3}{x^2 - 4}$ |
| 2. f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^2 + x$ | 6. f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{1}{2-x}$ |
| 3. f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3 - 2x$ | 7. f définie sur \mathbb{R}^* par $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$ |
| 4. f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \sqrt{2x^2 + 3}$ | |

- Exercice 5 (★★)** – Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.
- 1. Étudier la parité de f .
 - 2. On admet que f est décroissante sur $[0, +\infty[$.
En déduire, grâce à la question précédente, le sens de variation de f sur $] -\infty, 0]$.
Dresser alors le tableau de variation de f sur \mathbb{R} .
 - 3. En déduire que pour tout réel x , $0 \leq f(x) \leq 1$.

- Exercice 6 (★)** – Tracer une courbe susceptible de représenter graphiquement la fonction f , dont le tableau de variation est donné ci-dessous.

x	-3	0	2	4
f	3	0	1	-1

- Exercice 7 (★★)** – Soit f une fonction définie sur \mathbb{R}_+ , dont le tableau de variation est donné ci-dessous. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses?

x	0	2	$+\infty$
f	-1	3	

- | | |
|--|--|
| 1. f est croissante sur $[-1, 3]$ | 5. $\forall x \in [0, 2], f(x) \leq 1$ |
| 2. f est décroissante sur $[2, +\infty[$ | 6. $\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) \leq 3$ |
| 3. $f(2) \leq f(3)$ | 7. $\exists x \in \mathbb{R}_+, f(x) < 0$ |
| 4. $f(1) \geq f(2)$ | 8. $\exists x \in \mathbb{R}_+, f(x) = 4$ |

Exercice 8 (★★) – Soit f une fonction définie sur \mathbb{R} . Pour chacune des implications suivantes, dire si celle-ci est vraie ou fausse. Justifier la réponse.

1. Si f est croissante sur $[0, 2]$, alors f est croissante sur $[0, 1]$.
2. Si $f(0) < f(1)$, alors f est croissante sur $[0, 1]$.
3. Si f a un maximum en 1 sur $[0, 1]$, alors f est croissante sur $[0, 1]$.
4. Si f n'est pas croissante sur $[0, 1]$, alors f est décroissante sur $[0, 1]$.

Exercice 9 (★★) – Soit f la fonction définie sur $[-1, 1]$ par $f(x) = \frac{1}{3+2x^3}$.
Montrer que

$$\forall x \in [-1, 1], \quad 0 \leq f(x) \leq 1.$$

Exercice 10 (★★) – Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \frac{2x^2}{1+x^2}$.

Montrer que la fonction f est majorée par 2. En déduire que f est bornée.

Exercice 11 (★★) –

1. Donner le domaine de définition ainsi que l'expression des fonctions $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ et $g \circ g$ pour les fonctions f et g définies ci-dessous.

a) $f(x) = 2x^2 - x$ et $g(x) = 3x + 2$,	c) $f(x) = \sqrt{2x+3}$ et $g(x) = x^2 + 2$.
b) $f(x) = 1 - x^3$ et $g(x) = \frac{1}{x}$,	

2. Donner le domaine de définition des fonctions h suivantes et les mettre sous la forme d'une composée $f \circ g$, où les fonctions f et g sont à définir.


a) $h(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4}$,	b) $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.
-----------------------------------	------------------------------

Exercice 12 (★★★) – Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes.

- | | |
|---|--|
| 1. $a(x) = x^4 - 5x^2 + 2x + 1$ | 8. $h(x) = \sqrt{x^2 - 3x - 18}$ |
| 2. $b(x) = x + \sqrt{x}$ | 9. $j(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{x}$ |
| 3. $c(x) = \frac{16x^2 - 2x + 8}{x^2 + 5x + 6}$ | 10. $k(x) = \sqrt{x+7} + \sqrt{2x^2 - 3x - 9}$ |
| 4. $d(x) = \sqrt{x^2 + 3x - 10}$ | 11. $l(x) = \frac{x^2 + 5x - 7}{\sqrt{2x^2 + 3x - 2}}$ |
| 5. $e(x) = \frac{x+6}{x^2 + 5x + 1}$ | 12. $m(x) = \sqrt{\frac{2-x}{2+x}}$ |
| 6. $f(x) = \sqrt{3x-2}$ | |
| 7. $g(x) = \frac{8x^2 - 5x + 3}{x^2 - 5x + 6}$ | |

Exercice 13 (★★) – Montrer que la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = -3x + 4$ est une bijection de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .

Exercice 14 (★) – Conjecturer, d'après les graphes, si les fonctions suivantes sont bijectives. On précisera bien les ensembles de départ et d'arrivée.



Exercice 15 (★★) – Soit f la fonction $f: \begin{matrix} [1, +\infty[& \rightarrow & [0, +\infty[\\ x & \mapsto & x^2 - 1 \end{matrix}$. f est-elle bijective?