

DEVOIR MAISON 1

Exercice 1 –

1.

$$PQ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

$$QP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

2.

$$\begin{aligned} QAP &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = L. \end{aligned}$$

On a $QAP = L$. Donc, $PLQ = PQAPQ = I_3 A I_3 = A$. Ainsi, on a bien $A = PLQ$.

3. (a) Notons \mathcal{P}_n la proposition : « $A^n = PL^n Q$ ».

Initialisation : Pour $n=0$,

$$A^0 = I \quad \text{et} \quad PL^0 Q = PIQ = PQ = I$$

donc \mathcal{P}_0 est vraie.

Hérédité : Soit n un entier quelconque dans \mathbf{N} . Supposons \mathcal{P}_n vraie et montrons que \mathcal{P}_{n+1} est vraie. On a

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A^n \times A \\ &= PL^n Q \times PLQ \\ &= PL^n ILQ \\ &= PL^{n+1} Q \end{aligned}$$

donc \mathcal{P}_{n+1} est vraie.

Conclusion : D'après le principe de récurrence, la proposition \mathcal{P}_n est vraie pour tout n dans \mathbf{N} , i.e.,

$$A^n = PL^n Q.$$

(b) On a

$$J = L - I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } J^3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O_3.$$

- (c) Pour tout $n \geq 3$, on a $J^n = J^3 \times J^{n-3} = O_3$. Par ailleurs, les matrices I et J commutent donc on peut appliquer la formule du binôme de Newton.

$$\begin{aligned} L^n &= (J + I)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} J^k I^{n-k} \\ &= \binom{n}{0} J^0 I^n + \binom{n}{1} J^1 I^{n-1} + \binom{n}{2} J^2 I^{n-2} \\ &= I + nJ + \frac{n(n-1)}{2} J^2. \end{aligned}$$

(d) On a

$$\begin{aligned} L^n &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{n(n-1)}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2n & 0 \\ 0 & 0 & 2n \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2n(n-1) \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2n & 2n(n-1) \\ 0 & 1 & 2n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(e) Alors

$$\begin{aligned} A^n &= PL^nQ \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2n & 2n(n-1) \\ 0 & 1 & 2n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2n & 2n(n-1) \\ 0 & 1 & 2n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2n(n-1) & 1 & 2n \\ 2n & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4. (a) La suite (u_n) est une suite constante égale à 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$u_n = 1.$$

(b) On a

$$\begin{aligned}
 AX_n &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \\ v_n + 2w_n \\ 2 + w_n \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \\ v_{n+1} \\ w_{n+1} \end{pmatrix} \\
 &= X_{n+1}.
 \end{aligned}$$

(c) Notons \mathcal{P}_n la proposition : « $X_n = A^n X_0$ ».

Initialisation : Pour $n = 0$,

$$A^0 X_0 = I X_0 = X_0$$

donc \mathcal{P}_0 est vraie.

Hérédité : Soit n un entier quelconque dans \mathbf{N} . Supposons \mathcal{P}_n vraie et montrons que \mathcal{P}_{n+1} est vraie. On a

$$\begin{aligned}
 X_{n+1} &= AX_n \\
 &= A \times A^n X_0 \\
 &= A^{n+1} X_0
 \end{aligned}$$

donc \mathcal{P}_{n+1} est vraie.

Conclusion : D'après le principe de récurrence, la proposition \mathcal{P}_n est vraie pour tout n dans \mathbf{N} , i.e.,

$$X_n = A^n X_0.$$

(d) On a

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} 1 \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix} &= X_n = A^n X_0 \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2n(n-1) & 1 & 2n \\ 2n & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2n(n-1) + 4n \\ 2n + 2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2n(n+1) \\ 2(n+1) \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Exercice 2 –

1. (a) Le dé étant équilibré, tous les tirages sont équiprobables. Ainsi, X suit une loi uniforme sur $\llbracket 1; 6 \rrbracket$.

$$(b) \text{ On a } E(X) = \frac{6+1}{2} = \frac{7}{2} \text{ et } V(X) = \frac{6^2-1}{12} = \frac{35}{12}.$$

2. Pour obtenir 2 fois PILE, il faut lancer la pièce deux fois et donc avoir obtenu un 6 avec le dé. On a donc bien $P(Y = 2) = P([Y = 2] \cap [X = 6])$. Par ailleurs,

$$P([Y = 2] \cap [X = 6]) = P(X = 6) \times P_{[X=6]}(Y = 2) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$$

3. (a) Si l'on a obtenu 1, 2, 3, 4 ou 5 avec le dé, alors on ne lance la pièce qu'une seule fois et donc on a une chance sur deux d'obtenir un PILE et une chance sur deux de n'en obtenir aucun. Ainsi

$$\forall k \in \{1; 2; 3; 4; 5\}, \quad P_{[X=k]}(Y = 0) = \frac{1}{2}$$

- (b) Si on a obtenu un 6 avec le dé, alors on lance la pièce deux fois. Ainsi, on obtient 0 PILE si et seulement si on obtient 2 fois FACE. On a donc

$$P_{[X=6]}(Y = 0) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

D'après la formule des probabilités totales, on a

$$\begin{aligned} P(Y = 0) &= P_{[X=1]}(Y = 0) \times P(X = 1) + P_{[X=2]}(Y = 0) \times P(X = 2) + P_{[X=3]}(Y = 0) \times P(X = 3) \\ &\quad + P_{[X=4]}(Y = 0) \times P(X = 4) + P_{[X=5]}(Y = 0) \times P(X = 5) + P_{[X=6]}(Y = 0) \times P(X = 6) \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{11}{24} \end{aligned}$$

- (c) On a déjà vu que $P(Y = 2) = \frac{1}{24}$ et que $P(Y = 0) = \frac{11}{24}$. Donc

$$P(Y = 1) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 2) = 1 - \frac{1}{24} - \frac{11}{24} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}.$$

Ce que l'on peut résumer par le tableau suivant.

k	0	1	2
$P(Y = k)$	$\frac{11}{24}$	$\frac{12}{24}$	$\frac{1}{24}$

Et on a donc

$$E(Y) = 0 \times \frac{11}{24} + 1 \times \frac{12}{24} + 2 \times \frac{1}{24} = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}.$$

4. (a) On a

	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$	$X = 4$	$X = 5$	$X = 6$
$Y = 0$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$
$Y = 1$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
$Y = 2$	0	0	0	0	0	$\frac{1}{24}$

- (b) Commençons par calculer $E(XY)$.

$$\begin{aligned} E(XY) &= 0 \times 1 \times \frac{1}{12} + 0 \times 2 \times \frac{1}{12} + \dots + 2 \times 6 \times \frac{1}{24} \\ &= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6}{12} \\ &= \frac{27}{12} \end{aligned}$$

On en déduit, d'après la formule de Huygens,


$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{27}{12} - \frac{7}{2} \times \frac{7}{12} = \frac{54}{24} - \frac{49}{24} = \frac{5}{24}.$$

Exercice 3 –

1. Pour tout $x \in]0; +\infty[$, on a

$$g'(x) = 2x - \frac{4}{x} = \frac{2x^2 - 4}{x}.$$

Or, pour $x > 0$, on a $2x^2 - 4 \geq 0 \iff 2x^2 \geq 4 \iff x^2 \geq 2 \iff x \geq \sqrt{2}$. On en déduit le tableau de signe de $g'(x)$, ainsi que le tableau de variation de g .

x	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
x	+		+
$2x^2 - 4$	-	0	+
$g'(x)$	-	0	+
g			

En effet,

$$g(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^2 - 4\ln(\sqrt{2}) = 2 - 2\ln(2) = 2(1 - \ln(2)).$$

D'après le tableau de variation ci-dessus, la fonction g admet bien un minimum en $\sqrt{2}$ égal à $2(1 - \ln(2))$.

2. On a $2(1 - \ln(2)) \simeq 2 \times (1 - 0,7) = 2 \times 0,3 = 0,6 > 0$. Le minimum de g est donc strictement positif donc pour tout x de $]0; +\infty[$, on a $g(x) > 0$.
3. On a

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 + \ln(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \text{par quotient} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \ln(x)}{x} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{4} = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{par somme} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{4} + \frac{1 + \ln(x)}{x} = -\infty. \end{array}$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

La courbe \mathcal{C} admet donc une asymptote verticale en 0.

4. On a :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \ln(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \text{par croissance comparée} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \ln(x)}{x} = 0^+ \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{par somme} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} + \frac{1 + \ln(x)}{x} = +\infty. \end{array}$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

5. On a

$$f(x) - y = \frac{x}{4} + \frac{1 + \ln(x)}{x} - \frac{x}{4} = \frac{1 + \ln(x)}{x}.$$

Et on a vu à la question précédente que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \ln(x)}{x} = 0.$$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - y = 0$ et la droite \mathcal{D} d'équation $y = \frac{x}{4}$ est bien asymptote à la courbe \mathcal{C} .

6. Pour étudier la position relative de \mathcal{C} et \mathcal{D} , il nous faut étudier le signe de $f(x) - y$. On a vu à la question précédente que

$$f(x) - y = \frac{1 + \ln(x)}{x}.$$

On a

$$1 + \ln(x) \geq 0 \iff \ln(x) \geq -1 \iff x \geq e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

On en déduit le tableau de signe suivant.

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
x			
$1 + \ln(x)$	-	0	+
$f(x) - y$	-	0	+

Ainsi,

- sur $]0; \frac{1}{e}]$, \mathcal{C} est en-dessous de \mathcal{D} ,
- sur $[\frac{1}{e}; +\infty[$, \mathcal{C} est au-dessus de \mathcal{D} .

En particulier, la courbe \mathcal{C} et la droite \mathcal{D} se coupent en un point A,

dont l'abscisse est $\frac{1}{e}$ et l'ordonnée est $\frac{1}{4e} = \frac{1}{4e}$.

7. Posons $u(x) = 1 + \ln(x)$ et $v(x) = x$. On a $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$. Ainsi, pour tout $x > 0$, on a

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{4} + \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{\frac{1}{x} \times x - (1 + \ln(x)) \times 1}{x^2} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1 - 1 - \ln(x)}{x^2} \\ &= \frac{1}{4} - \frac{\ln(x)}{x^2} \\ &= \frac{x^2 - 4\ln(x)}{4x^2} \\ &= \frac{g(x)}{4x^2} \end{aligned}$$

Or, on a déjà étudié le signe de g à la question 2. On en déduit le tableau de signe de $f'(x)$ ainsi que le tableau de variations de f .

x	0	$+\infty$
$g(x)$	+	
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$+\infty$

8. (a) Posons $u(x) = x^2 - 4\ln(x)$ et $v(x) = 4x^2$. On a $u'(x) = 2x - \frac{4}{x}$ et $v'(x) = 8x$. On en déduit

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} \\
 &= \frac{\left(2x - \frac{4}{x}\right) \times 4x^2 - (x^2 - 4\ln(x)) \times 8x}{(4x^2)^2} \\
 &= \frac{8x^3 - 16x - 8x^3 + 32x\ln(x)}{16x^4} \\
 &= \frac{32x\ln(x) - 16x}{16x^4} \\
 &= \frac{16x(2\ln(x) - 1)}{16x^4} \\
 &= \frac{2\ln(x) - 1}{x^3}.
 \end{aligned}$$

- (b) On a

$$2\ln(x) - 1 \geq 0 \iff 2\ln(x) \geq 1 \iff \ln(x) \geq \frac{1}{2} \iff x \geq e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}.$$

On en déduit le tableau de signe suivant.

x	0	\sqrt{e}	$+\infty$
x^3	+		+
$2\ln(x) - 1$	-	0	+
$f''(x)$	-	0	+

Ainsi,

- f est concave sur $]0; \sqrt{e}]$.
- f est convexe sur $[\sqrt{e}; +\infty[$.

La courbe \mathcal{C} possède donc un point d'inflexion dont l'abscisse est \sqrt{e} et l'ordonnée $f(\sqrt{e})$.

9. On obtient l'allure de courbe suivante.

