

INTERRO DE COURS 5


Exercice 1 – Une urne contient 3 boules blanches et 4 boules noires. On tire successivement et sans remise 3 boules dans cette urne. On appelle X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues lors du tirage.

1. Déterminer le support de X .

Solution : On a $X(\Omega) = \llbracket 0; 3 \rrbracket$.

2. Déterminer la loi de probabilité de X .

Solution : On peut représenter la situation via l'arbre de probabilité suivant.



Notons B_k et N_k les événements "la k -ième boule tirée est blanche" et "la k -ième boule tirée est noire". D'après la formule des probabilités composées, on a

$$P(X = 0) = P(N_1 \cap N_2 \cap N_3) = P(N_1) \times P_{N_1}(N_2) \times P_{N_1 \cap N_2}(N_3) = \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{35}.$$

D'après la formule des probabilités totales, on a

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= P(N_1 \cap N_2 \cap B_3) + P(N_1 \cap B_2 \cap N_3) + P(B_1 \cap N_2 \cap N_3) \\ &= \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} \times \frac{3}{5} + \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} \times \frac{3}{5} + \frac{3}{7} \times \frac{4}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{35} + \frac{6}{35} + \frac{6}{35} = \frac{18}{35}. \end{aligned}$$

D'après la formule des probabilités totales, on a

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= P(N_1 \cap B_2 \cap B_3) + P(B_1 \cap N_2 \cap B_3) + P(B_1 \cap B_2 \cap N_3) \\ &= \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} \times \frac{2}{5} + \frac{3}{7} \times \frac{4}{6} \times \frac{2}{5} + \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{35} + \frac{4}{35} + \frac{4}{35} = \frac{12}{35}. \end{aligned}$$

Enfin, d'après la formule des probabilités composées, on a

$$P(X = 3) = P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1) \times P_{B_1}(B_2) \times P_{B_1 \cap B_2}(B_3) = \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{35}.$$

Ce que l'on peut résumer par le tableau suivant

| x | 0 | 1 | 2 | 3 |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| $P(X = x)$ | $\frac{4}{35}$ | $\frac{18}{35}$ | $\frac{12}{35}$ | $\frac{1}{35}$ |

3. Déterminer l'espérance de X .

Solution : On a donc

$$E(X) = 0 \times \frac{4}{35} + 1 \times \frac{18}{35} + 2 \times \frac{12}{35} + 3 \times \frac{1}{35} = \frac{45}{35} = \frac{9}{7}.$$

4. Déterminer la variance de X .

Solution : On a

$$E(X^2) = 0^2 \times \frac{4}{35} + 1^2 \times \frac{18}{35} + 2^2 \times \frac{12}{35} + 3^2 \times \frac{1}{35} = \frac{75}{35} = \frac{15}{7}.$$

Donc, d'après la formule de König-Huygens,

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{15}{7} - \left(\frac{9}{7}\right)^2 = \frac{107}{49} - \frac{81}{49} = \frac{26}{49}.$$

Exercice 2 – On lance une pièce équilibrée jusqu'à obtenir PILE. On note X le nombre de lancers nécessaires pour obtenir PILE.

1. Déterminer le support $X(\Omega)$ de X .

Solution : On a $X(\Omega) = \mathbf{N}^*$ (il faut au moins un lancer pour obtenir le premier PILE).

2. Montrer que pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, on a

$$P(X = k) = \frac{1}{2^k}.$$

Solution : On a $[X = k]$ si et seulement si on a obtenu FACE lors des $k - 1$ premiers lancers et PILE lors du k -ième lancer. La pièce étant équilibrée, la probabilité d'obtenir PILE est égale à la probabilité d'obtenir FACE, et vaut $\frac{1}{2}$. Ainsi

$$P(X = k) = \underbrace{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \cdots \times \frac{1}{2}}_{\text{FACE } k-1 \text{ fois}} \times \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{PILE}} = \frac{1}{2^k}.$$

3. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} P(X = n)$ converge et que

$$\sum_{k=1}^{+\infty} P(X = k) = 1.$$

Solution : On vient de voir que pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, on a $P(X = k) = \frac{1}{2^k}$. Calculons la somme partielle $\sum_{k=1}^n P(X = k)$.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n P(X = k) &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k - \frac{1}{2^0} \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k - 1\end{aligned}$$

On reconnaît la somme partielle d'une série géométrique de raison $\frac{1}{2} \in]-1; 1[$ donc la série converge et

$$\sum_{k=1}^{+\infty} P(X = k) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - 1 = 2 - 1 = 1.$$