

# 5 Matrices inversibles

Dans tout ce chapitre, on ne considérera que des matrices carrées.

## I – Matrices inversibles

**Définition 5.1** – Une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$  est dite **inversible** s'il existe une matrice  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$  telle que

$$AB = I_n \quad \text{et} \quad BA = I_n.$$

Si une telle matrice  $B$  existe, elle est appelée inverse de  $A$  et est notée  $A^{-1}$ .

**Remarque 5.2** –

- La notion de matrice inversible n'a de sens **QUE** pour des matrices carrées.
- Une matrice inversible admet un unique inverse.

Supposons qu'il existe deux matrices  $B_1$  et  $B_2$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$  telles que  $AB_1 = B_1A = I_n$  et  $AB_2 = B_2A = I_n$ . Alors, en particulier,  $(B_1A)B_2 = I_nB_2 = B_2$  et  $(B_1A)B_2 = B_1(AB_2) = B_1I_n = B_1$ , et donc  $B_1 = B_2$ .

**Exemple 5.3** –

1. La matrice identité est inversible et  $I_n^{-1} = I_n$ . En effet,

$$I_n I_n = I_n \quad \text{et} \quad I_n I_n = I_n.$$

2. La matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  est inversible et  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ . En effet,

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2,$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

3. La matrice carrée nulle  $O_n$  n'est pas inversible car

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R}), \quad O_n \times M = M \times O_n = O_n \neq I_n.$$

4. La matrice  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$  n'est pas la matrice nulle mais elle n'est pas inversible pour autant.

Quelle que soit la matrice par laquelle on la multiplie à droite, la première ligne du résultat sera constituée de trois zéros et donc la matrice produit ne peut pas être égale à  $I_3$ .

**Théorème 5.4**

Si  $P$  et  $Q$  sont deux matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$  telles que  $PQ = I_n$ , alors  $P$  et  $Q$  sont inversibles et on a

$$P^{-1} = Q \quad \text{et} \quad Q^{-1} = P.$$

**Exemple 5.5 –**

- Considérons les matrices  $P = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$  et  $Q = \begin{pmatrix} -5 & 7 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ .

$$PQ = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 7 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2,$$

ce qui prouve que  $P$  et  $Q$  sont inversibles et qu'elles sont inverses l'une de l'autre.

- Considérons les matrices  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  et  $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$ .

$$PQ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3,$$

ce qui prouve que  $P$  et  $Q$  sont inversibles et qu'elles sont inverses l'une de l'autre.

**Corollaire 5.6**

Si  $P$  et  $Q$  sont deux matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$  telles que  $PQ = \lambda I_n$ , avec  $\lambda \neq 0$ , alors  $P$  et  $Q$  sont inversibles et on a

$$P^{-1} = \frac{1}{\lambda} Q \quad \text{et} \quad Q^{-1} = \frac{1}{\lambda} P.$$

**Exemple 5.7 –** Considérons les matrices  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$  et  $Q = \begin{pmatrix} 0 & -5 & -5 \\ -2 & -4 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ .

$$PQ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -5 & -5 \\ -2 & -4 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} = 10I_3,$$

ce qui prouve que  $P$  et  $Q$  sont inversibles et que  $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$  et  $Q^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{3}{10} \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{10} \\ \frac{2}{10} & \frac{1}{5} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$ .

Remarquons que le cas des matrices diagonales est facile.

**Proposition 5.8**

Une matrice diagonale  $D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & d_n \end{pmatrix}$  est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux  $d_i$  sont tous non-nuls. Dans ce cas,

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{d_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{d_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \frac{1}{d_n} \end{pmatrix}.$$

**Exemple 5.9 –**

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

**Proposition 5.10**

Soit  $A$  une matrice triangulaire supérieure ou inférieure de  $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ . La matrice  $A$  est inversible si et seulement si ses termes diagonaux sont tous non-nuls.

**Exemple 5.11 –**

- La matrice  $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}$  est inversible car 2, 1 et -4 sont non-nuls.
- La matrice  $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  n'est pas inversible car le deuxième coefficient diagonal est nul.

**Proposition 5.12**

Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ .

- Si  $A$  est inversible, alors  $A^{-1}$  est inversible et  $(A^{-1})^{-1} = A$ .
- Si  $A$  et  $B$  sont inversibles, alors le produit  $AB$  est inversible et  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .
- Si  $A$  est inversible, alors  $A$  est simplifiable à gauche et à droite, c'est-à-dire que

$$AB = AC \implies B = C,$$

$$BA = CA \implies B = C.$$

Terminons avec le cas des matrices carrées de taille 2.

**Proposition 5.13**

La matrice  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  est inversible si et seulement si  $ad - bc \neq 0$ . Dans ce cas,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

*Démonstration.* On commence par observer que

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc)I_2,$$

ce qui prouve que si  $ad - bc \neq 0$ , alors  $A$  est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Si en revanche,  $ad - bc = 0$ , alors en posant  $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ , on a  $AB = O_2$ .

Raisonnons par l'absurde et supposons que  $A$  soit inversible. Alors, on aurait  $B = A^{-1}AB = A^{-1}O_2 = O_2$ , ce qui donnerait  $a = b = c = d = 0$  et donc  $A = O_2$ . Or, la matrice nulle d'ordre 2 n'est pas inversible. Contradiction. Donc  $A$  n'est pas inversible.  $\square$

**Exemple 5.14** – Les matrices suivantes sont-elles inversibles? Si oui, préciser leur inverse.

1.  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

On a  $1 \times 4 - 2 \times 3 = -2 \neq 0$  donc  $A$  est inversible et  $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ .

2.  $B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

$3 \times 4 - 2 \times 6 = 0$  donc  $B$  n'est pas inversible.

## II – Calcul effectif de l'inverse d'une matrice

### 1 – Calcul de l'inverse par la résolution d'un système

**Théorème 5.15**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ . La matrice  $A$  est inversible si et seulement si, pour tout  $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{R})$ , le système linéaire  $AX = Y$  admet une unique solution.

**Méthode 5.16** – Montrer qu'une matrice est inversible et calculer son inverse

En utilisant la méthode du pivot de Gauss, on résout le système  $AX = Y$  d'inconnue  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{R})$  en fonction de  $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{R})$  quelconque fixé, puis on discute :

- si le système admet une unique solution  $X = BY$  alors  $A$  est inversible et  $A^{-1} = B$ ,
- sinon la matrice n'est pas inversible.



**Exemple 5.17** – Montrer que la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & -7 & 11 \\ -1 & 12 & -19 \\ 0 & -3 & 5 \end{pmatrix}$  est inversible et déterminer son inverse.

Soit  $Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  une matrice de  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbf{R})$ . Pour tout  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbf{R})$ , on a les équivalences suivantes.

$$\begin{aligned}
 AX = Y &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -7 & 11 \\ -1 & 12 & -19 \\ 0 & -3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x - 7y + 11z = a \\ -x + 12y - 19z = b \\ -3y + 5z = c \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x - 7y + 11z = a \\ 5y - 8z = a + b & L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ -3y + 5z = c \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x - 7y + 11z = a \\ 15y - 24z = 3a + 3b & L_2 \leftarrow 3L_2 \\ -15y + 25z = 5c & L_3 \leftarrow 5L_3 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x - 7y + 11z = a \\ 15y - 24z = 3a + 3b \\ z = 3a + 3b + 5c & L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x - 7y + 11z = a \\ 15y = 75a + 75b + 120c & L_2 \leftarrow L_2 + 24L_3 \\ z = 3a + 3b + 5c \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x - 7y + 11z = a \\ y = 5a + 5b + 8c & L_2 \leftarrow \frac{1}{15}L_2 \\ z = 3a + 3b + 5c \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3a + 2b + c & L_1 \leftarrow L_1 + 7L_2 - 11L_3 \\ y = 5a + 5b + 8c \\ z = 3a + 3b + 5c \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 5 & 8 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Finalement, la matrice  $A$  est inversible et son inverse est donné par  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 5 & 8 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ .

## 2 – Calcul de l'inverse par la méthode du pivot de Gauss

### Théorème 5.18

Soit  $A$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ . La matrice  $A$  est inversible si et seulement si une suite d'opérations élémentaires sur les lignes de  $A$  transforme la matrice  $A$  en une matrice  $B$  inversible.

Dès lors, en transformant la matrice  $A$  en la matrice identité à l'aide d'opérations sur les lignes et en effectuant simultanément les mêmes opérations sur la matrice identité, on obtient l'inverse de la matrice  $A$ .


**Méthode 5.19 – Méthode de Gauss-Jordan**

En pratique, pour transformer  $A$  en  $I_n$ , on commence par transformer la matrice  $A$  en une matrice triangulaire supérieure par la méthode du pivot de Gauss, ce qui permet déjà de savoir si  $A$  est inversible ou non. Le cas échéant, on transforme alors la matrice triangulaire obtenue en la matrice identité. C'est la méthode de Gauss-Jordan.

**Exemple 5.20** – On considère la matrice

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Montrer que la matrice  $P$  est inversible et déterminer son inverse.

On utilise donc la méthode de Gauss-Jordan.

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

La matrice obtenue est triangulaire supérieure avec tous ses pivots non-nuls donc elle est inversible. Par théorème, la matrice  $P$  est elle aussi inversible. Poursuivons la méthode.

$$\xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Donc la matrice  $P$  est inversible et  $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$