

组合数学引论第二章答案

1, 注意到2与5乘积产生0, 故只要考虑1到50中含有因子2的个数和5的个数, 先考虑含因子5的个数1到50中5的倍数有10个, 但25,和50含有两个5 因子, 故总的5因子数为12个, 而2作为因子的次数显然大于12, 故产生12个0, 即末尾有12个0。

2.如果首位数字是5, 则有 $1 \times 3 \times 6 \times 5 + 6 \times 5 = 120$ 个, 如果首位数字不是5, 则有 $3 \times 7 \times 6 \times 5 = 630$ 个。所以共有 $120 + 630 = 750$ 个。

3, $11! - 2 \times 10! = 9 \times 10!$

4, (1) $4!$, (2) $4 + 4 \times 3 + 4 \times 3 \times 2 + 4!$ (3) $4 + 6 + 4 + 1 = 15$

5.(1) C_{100}^3

(2) $\frac{C_{100}^3 - C_{98}^3}{C_{100}^3}$

(3) $\frac{C_2^1 C_{98}^2}{C_{100}^3}$

7,(1), $C(8,5)P(8,5) \times 3!$ (2), $C(12,8)C(8,5)P(12,5)P(7,3)$

8.共有 C_{10}^4 (或 C_{10}^6)种送法

9. (1) 93; (2) $99 + 98 + 97 + \dots + 93$

10. 记 $y_i = x_i - i$, 则原问题转化为求方程 $y_1 + y_2 + \cdots + y_8 = 4$ 的非负整数解数, 易知共 $\binom{8+4-1}{4} = 330$ 个。

11. 此题等价于从 $(0, 1)$ 到 (b, a) 的不接触对角线的非降路径数, 即有 $(1 - \frac{b}{a})C(a+b-1, a-1)$ 种

12, $\frac{1}{(n+1)} \binom{2n}{n}$

13. $2 \frac{1}{(n+1)} \binom{2n}{n}$

14. 设取的第一组数有 a 个, 第二组数有 b 个, 要求第一组里的最小数大于第二组里的最大数, 即只要取出 m ($m = a + b, m \leq n$) 个数, 按从小到大的顺序排列, 将前 a 个作为第一组, 剩下 b 个作为第二组。注意从 m 个数中取第一组的方法共 $m - 1$ 种, 那么总的方案数为 $\sum_{m=2}^n (m-1)C_m^n = \sum_{m=2}^n mC_m^n - \sum_{m=2}^n C_m^n = n2^{n-1} - 2^n + 1$

15, $5n+1$

16. 根据题意, 每四个不同顶点组成的两条对角线有一个交点, 而任意3条对角线不共点, 故该凸10边形的对角线交于 $C_{10}^4 = 210$ 个点。又每个对角线交点关联的段数为4, 每个顶点关联的段数为 $(10 - 1 - 2) = 7$, 故把所有的对角线分割成 $\frac{210 \times 4 + 10 \times 7}{2} = 455$ 段。

17, $(1 + a_1)(1 + a_2) \dots (1 + a_l)$

19, 显然此时任何三点不共线, 故可以确定 $C(25, 3)$ 个三角形, $C(25, 4)$ 个四面体。

20.(1) ∵ 最大元素恰好是 j , ∴ 其他元素是从比它小的 $j - 1$ 个元素中选取, 这 $j - 1$ 个元素每个都有被选取或没被选取两种情况, 故最大元素恰好是 j 的子集数为 2^{j-1} .

(2) 等式左边可以看做最大元素依次为 $1, 2, \dots, n + 1$ 子集数之和, 等式右边表示集合 $1, 2, \dots, n + 1$ 的非空子集数, 两边显然相等。

21, $1 \sim 1000$ 中被 4 整除余 1、余 2、余 3、余 0 (即被 4 整除) 的数各有 250 个. 3 个数如果都能被 4 整除, 其和自然也能被 4 整除; 同样, 一个余 0 的、一个余 1 的、一个余 3 的数之和, 或一个余 0 的、两个余 2 的数之和, 或两个余 1 的、一个余 2 的数之和, 或两个余 3 的、一个余 2 的数之和, 都可以被 4 整除. 除此之外没有别的情况可以使题设成立了. 故而总的有 $C(250, 3) + C(250, 1)^3 + 3 \times C(250, 1)C(250, 2) = 33760500$

22. (1), 先给出满足要求的放法, 然后将剩余的 0 和 1 填入已部分放好的 0, 1 序列中, 而后者等价于将 k 个相同的球放入 m 个不同的盒子中的放球问题. 注意到要放成出现 4 种 01 或 10, 则必为 01010 或 10101, 然后分别在 0 的位置选择放 0, 1 的位置选择放 1, 分别有 $\binom{3+2-1}{2} \binom{2+2-1}{2} = 18$ 和 $\binom{3+2-1}{3} \binom{1+2-1}{1} = 12$ 种, 从而总的有 30 种。

(2), 思路与 (1) 类似, 分 k 为奇数和偶数考虑。

当 k 为奇数时, 则必有且仅有一个 1 放在序列的开头或者末尾, 由对称性, 我们只需要考虑 1 开头即可, 此时组成 0, 1 交替序列, 即 101010...10, 分别有 $\frac{k+1}{2}$ 个 1 和 0. 类似前面做法, 将剩余的 0 和 1 放入, 则有

$$2 \binom{m-1}{m-\frac{k+1}{2}} \binom{n-1}{n-\frac{k+1}{2}}$$

种.

当 k 为偶数时, 则必有序列的开头和末尾都同时为 1 或者同时为 0,

先考虑开头和结尾均为1的情形, 即 $101010\cdots 101$, 分别有 $\frac{k}{2} + 1$ 个1和 $\frac{k}{2}$ 个0. 类似前面做法, 将剩余的0和1放入, 则有

$$\binom{m-1}{m-\frac{k}{2}} \binom{n-1}{n-\frac{k}{2}-1}$$

种.

再考虑开头和结尾均为0的情形, 即 $0101010\cdots 10$, 分别有 $\frac{k}{2}$ 个1和 $\frac{k}{2} + 1$ 个0. 类似前面做法, 将剩余的0和1放入, 则有

$$\binom{m-1}{m-\frac{k}{2}-1} \binom{n-1}{n-\frac{k}{2}}$$

种. 两式相加即得结果.

23, 先把5封不同的信放好. 共 $P(5, 5)$ 种放法. 然后在每两封信之间加入3个空格. 由于空格都是相同的, 故只有1种方法. 现在还剩 $15 - 3 = 12$ 个空格; 而信队列前、后和队列中共有6个地方可以插入空格. 这相当于把3个相同的球放入6个不同的盒子, 允许有空盒. 故总的放法数为: $P(5, 5) \times 1 \times C(3 + 6 - 1, 3) = 6720$

24, 分成如下三种情形:

(1) abc在一起, 将其看成一个字母, 则有 $P(6, 6)$ 种;

(2) ab在一起但与c分离, 则先将剩余的5个字母排好, 再从6个空格中取两个空格放ab和c, 有 $P(5, 5)C(6, 2)$ 种;

(3) a, b, c均分离, 则先将剩余的5个字母排好, 再从6个空格中取3个空格分别放a, b和c, 有 $P(5, 5)C(6, 3)$ 种;

故总的方法有 $P(6, 6) + (C(6, 2) + C(6, 3)) \times P(5, 5)$

25. x 与 y 的乘积 xy 不能被3整除, 这说明 x 与 y 都不能被3整除. 在1至100的整数中, 不能被3整除的数有67个, 故所求有序对 (x, y) 共有 $A_2^2 \times C_{67}^2 = 4422$.

28. (1) 当 $k \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned}
 (-1)^k k^2 \binom{n}{k} &= (-1)^k k(k-1) \binom{n}{k} + (-1)^k k \binom{n}{k} \\
 &= (-1)^k (k-1) \binom{n}{k} \binom{k}{1} + (-1)^k \binom{n}{k} \binom{k}{1} \\
 &= (-1)^k (k-1) \binom{n-1}{k-1} \binom{n}{1} + (-1)^k \binom{n}{1} \binom{n-1}{k-1} \\
 &= (-1)^k n \binom{n-1}{k-1} \binom{k-1}{1} + (-1)^k n \binom{n-1}{k-1} \\
 &= (-1)^k n(n-1) \binom{n-2}{k-2} + (-1)^k n \binom{n-1}{k-1}
 \end{aligned}$$

将此式代入得

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n (-1)^k k^2 \binom{n}{k} &= (-1)^0 0^2 \binom{n}{0} + (-1)^1 1^2 \binom{n}{1} + \sum_{k=2}^n (-1)^k k^2 \binom{n}{k} \\
 &= 0 - n + \sum_{k=2}^n (-1)^k n(n-1) \binom{n-2}{k-2} + \sum_{k=2}^n (-1)^k n \binom{n-1}{k-1} \\
 &= n(n-1)(1-1)^{n-2} + (1-1)^n = 0 \quad (n > 2)
 \end{aligned}$$

注意: $n = 2$ 时上述式子等于 2.

(2)

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)} \binom{n}{k} &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)} \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{(n+1)(n+2)} \frac{(n+2)!}{(k+2)!(n-k)!} \\
 &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left[\sum_{k=0}^{n+2} \frac{(n+2)!}{k!(n+2-k)!} - 1 - (n+2) \right] \\
 &= \frac{2^{n+2} - n - 3}{(n+1)(n+2)}
 \end{aligned}$$

(4)当 $k \geq 2$ 时,类似(1)的证明, 有

$$\begin{aligned}(k+1)^2 \binom{n}{k} &= (k(k-1) + 3k + 1) \binom{n}{k} \\ &= n(n-1) \binom{n-2}{k-2} + 3n \binom{n-1}{k-1} + \binom{n}{k}\end{aligned}$$

将此式代入得

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n (k+1)^2 \binom{n}{k} &= (0+1)^2 \binom{n}{0} + (1+1)^2 \binom{n}{1} + \sum_{k=2}^n (k+1)^2 \binom{n}{k} \\ &= 1 + 4n + n(n-1) \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} \\ &\quad + 3n \sum_{k=2}^n \binom{n-1}{k-1} + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \\ &= n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-2}{k} + 3n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \\ &= 2^{n-2}(n^2 + 5n + 4)\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)} \binom{n}{k} &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)} \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
&= \sum_{k=0}^n \frac{(k+1)}{(n+1)(n+2)} \frac{(n+2)!}{(k+2)!(n-k)!} \\
&= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \sum_{k=0}^n (k+1) \binom{n+2}{k+2} \\
&= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \sum_{k=0}^n (k+2-1) \binom{n+2}{k+2} \\
&= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left(\sum_{k=0}^n (k+2) \binom{n+2}{k+2} - \sum_{k=0}^n \binom{n+2}{k+2} \right) \\
&= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left(\sum_{k=0}^n (n+2) \binom{n+1}{k+1} - \sum_{k=0}^n \binom{n+2}{k+2} \right) \\
&= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left(\sum_{k=0}^{n+1} (n+2) \binom{n+1}{k} - \sum_{k=0}^{n+2} \binom{n+2}{k} + 1 \right) \\
&= \frac{(n+2)2^{n+1} - 2^{n+2} + 1}{(n+1)(n+2)} \\
&= \frac{n2^{n+1} + 1}{(n+1)(n+2)}
\end{aligned}$$