

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/381293382>

«ОСТРЫЕ УГЛЫ» В РАССУЖДЕНИИ ПЬЕРА ФЕРМА О НЕРАЗЛОЖИМОСТИ СТЕПЕНИ ВЫШЕ КВАДРАТА (ОБЗОР)

Preprint · June 2024

DOI: 10.13140/RG.2.2.24531.39207/12

CITATIONS

0

READS

421

1 author:



Grigoriy Dedenko

Financial University

74 PUBLICATIONS 127 CITATIONS

SEE PROFILE

«Острые углы» в рассуждении Пьера Ферма о неразложимости степени выше квадрата (обзор)

Г. Л. Деденко

Кандидат физико-математических наук,

Старший преподаватель, Департамент информационных технологий (КИТ)

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Электронная почта для связи с автором: GLDedenko@fa.ru

Идентификатор ORCID автора: 0000-0002-0418-6389

DOI: 10.13140/RG.2.2.24531.39207/12

21 сентября 2025 г.

Аннотация

Представлена возможная версия оригинального доказательства неразложимости целых степеней выше квадрата, о котором говорил Пьер де Ферма. Это реконструированное доказательство обсуждается с некоторыми дополнительными выводами, сделанными на его основе.

Ключевые слова: теория чисел, Великая/Последняя теорема Ферма, история математики, алгебра, доказательство.

Классификационный код ACM CSS 1998: D.2.4; F.3.1; F.4.1

Классификационный код MSC: 68V20; Вторичный: 68V15, 03B35

Конкурирующие интересы

Нет, я заявляю, что у авторов нет конкурирующих интересов, как это определено Springer, или других интересов, которые могли бы повлиять на результаты и/или обсуждение, представленные в этой статье.

Автор(ы) заявляет(ют), что нет никаких конфликтов интересов в отношении публикации данной статьи.

Согласие на публикацию

Я даю согласие на публикацию этой статьи.

Доступность данных и материалов

Я заявляю, что доступность данных имеет лицензию типа «CC BY-SA: Creative Commons Attribution-ShareAlike» в соответствии с лицензионным соглашением на предыдущую публикацию этой статьи в 2019 году (на тот момент статья была не завершена) — предыдущая незавершенная публикация английской версии этой статьи доступна по ссылке <https://iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/view/48744>

и <https://www.fermatlibrary.com/p/0c39c9be>

и размещена в виде препринта некоторая небольшая предыдущая версия (октябрь 2023 г.):

https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat's_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect

и эта текущая завершенная версия в виде препринта опубликована там же по той же ссылке.

Данные для этой завершенной статьи также доступны по следующей ссылке (вы можете получить все предыдущие версии по этой ссылке): <https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>

Финансирование

Без финансирования

Одобрение этического комитета и согласие на участие.

Неприменимо

Вклад авторов

Вся статья написана одним автором. Благодарности приведены в разделе «Благодарности».

Благодарности

Прежде всего, автор выражает благодарность Всевышнему Богу и Его моральным заповедям, которые всегда поддерживали автора в трудные моменты.

Автор также хочет почтить память своей матери, Наталье Алексеевне Деденко, чья непоколебимая вера в него и его работу оставалась источником вдохновения даже спустя годы после ее ухода. Ее поддержка и вера в ценность упорства и интеллектуального поиска продолжают находить отклик в этом исследовании.

Кроме того, автор выражает глубочайшую благодарность своему отцу, Леониду Григорьевичу Деденко, доктору физико-математических наук, профессору физического факультета МГУ, за его неоценимое руководство, наставничество и фундаментальное влияние на научное развитие автора. Автор также благодарен учительнице математики Колесниковой В.Е. из школы № 533 г. Москвы за ее раннюю поддержку в математическом образовании.

Автор выражает признательность доцентам Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Малову А.Ф., Ивлиеву С.В., Макаровой И.Ф., заместителю заведующего кафедрой прикладной ядерной физики НИЯУ МИФИ Рябевой Е.В. и сотруднику МАГАТЭ Юркину П.Г. за их содержательные обсуждения и профессиональную поддержку.

Дальнейшая благодарность выражается доценту Чернышеву Л.Н. из Финансового университета при Правительстве РФ, доктору Борису Борисову с механико-математического факультета МГУ, доктору Пащенко Ф.Ф. и коллегам из ИПУ РАН, доценту Милосердину В.Ю. из НИЯУ МИФИ и преподавателю НИЯУ МИФИ Мухину В.И. за их ценные отзывы и технические обсуждения. Автор признателен Сергею П. Клыкову, эксперту по ферментации из ООО «Альфа-Интегрум», и координатору по математике (Ph.D.) Ливанского международного университета Иссаму Каддуре за их вклад в некоторые аналитические аспекты работы.

Также выражается благодарность создателям генеративных нейронных сетей — ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral — за их роль в частичной проверке и улучшении результатов, представленных в этой статье. Автор ценит участников математических форумов, таких как dxdu и cyberforum, за их критические отзывы, которые повысили качество исследования.

Искренние слова благодарности также адресуются научному руководителю, доценту Кадилину В.В. из НИЯУ МИФИ, декану физико-технического факультета НИЯУ МИФИ Тихомирову Г.В., и профессорам Самосадному В.Т., Филиппову В.П., Крамер-Агееву Е.А., Мур В.Д., Петрунину В.Ф., Болоздыне А.И., Дмитренко В.В., Грачеву В.М., Машковичу В.П., Улину С.Е. и доцентам Бойко Н.В., Евстюхиной И.А., Каплуну А.А., Куценко К.В., Колесникову С.В., Минаеву В.М., Петрову В.И., Самонову А.М., Сулаберидзе Г.А. и Ростокину В.И. из НИЯУ МИФИ за их академическую поддержку и ценные идеи.

Дальнейшая благодарность выражается директору проекта в Индии АО «АТОМСТРОЙ-ЭКСПОРТ» Ангелову В.А., первому заместителю директора по строительству АЭС «Куданкулам» АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ» Кваше А.В. и коллегам из Управления проектом АЭС «Куданкулам» АСЭ: Амосову А.М., Носихину Д.В., Фомичеву А.В., Галепину К.Э., Савину А.Н., Малинину Д.С., Васильеву В.В., Спирину В.В., Авдеенко В.В., Преображенской А.А. и Матушкиной Г.Л. за их технические обсуждения и профессиональные идеи.

Коллеги из Финансового университета при Правительстве РФ, включая декана факультета информационных технологий Феклина В.Г., заведующего кафедрой больших данных и машинного обучения Петросова Д.А., Алюнова А.Н., Соловьева В.И., Коротеева М.В., Иванова М.Н., Иванюк В.А. и Савинова Е.А., признаются за их вклад в обсуждение вычислительных аспектов работы.

Автор также благодарен за конструктивные обсуждения с коллегами-исследователями, включая Кондрашкина И.Б., Моторина Н.М., Клепикова К.С., Мищенко А.Ю., Костенецкого А.Л.,

Шевелева С.Е., Исакова С.В., Клементьева А.В., Логинова В.Ю., Волканова Д.Ю., Фолиянц Э.В., Кондарь Е.В., Бурову В.П., Васильеву О.А., Шабельникова А.В., Сержантову О.В., Данилову Н.В., Хан Т.А., Кузанского Н.В., Хрущева Ю.В., Егоркина И.А. и пульмонолога Крысина Ю.С. из Центральной клинической больницы Управления делами Президента России за их отзывы и содержательные обсуждения.

Наконец, автор выражает признательность широкому научному и профессиональному сообществу, чья конструктивная критика и участие способствовали совершенствованию этой работы.

Информация об авторе (необязательно)

Первый автор Доктор Григорий ДЕДЕНКО, родился в Москве 9 июля 1971 года, получил степень магистра в области ядерной физики и инженерии (кинетические явления) в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) в феврале 1995 года и кандидатскую диссертацию (Ph.D.) в области ядерного приборостроения и управления там же в сентябре 2005 года.

В МИФИ он работал в области прикладной ядерной физики в должностях ассистента (1995-2002), старшего преподавателя (2002-2010) и доцента (2010-середина 2018). С середины 2018 по август 2020 года он был ведущим специалистом по проекту АЭС «Куданкулам» для Индии в АО «Атомстройэкспорт». С сентября 2020 года он работает в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации — в должности доцента (сентябрь 2020-декабрь 2023) и, с января 2024 года, старшего преподавателя.

Научные интересы доктора Деденко варьируются от ядерной науки и инженерии до чистой математики, истории и философии.

1 Введение

Настоящая работа является результатом попытки реконструкции оригинального рассуждения Ферма, а также объяснения того, почему он мог его не записать. Автор выполнил ее в течение двух периодов времени — между 1990 и 1993 годами — пытаясь доказать теорему, и окончательную редакцию в 2017-2025 годах.¹ По завершении она выглядела как доказательство эпохи Ферма, поскольку в ней использовались только знания и методы, доступные и применявшиеся в математическом мире современников Ферма и до него.

Чтобы не перегружать этот текст деталями реального исторического исследования, кратко напомним историю гипотезы. Около 1637 года Ферма записал свою Последнюю теорему на полях своей копии «Арифметики» рядом с задачей Диофанта о сумме квадратов [7]:

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadra-tos & generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.

Попытки доказать эту гипотезу использовали разнообразные методы. Ранние попытки, включая собственное доказательство Ферма для случая $n = 4$, использовали **метод бесконечного спуска**. Значительным шагом вперед стало доказательство Леонарда Эйлера для случая $n = 3$, в котором использовались **целые числа Гаусса** [13]. Последующие усилия включали подходы, основанные на работах Софи Жермен и других методах, прежде чем Эндрю Уайлс наконец представил полное доказательство в 1995 году, опираясь на глубокие результаты **теории модулярных форм и эллиптических кривых** [1–6].

Современные методы, такие как теория модулярных форм, имеют дело со **свойствами преобразования конкретных кривых над определенными типами пространств** (например, рациональными числами), подчеркивая **устойчивость эллиптических кривых относительно модулярных преобразований**. Хотя современные формализации алгебраических кривых, пространств, преобразований и групп, используемые в этих методах, отсутствовали во времена Ферма, математики той эпохи обладали собственными подходами и интуитивным пониманием для изучения свойств натуральных (и простых) чисел. (Подробнее об этом можно найти в разделе «Заключение» данной статьи.)

¹ Работа в основном выполнялась на стипендию студента НИЯУ МИФИ в 1990-93 гг., окончательная редакция в 2017-2025 гг.

2 Возможное доказательство

Формулировка теоремы довольно проста и звучит следующим образом:

Ни куб на два куба, ни биквадрат на два биквадрата и вообще никакая степень, большая квадрата, не может быть разложена на две степени того же показателя. Другими словами, уравнение

$$x^n + y^n = z^n$$

не имеет решений в натуральных числах, если n — целое число больше 2.

Итак, сначала

1). Запишем теорему

$$x^n + y^n = z^n \quad (2.1)$$

2). Перепишем (2.1)

$$z^n - x^n = y^n \quad (2.2)$$

3). Сделаем преобразование (2.2)

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n \quad (2.3)$$

где m, p ($m > p$) — ЛЮБЫЕ (не обязательно целые положительные) числа, такие что z, x — целые положительные числа, и:

$$\left. \begin{aligned} m^n + p^n &= z \\ m^n - p^n &= x \end{aligned} \right\} \quad (2.4)$$

следовательно

$$\left. \begin{aligned} (m^n + p^n)^n &= z^n \\ (m^n - p^n)^n &= x^n \end{aligned} \right\} \quad (2.5)$$

смысл остается неизменным, так как очевидно, что системы уравнений (2.5) и (2.4) идентичны друг другу, поскольку имеют одинаковое множество решений.

Переход от (2.2) к (2.3) можно считать эквивалентным. Докажем это строго математически.

Итак, у нас есть система уравнений:

$$\left. \begin{aligned} m^n + p^n &= z \\ m^n - p^n &= x \end{aligned} \right\}$$

Решим ее стандартным способом решения систем уравнений:

Шаг 1. Сложим два уравнения

$$\begin{aligned} 2m^n &= (z + x) \\ m &= \sqrt[n]{\frac{z + x}{2}} \end{aligned}$$

Шаг 2. Вычтем одно уравнение из другого

$$\begin{aligned} 2p^n &= (z - x) \\ p &= \sqrt[n]{\frac{z - x}{2}} \end{aligned}$$

Мы получили строгие математические выражения для m и p .

Следовательно, эквивалентность систем (2.4) и (2.5):

Прямая импликация: (2.4) \Rightarrow (2.5) Пусть $m, p \in \mathbb{N}$ с $m > p$. Из системы (2.4):

$$\left\{ \begin{aligned} z &= m^n + p^n, \\ x &= m^n - p^n, \end{aligned} \right.$$

возведение обоих уравнений в n -ю степень дает:

$$\begin{cases} z^n = (m^n + p^n)^n, \\ x^n = (m^n - p^n)^n. \end{cases}$$

Таким образом, любое решение (2.4) удовлетворяет (2.5).

Обратная импликация: (2.5) \Rightarrow (2.4) Предположим, что $z^n = (m^n + p^n)^n$ и $x^n = (m^n - p^n)^n$ для $z, x \in \mathbb{N}$. Поскольку корень n -й степени в \mathbb{N} единственен, мы получаем:

$$\begin{cases} z = m^n + p^n, \\ x = m^n - p^n. \end{cases}$$

Для $m, p \in \mathbb{N}$ должно выполняться следующее:

- $\frac{z+x}{2} = m^n$ и $\frac{z-x}{2} = p^n$,
- $z+x$ и $z-x$ — четные (что обеспечивает $m^n, p^n \in \mathbb{N}$).

Неравенство $m > p$ следует из $z > x$. Следовательно, системы (2.4) и (2.5) эквивалентны.

Пример:

Для $n = 2$, пусть $m = 3$, $p = 2$:

- Из (2.4):

$$z = 3^2 + 2^2 = 13, \quad x = 3^2 - 2^2 = 5.$$

- Из (2.5):

$$z^2 = 13^2 = 169, \quad x^2 = 5^2 = 25.$$

- Обратно из (2.5):

$$m = \sqrt{\frac{13+5}{2}} = 3, \quad p = \sqrt{\frac{13-5}{2}} = 2.$$

Следовательно, строго математически, мы можем утверждать, что переход от (2.2) к (2.3) можно считать эквивалентным.

Однако для $n \geq 2$, $\sqrt[n]{2}$ иррационально (Приложение А), что означает, что m и p не могут быть оба целыми числами.

- 4). Зададимся вопросом: что представляет собой число y ? Является ли оно целым положительным числом или нет? Если нет, то при каких условиях оно будет натуральным числом? Зависит ли его натуральность от степени n ?

Из (2.3) мы имеем разность:

$$y^n = z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = \quad (2.6)$$

которую можно разложить в сумму по биному Ньютона [8, 9]:

$$\begin{aligned} &= [(m^n)^n + C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} + (p^n)^n] - \\ &- [(m^n)^n - C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\ &= 2C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + 2C_n^3(m^n)^{n-3}(p^n)^3 + \dots + 2C_n^k(m^n)^{n-k}(p^n)^k + \{2C_n^n(p^n)^n\} = \\ &= 2 \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)}(m^n)^{n-(2i+1)}(p^n)^{(2i+1)} \end{aligned}$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетно, и $k = (n-2)/2$, если n четно.

Перепишем (2.6) как

$$\begin{aligned} &z^n = x^n + y^n, \\ \text{где } x, y, z \text{ равны } &\begin{cases} z = m^n + p^n \\ x = m^n - p^n \\ y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)}(m^n)^{n-(2i+1)}(p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \end{cases} \end{aligned}$$

где $k = (n - 1)/2$, если n нечетно, и $k = (n - 2)/2$, если n четно;

мы знаем, что в общем случае для $n = 2$ имеем

$$\text{где } x, y, z \text{ задаются формулами } \begin{cases} z = r \cdot (m^2 + p^2), \\ x = r \cdot (m^2 - p^2), \\ y = r \cdot 2mp. \end{cases} \quad (2.7)$$

но в нашем случае мы опускаем множитель r — некоторую положительную ($r > 0$) целую константу, поскольку она сокращается в наших вычислениях. Таким образом, мы сделали преобразование (2.3), чтобы учесть этот случай ($n=2$), известный со времен Пифагора, поскольку общий случай должен включать частное решение как подмножество.

5). исследуем теперь y :

$$y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n}. \quad (2.8)$$

Для того чтобы y могло быть целым положительным числом, $\sqrt[n]{2}$ должно сократиться, поскольку для $n > 1$ $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным числом (см. Приложение А). Следовательно, необходимо, чтобы выражение

$$\left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \quad (2.9)$$

содержало некоторый общий множитель, который уничтожает радикал $\sqrt[n]{2}$, выясним, что это за множитель. В противном случае, y не является целым положительным числом из-за присутствия $\sqrt[n]{2}$. Рассмотрим теперь, какой наибольший делитель может содержать эта сумма и чему он равен:

$$\begin{aligned} & \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right] = \\ &= C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^3 (m^n)^{n-3} (p^n)^3 + \dots + C_n^k (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \{C_n^n (p^n)^n\} = \\ &= n(m^n)^{n-1} p^n + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \\ &+ \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{n(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} = \\ &= n \cdot \left[(m^n)^{n-1} p^n + \frac{(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \right. \\ &\left. + \frac{(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} \right] = n \cdot l^n \end{aligned} \quad (2.10)$$

где $k = (n - 1)/2$, если n нечетно, и $k = (n - 2)/2$, если n четно.

Отсюда следует вывод: n является общим делителем, и где l — некоторая константа, о которой мы ничего не знаем (в общем случае она может быть вещественной или целой), через которую мы обозначили остаток радикала после выделения общего множителя n .

Поскольку все члены в сумме (2.10) содержат множитель n , выражение делится на n .

Для доказательства единственности разложения выражения (2.10) можно использовать следующие соображения:

- (а) Степень n — фиксированное положительное целое число.
- (б) Возведение в степень — однозначная операция; для любого числа существует единственное значение степени.
- (с) Сложение и вычитание действительных чисел — коммутативные операции, и результат не зависит от порядка действий.

Основываясь на этих свойствах, можно утверждать, что для фиксированных m , p и n существует единственный результат вычисления выражения (2.10). Перестановка членов не повлияет на конечный ответ.

Мы видим, что из (2.8 - 2.10) (где l — некоторая константа (которая будет таковой для фиксированных m , p , n), о которой мы пока ничего не знаем)

$$y = \sqrt[n]{2 \cdot n \cdot l} \quad (2.11)$$

Отсюда мы видим из (2.6-2.11), что

$$z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n$$

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \cdot n \cdot l^n$$

Положим $m = j \cdot p$, где $j > 1$ — любое число.

$$((j \cdot p)^n + p^n)^n - ((j \cdot p)^n - p^n)^n = 2 \cdot n \cdot l^n$$

$$(p^n \cdot (j^n + 1))^n - (p^n \cdot (j^n - 1))^n = 2 \cdot n \cdot l^n$$

$$(p^n)^n \cdot ((j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n) = 2 \cdot n \cdot l^n$$

Рассмотрим разность $(j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n$, разложим ее по биному Ньютона

$$(j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (j^n)^{n-k} - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (j^n)^{n-k} (-1)^k$$

Объединяя суммы

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (j^n)^{n-k} [1 - (-1)^k]$$

Упростим сумму. Поскольку $[1 - (-1)^k]$ равно 2, когда k нечетно, и 0, когда k четно, в сумму войдут только нечетные значения k .

Таким образом, мы имеем:

$$(p^n)^n \cdot 2 \cdot \sum_k \binom{n}{k} (j^n)^{n-k} = 2 \cdot n \cdot l^n$$

Обозначим

$$q^n = 2 \cdot \sum_k \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}$$

Следовательно

$$\begin{aligned} (p^n)^n \cdot q^n &= 2 \cdot n \cdot l^n \\ \frac{(p^n)^n \cdot q^n}{l^n} &= 2 \cdot n \end{aligned} \quad (2.12)$$

Рассматривая выражения для q и l в уравнении (2.12), мы получаем бесконечное число решений.

Почему бесконечность?

Из (2.8-2.11) мы видим, что

$$l^n = \frac{1}{n} \sum_{k \text{ нечетное}} \binom{n}{k} m^{n(n-k)} p^{nk}$$

Когда мы принимаем $m = j \cdot p$, мы видим, что

$$l^n = (p^n)^n \frac{1}{n} \sum_k \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}$$

Следовательно, подставляя полученные выражения для l и q в (2.12), мы видим бесконечное число решений; фактически, мы получили тождество.

$$\frac{(p^n)^n \cdot 2 \cdot \sum_k \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}}{(p^n)^n \frac{1}{n} \sum_k \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}} = 2 \cdot n$$

Следовательно, единственно возможный способ решить уравнение (2.12) — это предположить, наложив на него дополнительное ограничение, что существует действительное число $o > 1$, удовлетворяющее условию:

$$o^n = 2 \cdot n \quad (2.13)$$

Где o это

$$o = \left(\frac{p^n \cdot q}{l} \right)$$

Утверждение 1: В уравнении (2.13) левая часть o^n демонстрирует экспоненциальный рост при непрерывном увеличении аргумента n , в то время как правая часть $2n$ демонстрирует линейный рост. Следовательно, для $o > 2$ это уравнение не имеет решений. Исходя из этого условия и дополнительного условия $o > 1$, мы видим, что единственное возможное значение для o , которое могло бы привести к решениям, — это $o = 2$, которое является положительным действительным числом. Анализируя правую часть уравнения, мы видим, что это значение o является целым, потому что n является целым числом.

Докажем **Утверждение 1**

Для этого внимательнее посмотрим на выражение (2.13)

Уравнение для фиксированного n

Рассмотрим уравнение

$$\left(\frac{p^n \cdot q}{l} \right)^n = 2n. \quad (2.14)$$

Перепишем (2.14) как

$$\frac{p^n \cdot q}{l} = \sqrt[n]{2n}. \quad (2.15)$$

Затем изменим (2.15):

$$\frac{p^n \cdot q}{l} - \sqrt[n]{2n} = 0. \quad (2.16)$$

Применяя метод анзаца к (2.16) (см. Приложение F) и вводя новую переменную o , получаем:

$$o - \sqrt[n]{2n} = 0. \quad (2.17)$$

Следовательно,

$$o = \sqrt[n]{2n}. \quad (2.18)$$

Это позволяет нам свести анализ исходного уравнения к анализу свойств функции $f(n) = \sqrt[n]{2n}$.

Для конкретного n это уравнение определяет единственное значение o . Здесь нет никакого намека на то, что n «меняется» или «стремится к чему-либо»: n — фиксированный параметр задачи.

Поведение $f(n) = \sqrt[n]{2n}$ для различных n

Хотя в каждой конкретной постановке n фиксировано, полезно рассмотреть функцию

$$f(n) = \sqrt[n]{2n}$$

для различных целых значений $n \geq 1$, чтобы понять ее поведение в семействе уравнений (по одному уравнению для каждого n).

- Для $n = 1$, имеем $f(1) = 2$.
- Для $n = 2$, имеем $f(2) = 2$.

При $n = 1$ и $n = 2$ функция принимает значение 2. Если мы рассмотрим все n начиная с 1, мы также можем доказать, что

$$f(n) \leq 2 \quad \text{для всех } n \geq 1,$$

с максимумом, равным 2, достигаемым только при $n = 1$ и $n = 2$. Более того, для $n > 2$, $f(n)$ монотонно убывает (см. Приложение С). Следуя этой убывающей тенденции до больших n , мы получаем (см. Приложение В)

$$\sqrt[n]{2n} \rightarrow 1 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Однако это убывание к 1 относится к семейству уравнений, когда мы переходим от n к $n + 1$ и т.д.; в задаче с фиксированным n такой переход не используется.

Максимальное число целочисленных решений при выборе o

Возвращаясь к уравнению

$$o = \sqrt[n]{2n},$$

для семейства значений n , мы хотим найти, для какого o это уравнение имеет наибольшее число целочисленных решений для n . Из поведения $f(n)$, описанного выше, мы видим:

$$f(n) \leq 2, \quad \text{и } f(n) = 2 \text{ только при } n = 1 \text{ и } n = 2.$$

Следовательно, если $o = 2$, мы получаем два целочисленных решения ($n = 1$ и $n = 2$). Если $o > 2$, решений нет; если $1 < o < 2$, то (из-за убывающего характера $f(n)$ для $n > 2$) существует не более одного решения. Для $o \leq 1$ решений нет, потому что $f(n)$ не опускается ниже 1.

Таким образом, выбор $o = 2$ дает наибольшее число целочисленных решений для n , что в контексте исходной постановки приводит к окончательному равенству

$$2 = \sqrt[n]{2n}. \tag{2.19}$$

Выбор числа 2 обусловлен нашим желанием исследовать поведение исходного уравнения в области, наиболее «насыщенной» целочисленными решениями. Как показано, значение $o = 2$ соответствует максимуму функции $f(n) = \sqrt[n]{2n}$ и, таким образом, обеспечивает наличие двух целочисленных решений для n . Сосредоточение на этом значении позволяет нам проанализировать ситуацию, когда взаимосвязь между параметрами исходного уравнения допускает наибольшее число целочисленных вариантов, что важно для понимания его целочисленных свойств. Следовательно, анализ случая $o = 2$ позволяет нам получить наиболее полное представление о возможных целочисленных взаимосвязях в исходном уравнении, выявляя все потенциально значимые комбинации параметров (см. Приложения D, E).

Заключение:

- **Фиксированное n в одном уравнении.** При анализе конкретного уравнения параметр n неизменен. В этом контексте предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2n}$ не рассматривается, потому что n не «движется».
- **Поведение для разных n .** Если мы посмотрим на семейство уравнений (по одному для каждого n), то анализ функции $f(n) = \sqrt[n]{2n}$ выявляет ее глобальные свойства:
 - $\max f(n) = 2$, достигается при $n = 1$ и $n = 2$.
 - По мере увеличения n (начиная с 3), $f(n)$ строго убывает и асимптотически приближается к 1.

Таким образом, от (2.14) до (2.19), мы наконец приходим к

$$2^n = 2 \cdot n \quad (2.20)$$

Следовательно, из (2.13) мы имеем (2.20) и **Утверждение 1** доказано.

Перепишем (2.20)

$$n = 2^{n-1} \quad (2.21)$$

Это уравнение имеет только два корня в положительных целых числах 1 и 2, докажем это.

Рассмотрим функцию $f(n) = n - 2^{n-1}$:

(a) Для $n = 1$ получаем:

$$f(1) = 1 - 2^{1-1} = 1 - 1 = 0.$$

То есть, при $n = 1$, функция равна 0; следовательно, $n = 1$ является корнем уравнения.

(b) Для $n = 2$ получаем:

$$f(2) = 2 - 2^{2-1} = 2 - 2 = 0.$$

Таким образом, при $n = 2$, функция также равна 0, и поэтому $n = 2$ — еще один корень.

(c) Для любого другого целого $n > 2$, функция удовлетворяет

$$f(n) < 0,$$

поскольку 2^{n-1} растет экспоненциально, в то время как n растет линейно.

То есть, для $n > 2$, уравнение корней иметь не может.

Таким образом, доказано, что это уравнение (2.21) имеет ровно два корня в положительных целых числах - для $n = 1$ и $n = 2$.

Следовательно, уравнение $o = \sqrt[n]{2n}$ (из $o^n = 2n$) требует, чтобы $\sqrt[n]{2n}$ было целым для целого o . Согласно Приложению А, $\sqrt[n]{2n}$ иррационально для $n > 2$. Таким образом, для $n > 2$ не существует целого o , что доказывает невозможность $y \in \mathbb{N}$ в $x^n + y^n = z^n$.

Вывод: возможно, число y скорее всего будет целым положительным при $n = 1$ или $n = 2$.
Отсюда в конечном итоге следует вывод Ферма: это уравнение не имеет решений в целых положительных числах, если и только если $n = 1$ или $n = 2$, т.е. возможно, число y скорее всего будет целым положительным при $n = 1$ или $n = 2$.

6.) Проверка (без учета общего множителя r из (2.7), который был сокращен)

(a) Рассмотрим случай $n = 1$

$$\begin{aligned} z &= m + p \\ x &= m - p \\ y &= 2 \cdot [C_1^1(m^1)^{1-(2 \cdot 0+1)}(p^1)^{(2 \cdot 0+1)}] = 2[1 \cdot 1 \cdot p] = 2p \end{aligned}$$

то есть для случая $n = 1$ мы имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — положительные целые числа и $m > p$.

(b) Рассмотрим случай $n = 2$

$$\begin{aligned} z &= m^2 + p^2 \\ x &= m^2 - p^2 \\ y &= \sqrt{2} \cdot [C_1^2(m^2)^{2-(2 \cdot 0+1)}(p^2)^{(2 \cdot 0+1)}]^{1/2} = \sqrt{2} \cdot [2m^2p^2]^{1/2} = 2mp \end{aligned}$$

то есть для случая $n = 2$ мы также имеем решение в положительных целых числах x, y, z , если m и p — положительные целые числа и $m > p$, или согласно [10], если $m > p$, и m, p — такие нецелые числа, что комбинации с ними дадут положительные целые числа x, y, z , например: $m = 3/\sqrt{2}, p = 1/\sqrt{2}$, в этом случае мы также получаем классическую пифагорову тройку:

$$\begin{aligned} x &= m^2 - p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4 \\ y &= 2 \cdot m \cdot p = 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 3 \\ z &= m^2 + p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} + \frac{1}{2} = 5 \end{aligned}$$

Мы получили классическую пифагорову тройку и видим, что эта формула работает.

7). Рассмотрим теперь более общий случай, когда r не сокращается, чтобы перейти к окончательным формулам типа (2.7). Если r — положительное целое число, то все вышесказанное применимо. Но согласно [10], r — может быть рациональным числом. Например, пусть $r = 0.5$:

(a) Рассмотрим случай $n = 1, m = 4$ и $p = 2$

$$\begin{aligned} x &= 0.5 \cdot (m - p) = 0.5 \cdot (4 - 2) = 1 \\ z &= 0.5 \cdot (m + p) = 0.5 \cdot (4 + 2) = 3 \\ y &= 0.5 \cdot (2 \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot 2) = 2 \end{aligned}$$

Мы видим положительные целые числа. То есть,, m, p должны быть такими, чтобы 7(a) выполнялось аналогично. В этом случае, мы видим, что формула 6(a) работает.

(b) Рассмотрим случай $n = 2, m = 2 \cdot \sqrt{2}, p = \sqrt{2}$,

$$\begin{aligned} x &= 0.5 \cdot (m^2 - p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2\right) = 3 \\ z &= 0.5 \cdot (m^2 + p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2\right) = 5 \\ y &= 0.5 \cdot (2 \cdot m \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot (2 \cdot \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{2})) = 4 \end{aligned}$$

Мы видим положительные целые числа. То есть,, m, p должны быть такими, чтобы 7(b) выполнялось аналогично. В этом случае мы видим, что формула 6(b) работает.

Это сохраняет общность решений для $n = 2$, как видно на примере пифагоровой тройки.

8). Таким образом, случаи $n = 1$ и $n = 2$ **исчерпывают все возможные целочисленные решения**, что согласуется с теоремой.

Проверка показала, что для $n=1$ или для $n=2$, во всех рассмотренных случаях мы имеем решения уравнения $x^n + y^n = z^n$ в положительных целых числах x, y, z

9). **уравнение $x^n + y^n = z^n$ имеет корни в положительных целых числах x, y, z только для $n = 1$ и для $n = 2$**

Ч.Т.Д.

3 Замечание и следствия

ЗАМЕЧАНИЕ. Отметим, что выражение (2.8) можно упростить, а именно

$$\begin{aligned}
 y &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \frac{(m^n)^n}{(m^n)^{2i} m^n} (p^n)^{2i} p^n \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} m^n \frac{1}{m} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{n-2i} \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n}
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетно, и $k = (n-2)/2$, если n четно.

СЛЕДСТВИЕ 1. Рассмотрим случай $m = p$, тогда из выражения (3.1) можно вывести, что

$$\begin{aligned}
 x &= 0 \\
 z &= m^n + m^n = 2m^n \\
 y &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} m \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{m}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n} = \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n}
 \end{aligned}$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетно, и $k = (n-2)/2$, если n четно.

Очевидно, что $y = z$

$$\begin{aligned}
 \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2m^n \\
 \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2,
 \end{aligned}$$

откуда

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = 2^{n-1} \tag{3.2}$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетно, и $k = (n-2)/2$, если n четно.

СЛЕДСТВИЕ 2. На основе (3.2) можно вычислить сумму четных комбинаций.

Рассмотрим треугольник Паскаля [7]:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & & 1 & & \\
 & 1 & & 2 & & 1 & \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
 \end{array}$$

Аналогично вышеизложенному, делается вывод, что

$$\sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2^{n-1} \tag{3.3}$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетно, и $k = (n-2)/2$, если n четно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Разложим

$$(m^n + p^n)^n + (m^n - p^n)^n =$$

в бином [8, 9]:

$$\begin{aligned}
 &= [(m^n)^n + C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^2 (m^n)^{n-2} (p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1} m^n (p^n)^{n-1} + (p^n)^n] + \\
 &+ [(m^n)^n - C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^2 (m^n)^{n-2} (p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1} m^n (p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\
 &= 2C_n^0 (m^n)^n + 2C_n^2 (m^n)^{n-2} (p^n)^2 + \dots + 2C_n^k (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \{2C_n^n (p^n)^n\} = \\
 &= 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (m^n)^{n-2j} (p^n)^{2j}
 \end{aligned}$$

где $s = (n-1)/2$, если n нечетно, и $s = n/2$, если n четно.

Если $m = p$

$$(p^n + p^n)^n + (p^n - p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (p^n)^{n-2j} (p^n)^{2j}$$

$$(2p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \frac{(p^n)^n}{(p^n)^{2j}} (p^n)^{2j}$$

$$2^n (p^n)^n = 2 (p^n)^n \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

$$2^{n-1} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

где $s = (n-1)/2$, если n нечетно, и $s = n/2$, если n четно.

Следствие 2 доказано.

СЛЕДСТВИЕ 3. *Анализируя (3.2) и (3.3), можно заключить, что*

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \quad (3.4)$$

где $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$, если n нечетно, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$, если n четно.

Почему такие границы?

Тип числа	Условие	Последний член в уравнении
Нечетное	$k = 2((n-1)/2)+1 = n$	C_n^n
	$s = 2((n-1)/2) = n-1$	C_n^{n-1}
Четное	$k = 2((n-2)/2)+1 = n-1$	C_n^{n-1}
	$s = 2(n/2) = n$	C_n^n

Таблица 1: Границы биномиальных коэффициентов

Вывод: сумма четных коэффициентов равна сумме нечетных и равна 2^{n-1} , следовательно из (3.4) мы имеем

$$\sum_{r=0}^n C_n^r = \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} + \sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \quad (3.5)$$

где $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$, если n нечетно, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$, если n четно.

4 Заключение

«Трудности» для Ферма заключались в длительности его умозаключений, **изложенных в письменной форме**, поскольку в первой половине семнадцатого века математические обозначения были далеки от их нынешней краткой и разнообразной формы, многие действия приходилось записывать *словами*. **Кроме того, чисто математической проблемой было то, что ему приходилось оперировать совершенно новыми на тот момент понятиями биномов и логарифмов**, оба из которых только появились и их приходилось осваивать «на лету».

Как упоминалось во введении, математические методы эпохи Пьера Ферма, использованные в доказательстве этой статьи, доступны любому студенту первого курса физико-математических факультетов. Это выгодно отличает его от доказательства Эндрю Уайлса, которое довольно сложно для среднего математика из-за использования передовых и запутанных современных математических инструментов.

Ферма, очевидно, «играл» с новыми понятиями, разлагая степени разностей на суммы степеней, и внезапно обнаружил, что, если ограничиться целыми положительными числами в степени, логарифмическое уравнение немедленно дает, что $x^n + y^n = z^n$ (что является разностью, переписанной в виде суммы) верно для целых x, y, z только и если только $n = 1$ или 2 .

Ему (пришлось бы) сначала ввести два новых понятия, чтобы полностью объяснить свое открытие. Можно представить, *сколько места потребовалось бы, чтобы записать все рассуждения*, которые привели его к открытию, *на полях книги, не имея надлежащих символических обозначений, которыми располагает современный математик*.

Почему Пьер Ферма не записал все эти идеи в отдельном документе — это вопрос отдельного специального исследования. Может оказаться, что он действительно был автором такого отдельного документа, который впоследствии был каким-то образом утерян или — альтернативно — сохранился до наших дней, скрытый в архиве, библиотеке или у кого-то на нереализованном хранении.

Автор просит математическое сообщество критически отнестись к изложенным выше рассуждениям и дать свою оценку.

Эта статья была опубликована в виде препринта на платформах ResearchGate и OSF по следующим ссылкам [11, 12].

Список литературы

1. Faltings Gerd, “The Proof of Fermat’s last theorem by R. Taylor and A. Wiles”. *Notices of the AMS*, 42:7 (1995), 743–746.
2. Wiles, A. (1995). Modular Elliptic Curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 141(3), 443–551.
3. Taylor, R., & Wiles, A. (1995). Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 141(3), 553–572.
4. Ribet, K. A. (1990). On modular representations of $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ arising from modular forms. *Inventiones Mathematicae*, **100**, 431–476.
5. Mazur, B. (1977). Modular curves and the Eisenstein ideal. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 47, 33–186.
6. Serre, J.-P. (1987). Sur les représentations modulaires de degré 2 de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. *Duke Mathematical Journal*, **54**(1), 179–230.
7. Савин А. П. и др. Энциклопедический словарь юного математика. — М.: Педагогика, 1985.
8. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. — М.: Наука, 1977.
9. Зайцев В. В., Рыжков В. В., Сканави М. И. Элементарная математика. — М.: Наука, 1976.
10. FERMAT’S LAST THEOREM AND EUCLID’S FORMULAS,
Sergey P. Klykov, Marina Klykova, Препринт, Март 2024,
DOI: 10.13140/RG.2.2.11109.20967
https://www.researchgate.net/publication/379445595_FERMAT’S_LAST_THEOREM_AND_EUCLID’S_FORMULAS
11. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect,
Grigoriy Dedenko, Препринт, Сентябрь 2024,
https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat’s_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect
12. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect,
Grigoriy Dedenko, Препринт, Сентябрь 2024,
<https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>
13. Euler, L. (1770). *Vollständige Anleitung zur Algebra*. St. Petersburg: Kayserliche Academie der Wissenschaften.

А Приложение А. Доказательство иррациональности $\sqrt[n]{2}$ для $n \geq 2$

А.1 Теорема: Число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным для любого целого $n \geq 2$.

А.2 Доказательство:

Будем доказывать от противного. Предположим, что $\sqrt[n]{2}$ — рациональное число. Это означает, что его можно представить в виде несократимой дроби $\frac{p}{q}$, где p и q — целые числа, $q \neq 0$, и у p и q нет общих делителей, кроме 1.

Таким образом, мы имеем:

$$\sqrt[n]{2} = \frac{p}{q}$$

Возведём обе части уравнения в степень n :

$$(\sqrt[n]{2})^n = \left(\frac{p}{q}\right)^n$$

$$2 = \frac{p^n}{q^n}$$

Умножим обе части на q^n :

$$2q^n = p^n$$

Из этого уравнения мы видим, что p^n — чётное число, так как оно равно $2q^n$. Если p^n чётно, то и p должно быть чётным (если бы p было нечётным, то и p^n было бы нечётным).

Поскольку p чётно, мы можем записать его как $p = 2k$, где k — некоторое целое число. Подставим это выражение для p в уравнение $2q^n = p^n$:

$$2q^n = (2k)^n$$

$$2q^n = 2^n k^n$$

Разделим обе части уравнения на 2 (что допустимо, так как $n \geq 2$, и, следовательно, 2^n делится на 2):

$$q^n = 2^{n-1} k^n$$

Поскольку $n \geq 2$, то $n - 1 \geq 1$. Из последнего уравнения мы видим, что q^n — чётное число, так как оно равно $2^{n-1} k^n$, где 2^{n-1} — чётный множитель. Если q^n чётно, то и q должно быть чётным.

Таким образом, мы пришли к выводу, что и p , и q являются чётными числами. Это означает, что у них есть общий делитель 2. Однако в начале доказательства мы предположили, что дробь $\frac{p}{q}$ была несократимой, то есть у p и q нет общих делителей, кроме 1.

Полученное противоречие указывает на то, что наше первоначальное предположение о рациональности $\sqrt[n]{2}$ неверно.

А.3 Вывод:

Следовательно, число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным для любого целого $n \geq 2$.

В Приложение В. Доказательство того, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2n}$ равен 1

В.1 Постановка задачи

Доказать, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2n}$ при n , стремящемся к бесконечности, равен 1.

В.2 Решение

Рассмотрим функцию $f(n) = \sqrt[n]{2n}$. Наша цель — найти предел этой функции при $n \rightarrow \infty$. Перепишем функцию в виде степени:

$$f(n) = (2n)^{\frac{1}{n}}$$

Чтобы найти предел этой функции, рассмотрим натуральный логарифм $f(n)$:

$$\ln(f(n)) = \ln\left((2n)^{\frac{1}{n}}\right)$$

Используя свойства логарифмов, получаем:

$$\ln(f(n)) = \frac{1}{n} \ln(2n)$$

Разделим логарифм произведения на сумму логарифмов:

$$\ln(f(n)) = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Теперь найдём предел $\ln(f(n))$ при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Этот предел имеет неопределённость вида $\frac{\infty}{\infty}$, поэтому мы можем применить правило Лопиталя. Возьмём производные числителя и знаменателя по n :

$$\frac{d}{dn}(\ln(2) + \ln(n)) = \frac{1}{n}$$

$$\frac{d}{dn}(n) = 1$$

Таким образом, предел становится:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Итак, мы нашли, что предел натурального логарифма функции равен 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = 0$$

Теперь, чтобы найти предел исходной функции $f(n)$, воспользуемся непрерывностью экспоненциальной функции:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln(f(n))} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n))} = e^0 = 1$$

В.3 Вывод

Таким образом, мы доказали, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2n}$ при n , стремящемся к бесконечности, равен 1.

С Приложение С. Краткое доказательство монотонности

Хорошо известно, что $\sqrt[n]{2n} \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ (см. Приложение В). Однако в этом приложении мы сосредоточимся на том, чтобы показать, что $(2n)^{1/n}$ является строго убывающей для $n \geq 3$. Ниже приведён один из способов доказать это, используя логарифмическую производную:

С.1 Определим функцию.

Пусть

$$f(n) = (2n)^{\frac{1}{n}}.$$

Удобно работать с её натуральным логарифмом:

$$\ln(f(n)) = \ln((2n)^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} \ln(2n).$$

Обозначим

$$g(n) = \ln(f(n)) = \frac{\ln(2n)}{n} = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}.$$

С.2 Вычислим производную.

Рассматривая n как вещественную переменную $n > 0$, имеем

$$g'(n) = \frac{d}{dn} \left(\frac{\ln(2n)}{n} \right).$$

Используя правило частного,

$$g'(n) = \frac{\frac{d}{dn}[\ln(2n)] \cdot n - \ln(2n) \cdot 1}{n^2} = \frac{\frac{1}{n} \cdot n - \ln(2n)}{n^2} = \frac{1 - \ln(2n)}{n^2}.$$

(Обратите внимание, что $\frac{d}{dn}[\ln(2n)] = \frac{1}{2n} \cdot 2 = \frac{1}{n}$.)

С.3 Знак производной.

Мы хотим увидеть, где $g'(n) < 0$:

$$g'(n) < 0 \iff 1 - \ln(2n) < 0 \iff \ln(2n) > 1 \iff 2n > e \iff n > \frac{e}{2}.$$

Поскольку $e \approx 2.718$, неравенство $n > e/2$ безусловно верно для всех целых $n \geq 2$, и, следовательно, строго для $n \geq 3$. Таким образом, для $n \geq 3$, $g(n)$ строго убывает.

С.4 Следствие для $f(n)$.

Поскольку $f(n) = \exp(g(n))$, а $\exp(\cdot)$ является строго возрастающей функцией своего аргумента, $f(n)$ убывает всякий раз, когда убывает $g(n)$. Следовательно, $f(n)$ действительно строго убывает для $n \geq 3$.

Таким образом, только при $n = 1$ и $n = 2$ $f(n)$ достигает максимального значения 2, а для всех $n \geq 3$ она строго убывает (что согласуется с пределом $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n)^{1/n} = 1$).

С.5 Вывод

Следовательно, мы продемонстрировали, что $f(n)$ строго убывает для $n \geq 3$, либо анализируя производную $\ln(f(n))$ (как показано выше), либо сравнивая $f(n+1)$ и $f(n)$. Это завершает доказательство монотонности $f(n)$.

Д Приложение D: Анализ функций и проверка критических точек

D.1 Введение

Целью этого анализа является изучение поведения функции:

$$f(p, q) = q - \sqrt[q]{qp},$$

и определение её критических точек, где вторая производная $f''(p)$ равна нулю. Это исследование направлено на поддержку выводов, представленных в основной статье, в частности, относительно уникальной роли $o = 2$ в контексте Великой теоремы Ферма:

$$x^n + y^n = z^n.$$

В этой статье число o представляет собой ключевой параметр, связанный с симметрией уравнения. В наших расчётах это соответствует $q = o$. Уникальность $q = 2$ (или $o = 2$) подтверждается как геометрически, так и алгебраически.

D.2 Результаты анализа

D.2.1 Совмещённый график функций

Следующий график (Рис. 1) иллюстрирует три функции, каждая с соответствующими дискретными значениями:

- $1.5 - \sqrt[q]{1.5p}$ (синяя линия) и $1.5 - \sqrt[q]{1.5n}$ (синие квадраты),
- $2 - \sqrt[q]{2p}$ (зелёная линия) и $2 - \sqrt[q]{2n}$ (зелёные квадраты),
- $3 - \sqrt[q]{3p}$ (оранжевая линия) и $3 - \sqrt[q]{3n}$ (оранжевые квадраты).




Рис. 1. Совмещённый график $q - \sqrt[q]{qp}$ для $q = 1.5, 2, 3$. Линии представляют непрерывные p , а квадраты — дискретные n .

D.2.2 Поверхностный график $f(p, q)$

Трёхмерный поверхностный график ниже (Рис. 2) иллюстрирует поведение $f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$ для непрерывных значений $p > 0$ и $q > 0$. Перспектива подчёркивает изменение кривизны при изменении обоих параметров.




Рис. 2. 3D поверхностный график $f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$ для $p > 0$ и $q > 0$.

D.3 Анализ и выводы

- Критическая точка при $p = 2$ существует уникально для $q = 2$, где вторая производная $f''(p)$ равна нулю. Это подчёркивает особую роль $q = 2$ (или $o = 2$).
- Для других значений q критические точки существуют, но они находятся при значениях $p \neq 2$, что показывает, что $q = 2$ уникально в своей симметрии и простоте.

Эти результаты подтверждают двойственную природу решения этой статьи: как **геометрическую**, так и **алгебраическую**. Параметр $o = 2$ служит объединяющей концепцией в анализе Великой теоремы Ферма (см. Приложение E для более подробной информации).

Е Приложение Е: Геометрическая верификация Великой теоремы Ферма через анализ функции $f(p, q)$

В этом приложении мы исследуем связь между функцией

$$f(p, q) = q - \sqrt[n]{qpr}$$

и уравнением Ферма

$$x^n + y^n = z^n.$$

Показано, что для $n = 2$ существует точка перегиба второй производной, что соответствует существованию Пифагоровых троек. Для $n > 2$ эта точка перегиба смещается в сторону меньших значений p , что указывает на изменение математических свойств уравнения и невозможность целочисленных решений.

Е.1 Анализ второй производной

Функция

$$f(p, q) = q - \sqrt[n]{qpr}$$

позволяет нам изучать поведение точек перегиба, которые определяются условием

$$f_p''(p, q) = \frac{\partial^2}{\partial p^2} (q - \sqrt[n]{qpr}) = 0.$$

Точки перегиба важны, потому что они выявляют специфические математические закономерности в уравнении.

Е.2 Дополнительный анализ для переменной q

Также были проведены исследования по переменной q . В точке $q = 2$ (при $p = 2$) первая и вторая частные производные по q равны 0.5. Этот результат указывает на фундаментальное свойство уравнения Ферма в этой точке. Однако в нашем случае переменная q зафиксирована на значении 2, что определяется биномиальными вычислениями, хотя сам факт выделения значения q представляет интерес.

Е.3 Численные результаты

Ниже приведены численные значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных значений p и q :

Таблица 2. Численные значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных p и q .

p	$q = 1.5$	$q = 2.0$	$q = 2.5$	$q = 3.0$	$q = 4.0$
1	2.75	0.77	2.90	0.96	1.10
2	0.17	0.00	-0.11	-0.34	-0.55
3	-0.0056	-0.08	-0.099	-0.21	-0.31
4	-0.018	-0.11	-0.056	-0.12	-0.17
5	-0.014	-0.10	-0.033	-0.067	-0.093

Е.4 Выводы из данных

- При $p = 2, q = 2$ мы имеем $f_p''(p, q) = 0$, что соответствует существованию Пифагоровых троек.
- При $q > 2$ точка перегиба смещается в сторону меньших значений p , что указывает на изменение свойств уравнения и невозможность целочисленных решений.
- Рисунок 3 иллюстрирует поверхность $f_p''(p, q)$ с отмеченными точками перегиба.




Рис. 3. Поверхность второй производной $f_p''(p, q)$, демонстрирующая смещение точки перегиба.

Е.5 Верификация Великой теоремы Ферма

Е.5.1 Связь с точками перегиба

Из данных следует, что:

1. Если точка перегиба находится при $p = n$, то целочисленные решения возможны.
2. Если точка перегиба смещается к меньшим значениям p , то целочисленные решения невозможны.

Таким образом, **только для $n = 2$ возможны целочисленные решения**, в то время как для $n > 2$ свойства уравнения изменяются, исключая такие решения.

Е.5.2 Окончательный вывод

На основании наших расчётов:

- При $q = 2$, точка перегиба соответствует $p = 2 \Rightarrow$ уравнение Ферма имеет целочисленные решения.
- При $q > 2$, точка перегиба смещается к меньшим значениям $p \Rightarrow$ математические свойства уравнения изменяются, и целочисленные решения становятся невозможными.
- Это подтверждает, что уравнение Ферма

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2$$

не имеет решений в целых числах.

Таким образом, функция $f(p, q)$ наглядно демонстрирует, что при $n > 2$ точка перегиба смещается, и свойства уравнения Ферма изменяются, подтверждая невозможность целочисленных решений.

Ф Приложение F: Аксиоматическая формулировка анзаца и вывод ВТФ

F.1 Введение

В этом приложении анзац Деденко представлен в виде независимой аксиомы. Это подчёркивает, что он не является следствием стандартной арифметики, а вводится как дополнительный постулат. В таком аксиоматическом стиле можно строго показать, что при принятии анзаца Великая теорема Ферма (ВТФ) немедленно следует, тогда как при его отклонении доказательство не работает. Таким образом, формализация разделяет гипотезу и вывод, полученный из неё.

Аксиома F.1 (Анзац Деденко). Для любых $n, x, y, z \in \mathbb{N}$ выполняется следующее:

$$n > 2 \wedge x^n + y^n = z^n \implies \exists o \in \mathbb{N}, o > 1 \wedge o^n = 2n.$$

Теорема F.1 (О решениях уравнения $o^n = 2n$). Если $o > 1$ и $o^n = 2n$, то

$$(o, n) \in \{(2, 1), (2, 2)\}.$$

Доказательство F.1. Пусть $o = 2$. Тогда $2^n = 2n$. Это уравнение имеет решения только для $n = 1$ и $n = 2$, поскольку для $n \geq 3$ выполняется неравенство $2^n > 2n$.

Пусть $o \geq 3$. Тогда $o^n \geq 3^n > 2n$ для любого $n \geq 1$, что невозможно, если $o^n = 2n$.

Следовательно, других решений нет. \square

Теорема F.2 (Великая теорема Ферма в рамках анзаца).

$$\forall n > 2, \forall x, y, z \in \mathbb{N}, \quad x^n + y^n \neq z^n.$$

Доказательство F.2. Предположим, вопреки утверждению, что существуют $n > 2$ и $x, y, z \in \mathbb{N}$ такие, что $x^n + y^n = z^n$. Согласно анзацу, существует $o > 1$ такое, что $o^n = 2n$. Но по предыдущей теореме это возможно только для $n = 1$ или $n = 2$. Это противоречие, поскольку $n > 2$. \square

F.2 Пояснение о нецелых значениях o

Частое возражение заключается в том, что в уравнении $o^n = 2n$ параметр o может принимать нецелые значения. Следует сделать несколько уточнений:

- **Ограничение на целые числа.** Реконструкция проводится полностью в рамках натуральных чисел, что соответствует исходной задаче Ферма. Формальная верификация в Coq подтверждает, что только целочисленные пары $(o, n) = (2, 1)$ и $(2, 2)$ удовлетворяют уравнению.
- **Эвристическое наблюдение.** Рассматривая $f(n) = (2n)^{1/n}$, можно видеть, что $o = 2$ — единственное значение, дающее более одного целочисленного решения по n (а именно $n = 1, 2$). Это делает $o = 2$ центром целочисленной стабильности.
- **Анзац как бритва.** Хотя единственное решение с нецелым o не может быть исключено чистой алгеброй, анзац сознательно постулирует, что релевантен только структурно совершенный целочисленный случай $o = 2$. Все остальные случаи отсекаются этим постулатом.
- **Аналитическая уникальность.** Как показано в Приложениях D и E, случай $o = 2, n = 2$ соответствует точке перегиба связанной функции (вторая производная обращается в ноль). Это аналитическое свойство подчёркивает особую роль $o = 2$: при $n = 2$ существуют целочисленные решения, но при $n > 2$ система проходит эту критическую точку, и целочисленные решения исчезают.

Таким образом, анзац — это не отрицание возможных нецелых o , а структурный принцип: если целочисленные решения (x, y, z) существуют, они должны соответствовать уникальному целочисленному случаю $o = 2$, что, в свою очередь, приводит к противоречию для $n > 2$.

Ф.3 Вывод

Аксиоматическое представление подчёркивает:

- анзац является независимым постулатом, а не доказуемым фактом;
- его принятие немедленно влечёт за собой ВТФ для всех $n > 2$;
- с точки зрения формальной логики, это рассуждение имеет структуру

$$\text{Арифметика} + \text{Анзац} \implies \text{ВТФ}.$$


Ф.4 Методологическая аналогия

Ситуация с анзацем Деденко напоминает историю пятого постулата Евклида. Веками предпринимались попытки вывести постулат о параллельных прямых из других аксиом геометрии. Однако он оказался независимым предположением: можно его принять — и получить евклидову геометрию, или заменить его альтернативой — и получить геометрию Лобачевского или Римана.

Аналогично, анзац Деденко не выводится из стандартной арифметики. Если его принять, Великая теорема Ферма становится немедленным следствием. Если его отвергнуть, остаётся современное доказательство Уайлса, использующее теорию эллиптических кривых и модулярных форм.

Замечание Ф.1 (О нецелых значениях o). *Важно подчеркнуть, что исключение нецелых значений o не следует из алгебраического доказательства, а является частью самого анзаца. Анзац выступает как структурный постулат: если бы целочисленные решения уравнения Ферма существовали, они обязательно соответствовали бы целочисленному случаю $o = 2$. При этом предположении дробные или иррациональные o не считаются релевантными, и рассуждение ведётся полностью в области целых чисел.*

F.5 Схема рассуждений



Легенда:

→ Зелёная ветвь: «быстрый путь», если анзац принят (немедленно влечёт ВТФ).

→ Синяя ветвь: исторический путь — без анзаца доказательство возможно только методами Уайлса (1995).