La DISTRIBUZIONE STAZIONARIA/ASINTOTICA del PROCESSO di EHRENFEST

Ricordiamo il PROCESSO di Ehrenfest: ho N biglie da distribuire in 2 URNE

Noto che sarà $\boxed{n}$ $\boxed{N-n}$ ovvero in una urna avrò a un dato istante $0 \leq n \leq N$ biglie (e nell'altra $0 \leq N-n \leq N$ ...)

La DINAMICA era data dicendo che ad ogni istante si estraeva un numero K con $1 \leq K \leq N$ e si CAMBIAVA di POSTO la biglia recante il numero K (ovvero "la biglia num. K" ...)

Attenzione! In termini di MACROSTATI-numero le biglie perdono la loro identità (diventano indistinguibili i MICROSTATI) e una ETICHETTA UNIVOCA delle CONFIGURAZIONI (MACROSTATI di COLORE) è n

Il sistema ha dunque $N+1$ diverse CONFIGURAZIONI, corrispondenti ai possibili valori di $n = 0, 1, 2, \dots, N$

La nostra OSSERVAZIONE EMPIRICA (sperimentale... abbiamo SIMULATO il processo al calcolatore) è che

ASINTOTICAMENTE registriamo lo stesso numero di biglie nelle 2 urne, ovvero la MEDIA ARITMETICA di n sulla EVOLUZIONE del SISTEMA (che possiamo dunque chiamare una MEDIA TEMPORALE)

vale $$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} n(t) \xrightarrow[T\to\infty]{} \frac{N}{2}$$ (dove $n(t)$ è il valore di n al tempo t...)

Il PROCESSO di EHRENFEST è un PROCESSO di MARKOV. Potremmo dunque scrivere la sua MATRICE STOCASTICA W_E, studiarne lo SPETTRO, etc...

... ma per prima cosa procediamo per altra via e studiamo

$P_m(t)$ = PROBABILITA' di avere $\boxed{m}$ (e $\boxed{N-m}$) al tempo t
(ovvero PROB. di avere m biglie nell'urna di riferimento al tempo t)

Notare che chiederci se esista una DISTRIBUZIONE STAZIONARIA equivale a chiedersi se

$$P_m(t) \xrightarrow[t\to\infty]{?} P_m \quad \text{(INDIPENDENTE da } t \text{ per } t \text{ GRANDI!)}$$

Per provarlo scriviamo la EQUAZIONE di EVOLUZIONE TEMPORALE di $P_m(t)$...

Vale che $$P_m(t+1) = P_{m-1}(t)\frac{N-m+1}{N} + P_{m+1}(t)\frac{m+1}{N}$$

Infatti posso avere al tempo $t+1$ $\boxed{m}$ $\boxed{N-m}$

SOLO SE al tempo t era $\boxed{m-1}$ $\boxed{N-m+1}$ e ho estratto da così che $m-1 \to m$

oppure $\boxed{m+1}$ $\boxed{N-m-1}$ e ho estratto da così che $m+1 \to m$

La relazione scritta prima vuol dunque dire ... chiamo $U_1\boxed{m}$ e $U_2\boxed{N-m}$
(ovvero U_1 è l'urna di riferimento, da cui leggo m...)

$$P_m(t+1) = P_{m-1}(t)\cdot(\text{Prob. di aver estratto da } U_2) + P_{m+1}(t)\cdot(\text{Prob. di aver estratto da } U_1)$$

calcolabile "a priori" $\dfrac{\#\text{ favorevoli}}{\#\text{ totali}} = \dfrac{N-m+1}{N}$ → # biglie in U_2...

idem ... calcolabile "a priori" $\dfrac{\#\text{ favorevoli}}{\#\text{ Totali}} = \dfrac{m+1}{N}$ → # biglie in U_1.

Dunque abbiamo provato che

$$P_n(t+1) = P_{n-1}(t)\,\frac{N-n+1}{N} + P_{n+1}(t)\,\frac{n+1}{N}$$

Ora passo ad un' <u>ALTRA DESCRIZIONE</u> in termini di quella che chiamo la

$$\underbrace{\text{FUNZIONE GENERATRICE} \quad \rho(x,t) = \sum_{n=0}^{N} P_n(t)\, x^n}$$

Nota che

1. $\rho(x,t)$ è un <u>POLINOMIO di GRADO N</u> nella variabile x, che era totalmente estranea al problema originario...

2. La <u>DIPENDENZA</u> di $\rho(x,t)$ è tramite i COEFFICIENTI $P_n(t)$ <u>dal tempo</u>

3. Calcolare la $\rho(x,t)$ o le sue derivate in $x=1$ o $x=0$ mi dice tutto delle $P_n(t)$ (che sono le quantità di interesse...)

Infatti per $x=1$ $\quad \rho(x=1,t) = \sum_{n=0}^{N} P_n(t) \longrightarrow$ CONDIZ. di NORMALIZZAZIONE... (sono probabilità...)

per $x=0$ $\quad \rho(x=0,t) = P_0(t)$

Viceversa $\frac{d}{dx}\rho(x,t) = \sum_{n=1}^{N} P_n(t)\, n\, x^{n-1}$ e dunque $\left.\frac{d}{dx}\rho(x,t)\right|_{x=0} = P_1(t)$

mentre $\frac{d^2}{dx^2}\rho(x,t) = \sum_{n=2}^{N} P_n(t)\, n(n-1)\, x^{n-2}$ e dunque $\left.\frac{d^2}{dx^2}\rho(x,t)\right|_{x=0} = 2\,P_2(t$

... e in generale ... $\left.\frac{d^n}{dx^n}\rho(x,t)\right|_{x=0} = n!\, P_n(t)$

Ora prendo $P_m(t+1) = P_{m-1}(t)\,\frac{N-m+1}{N} + P_{m+1}(t)\,\frac{m+1}{N}$ e la RISCRIVO <u>in termini di $\rho(x,t)$</u>

Basta moltiplicare entrambi i membri per x^m e sommare su m da 0 a $N+1$... Ottengo

$$\sum_{m=0}^{N+1} P_m(t+1)\,x^m = \rho(x,t+1) = \frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N+1} P_{m-1}(t)\,(N-m+1)\,x^m + \frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N+1} P_{m+1}(t)\,(m+1)\,x^m$$

$$= \sum_{m=0}^{N+1} P_{m-1}(t)\,x^m - \frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N+1} P_{m-1}(t)\,(m-1)\,x^m + \frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N+1} P_{m+1}(t)\,(m+1)\,x^m$$

[<u>Attenzione!</u> (!)
$P_{N+1}(t) = P_{N+2}(t) = P_{-1}(t) = 0 \ldots$]

e ora noto che $\sum_{m=0}^{N+1} P_{m-1}(t)\,(m-1)\,x^m = x^2 \sum_{m=0}^{N+1} P_{m-1}(t)\,(m-1)\,x^{m-2} = x^2 \frac{d}{dx}\rho(x,t)$

$$\sum_{m=0}^{N+1} P_{m-1}(t)\,x^m = x \sum_{m=0}^{N+1} P_{m-1}(t)\,x^{m-1} = x\,\rho(x,t)$$

$$\sum_{m=0}^{N+1} P_{m+1}(t)\,(m+1)\,x^m = \frac{d}{dx}\rho(x,t)$$

(*) Ad esempio...
$$\sum_{m=0}^{N+1} P_{m+1}(t)\,(m+1)\,x^m = \sum_{m'=1}^{N+2} P_{m'}\,m'\,x^{m'-1} \overset{\text{cfr (!)}}{=} \sum_{m=1}^{N} m\,P_m\,x^{m-1} = \frac{d}{dx}\rho(x,t)$$

(CONVINCETEVENE!) ... per cui ... (moltiplico per N...)
(*)

$$N\rho(x,t+1) = Nx\,\rho(x,t) - x^2\frac{d}{dx}\rho(x,t) + \frac{d}{dx}\rho(x,t)$$

$$= Nx\,\rho(x,t) + (1-x^2)\frac{d}{dx}\rho(x,t)$$

Ma ATTENZIONE! Se $\exists \lim_{t\to\infty} P_m(t) = P_m$ allora anche $\rho(x,t) \xrightarrow[t\to\infty]{} \rho(x) = \sum_m P_m x^m$

e dunque ottengo che entrambi i membri perdono la dipendenza da t (in questo limite)

ovvero $N\rho(x) = Nx\,\rho(x) + (1-x^2)\frac{d}{dx}\rho(x)$

che riscrivo $N(1-x)\,\rho(x) = (1-x^2)\frac{d}{dx}\rho(x)$

ovvero ancora
$(\rho(x) = 0)$ $\quad \dfrac{\frac{d}{dx}\rho(x)}{\rho(x)} = \dfrac{N}{1+x}$ che è una EQUAZIONE DIFFERENZIALE (del 1° ordine)

E' una <u>EQUAZIONE</u> DIFFERENZIALE perché l'<u>INCOGNITA</u> è la <u>FUNZIONE $p(x)$</u>, differenziale perché la incognita (la $p(x)$ appunto...) deve soddisfare delle relazioni che legano fra di loro una funzione di x $\left(\frac{N}{1+x}\right)$, la funzione incognita $(p(x))$ e la sua derivata prima $\left(\frac{d}{dx}p(x)\right)$. Il fatto che la derivata di grado max coinvolta sia la prima qualifica la equazione differenziale <u>del primo ordine</u>.

<u>Osserviamo</u> che la funzione $p(x) = \mathcal{N}(1+x)^N$ soddisfa la equazione $\forall \mathcal{N}$ costante

Infatti $\frac{d}{dx}\mathcal{N}(1+x)^N = \mathcal{N}N(1+x)^{N-1}$ e dunque $\dfrac{\frac{d}{dx}\mathcal{N}(1+x)^N}{\mathcal{N}(1+x)^N} = \dfrac{N}{1+x}$

Qual è il SIGNIFICATO di $\mathcal{N}$? Tecnicamente ha a che fare con la CONDIZIONE INIZIALE, ovvero al VALORE di $p(x)$ per un determinato valore di x.

<u>Infatti</u> $p(x)\Big|_{x=1} = \sum P_n = 1$, come già osservato...