

ȘTEFAN ALEXANDRA - MARIA

GRUPA 103

LUCRARE ANALIZĂ 1.

I.

1.2. $a=1, b=2, c=1$; $\sup B=?$ $\inf B=?$ $\min B=?$ $\max B=?$ (\mathbb{R})

$$B = \left\{ (-1)^n \cdot \frac{am + bm + 1}{m + c} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B = \left\{ (-1)^n \cdot \frac{m + 2m + 1}{m + 1} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Arătăm că $\nexists \inf B, \nexists \sup B \in \mathbb{R}$.

Pentru aceasta vom reduce la absurd că

(i) $\alpha \in \mathbb{R}$ astfel încât $b \geq \alpha, \forall b \in B \Rightarrow$

$$\Rightarrow (-1)^n \cdot \frac{m + 2m + 1}{m + 1} \geq \alpha, \forall m, n \in \mathbb{N}.$$

$$m = 1 \Rightarrow (-1)^n \cdot \frac{2m + 2}{2} \geq \alpha, (\forall) m \in \mathbb{N} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (-1)^n \cdot (m + 1) \geq \alpha, \forall m \in \mathbb{N}.$$

Pentru m - impar $\Rightarrow -(m + 1) \geq \alpha, (\forall) m \in 2\mathbb{N} + 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow m + 1 \leq -\alpha, \forall m \in 2\mathbb{N} + 1, \text{ contradicție.}$$

Deci $\nexists \inf B \in \mathbb{R}$ (pentru că B nu are minimul).

Pentru aceasta vom reduce la absurd că

(ii) $\beta \in \mathbb{R}$ astfel încât $b \leq \beta, \forall b \in B \Rightarrow$

$$\Rightarrow (-1)^n \cdot \frac{m + 2m + 1}{m + 1} \leq \beta, \forall m, n \in \mathbb{N} \Rightarrow$$

$$\text{Dacă } m = 1 \Rightarrow (-1)^n \cdot \frac{2m + 2}{2} \leq \beta, \forall m \in \mathbb{N} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (-1)^n \cdot (m + 1) \leq \beta, \forall m \in \mathbb{N}.$$

Pentru m - par $\Rightarrow m + 1 \leq \beta, \forall m \in 2\mathbb{N}$, contradicție.

Deci $\nexists \sup B \in \mathbb{R}$ (pentru că B nu are maximul).

Din cele de mai sus, avem și că mulțimea

B este nemărginită inferior și superior \Rightarrow

$$\Rightarrow \nexists \min B, \nexists \max B \in \mathbb{R}.$$

II.

2.1. $x_n = 2^n - \frac{1}{n^2} + 4.$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (2^n - \frac{1}{n^2} + 4) = \infty - 0 + 4 = \infty.$$

Arătați $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_\varepsilon$ să avem $|x_n| > \varepsilon. (=)$

$$\Rightarrow \underbrace{2^n - \frac{1}{n^2} + 4}_{>0} > \varepsilon \quad (=)$$

$$\Rightarrow 2^n - \frac{1}{n^2} + 4 > \varepsilon, \quad \forall n \geq n_\varepsilon$$

Alteleg $n_\varepsilon = \begin{cases} 0, & \text{dacă } \varepsilon < 1. \\ \lceil \log_2 \varepsilon \rceil + 1, & \text{dacă } \varepsilon \geq 1. \end{cases}$

Pentru $\varepsilon < 1$, este evident că $2^n - \frac{1}{n^2} + 4 > \varepsilon, \forall n \geq 0.$

Pentru $\varepsilon \geq 1$, arătați că $2^n - \frac{1}{n^2} + 4 > \varepsilon, \forall n \geq \lceil \log_2 \varepsilon \rceil + 1.$

$$n \geq \lceil \log_2 \varepsilon \rceil + 1 > \log_2 \varepsilon \Rightarrow 2^n > \varepsilon$$

$$4 > \frac{1}{n^2} \quad (n^2 > \frac{1}{4}) \Rightarrow 4 - \frac{1}{n^2} > 0 \quad \} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2^n + 4 - \frac{1}{n^2} > \varepsilon, \text{ ceea ce trebuia demonstrat.}$$

În concluzie, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty.$

III.

c) $a = -3$.

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = ?$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = ?$

$$x_n = (-1)^{\frac{n(n+1)(n+2)}{3}} + \left(-\frac{1}{3}\right)^n + \cos n\pi, n \in \mathbb{N}$$

$a = -3 \Rightarrow$
 $\Rightarrow x_n = (-1)^{\frac{n(n+1)(n+2)}{3}} + \left(\frac{1}{3}\right)^n + \cos n\pi, n \in \mathbb{N}$.

$\underbrace{n(n+1)(n+2)}_2 : 6, \forall n \in \mathbb{N}$. (este divizibil cu 2 și cu 3, deoarece este produs de 3 numere consecutive) $\Rightarrow \frac{n(n+1)(n+2)}{3} : 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow x_n = 1 + \left(\frac{1}{3}\right)^n + \cos n\pi, n \in \mathbb{N}$.

I : $n = 2k \Rightarrow x_{2k} = 1 + \left(\frac{1}{3}\right)^{2k} + \frac{\cos(2k\pi)}{1} = 2 + \left(\frac{1}{3}\right)^{2k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty}$

$\rightarrow 2 + 0 = 2 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = 2$.

II : $n = 2k+1 \Rightarrow x_{2k+1} = 1 + \left(\frac{1}{3}\right)^{2k+1} + \frac{\cos((2k+1) \cdot \pi)}{-1} \xrightarrow{k \rightarrow \infty}$

$\rightarrow 1 + 0 - 1 = 0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k+1} = 0$.

Deci $\alpha((x_n)_n) = \{0, 2\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.