Exercitii

1. a) Studiati continuitatea funcției f;
b) Determinați 3f, 3f;
c) Studiați diferențiabilitatea funcției f,

i) $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}; (x,y) \neq (0,0) \\ 0; (x,y) = (0,0). \end{cases}$

ii) $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^6 y^5}{x^{10} + y^{10}}; & (x,y) \neq (0,0) \\ 0; & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

iii) $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^4} ; (x,y) \neq (0,0) \\ 0 ; (x,y) = (0,0). \end{cases}$

iv) $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, f(x,y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cdot \omega \cdot \frac{1}{x^2 + y^2}; (x,y) \neq (0,0) \\ 0; (x,y) = (0,0). \end{cases}$

V)
$$f: \mathbb{R}^{2} \to \mathbb{R}, \ f(x,y) = \begin{cases} \frac{x}{y} & \text{if } (x,y) \neq (0,0) \\ \sqrt{x^{4} + y^{4}} & \text{if } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Vi) $f: \mathbb{R}^{2} \to \mathbb{R}, \ f(x,y) = \begin{cases} \frac{x}{x^{4} + y^{4}} & \text{if } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{if } (x,y) = (0,0). \end{cases}$

Vii) $f: \mathbb{R}^{2} \to \mathbb{R}, \ f(x,y) = \begin{cases} \frac{(x^{2} - y^{2})^{2}}{x^{2} + y^{2}} & \text{if } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{if } (x,y) = (0,0). \end{cases}$

Viii) $f: \mathbb{R}^{2} \to \mathbb{R}, \ f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^{2}y^{2}}{x^{2} + y^{2}} & \text{if } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{if } (x,y) = (0,0). \end{cases}$

2. Fie $Y: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ so functie diferentiabilà si $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = Y(x x^4 \text{ sin } z, x, y, z)$. Determinați $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial z}$. 3. Fie $Y: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ so functie diferentiabilă si $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = Y(x^2 y, \text{sin}(x, y), x^2 x^3)$. Determinați $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$.

- 4. Fix $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x,y) = x^3y + x^2y^3 + 2xy$.
- a) Determinați derivatele parțiale de ordinul doi ale funcției f.
 - b) Determinati df(1,2) și d²f(1,2).
 - c) Determinati polinomul Taylor de ordinul doi asociat funcției f în punctul (1,2) (i.e. $T_2(x,y)$).
 - d) Determinați polinomul Taylor de odinul trei asociat funcției f în punctul (1,2) (i.e. $T_3(x,y)$).