第7章 c: 可降阶微分方程

数学系 梁卓滨

2016-2017 **学年** II



提要

假设 y = y(x) 为未知函数,探讨如何求解以下三种类型的可降阶微分方程:

- $y^{(n)} = f(x)$
- y'' = f(x, y')
- y'' = f(y, y')



We are here now...

♦
$$y^{(n)} = f(x)$$
 型的微分方程



计算通解的方法: 连续n次积分

计算通解的方法: 连续
$$n$$
次积分
$$y^{(n)} = f(x)$$



计算通解的方法: 连续
$$n$$
次积分
$$y^{(n)} = f(x)$$

$$\xrightarrow{\text{两边积分}} y^{(n-1)} = \int f(x) dx + C_1$$

计算通解的方法:连续n次积分
$$y^{(n)} = f(x)$$
 $\xrightarrow{\text{两边积分}}$ $y^{(n-1)} = \int f(x)dx + C_1$ $\xrightarrow{\text{两边积分}}$

计算通解的方法: 连续
$$n$$
次积分
$$y^{(n)} = f(x)$$
 $\xrightarrow{\text{两边积分}} y^{(n-1)} = \int f(x)dx + C_1$ $\xrightarrow{\text{两边积分}} y^{(n-2)} = \int \left[\int f(x)dx + C_1 \right] dx + C_2$

计算通解的方法: 连续n次积分
$$y^{(n)} = f(x)$$

$$\xrightarrow{\text{两边积分}} y^{(n-1)} = \int f(x)dx + C_1$$

$$\xrightarrow{\text{两边积分}} y^{(n-2)} = \int \left[\int f(x)dx + C_1 \right] dx + C_2$$

计算通解的方法: 连续n次积分

$$y^{(n)} = f(x)$$

两边积分 $(n-1)$

$$\xrightarrow{\text{两边积分}} y^{(n-1)} = \int f(x)dx + C_1$$

$$y^{(n-2)} = \int \left[\int f(x) dx + C_1 \right] dx + C_2$$

.

两边积分
$$y = \int \left\{ \cdots \int \left[\int f(x)dx + C_1 \right] dx + C_2 \cdots \right\} dx + C_n$$



解

$$y''' = e^{2x} - \cos x \Rightarrow$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \Rightarrow y'' =$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \frac{1}{2}e^{2x$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x}$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$
$$\Rightarrow \quad y =$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$
$$\Rightarrow \quad y = \frac{1}{8}e^{2x}$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$
$$\Rightarrow \quad y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow \quad y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求
$$y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$$
 的通解

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求
$$y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$$
 的通解

$$y'''' = x^{-\frac{1}{2}} \quad \Rightarrow \quad$$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求
$$y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$$
 的通解

$$y''' = x^{-\frac{1}{2}} \quad \Rightarrow \quad y'' =$$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求
$$y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$$
 的通解

$$y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = x^{\frac{1}{2}}$$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow \quad y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求
$$y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$$
 的通解

$$y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}$$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

$$y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1$$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

$$y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1 \implies y' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1$$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

$$y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1 \implies y' = x^{\frac{1}{2}}$$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

$$y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1 \implies y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

$$y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1 \implies y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C_1x$$



解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

$$y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1 \implies y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C_1x + C_2$$



解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

$$y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1 \implies y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C_1x + C_2$$



解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \implies y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

解 连续网边积分
$$y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1 \implies y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C_1x + C_2$$

$$\implies y = x^{\frac{5}{2}}$$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

 $y = \sqrt{x}$

解 连续两边积分 $y''' = x^{-\frac{1}{2}} \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1 \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C_1x + C_2$ $\Rightarrow \quad y = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

解 连续两边积分 $y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1 \implies y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C_1x + C_2$ $\Rightarrow y = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} C_1 x^2$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

解 连续两边积分 $y''' = x^{-\frac{1}{2}} \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1 \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C_1x + C_2$ $\Rightarrow \quad y = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x$

解 连续两边积分

$$y''' = e^{2x} - \cos x \quad \Rightarrow \quad y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$
$$\Rightarrow \quad y' = \frac{1}{4}e^{2x} - \cos x + C_1x + C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}e^{2x} - \sin x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

例 求 $y''' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的通解

解 连续两边积分 $y''' = x^{-\frac{1}{2}} \implies y'' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + C_1 \implies y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C_1x + C_2$ $\Rightarrow y = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$

We are here now...

♣
$$y'' = f(x, y')$$
 型的微分方程



将 y'' = f(x, y') 看成关于 y' 的一阶微分方程。

计算通解的方法:

将 y'' = f(x, y') 看成关于 y' 的一阶微分方程。

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得

将 y'' = f(x, y') 看成关于 y' 的一阶微分方程。

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得

$$=f(x, p)$$

将 y'' = f(x, y') 看成关于 y' 的一阶微分方程。

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得

$$p' = f(x, p)$$

将 y'' = f(x, y') 看成关于 y' 的一阶微分方程。

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得

$$p' = f(x, p)$$

(降阶得到关于 p 的一阶微分方程)

将 y'' = f(x, y') 看成关于 y' 的一阶微分方程。

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得

$$p' = f(x, p)$$

(降阶得到关于 p 的一阶微分方程)

2. 利用求解一阶微分方程的方法, 假设可求出通解

将 y'' = f(x, y') 看成关于 y' 的一阶微分方程。

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得

$$p' = f(x, p)$$

(降阶得到关于 p 的一阶微分方程)

2. 利用求解一阶微分方程的方法, 假设可求出通解

$$p=\varphi(x,\,C_1)$$

3. 代回变量 p = y' 得:

将 y'' = f(x, y') 看成关于 y' 的一阶微分方程。

计算诵解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得

$$p' = f(x, p)$$

(降阶得到关于 p 的一阶微分方程)

2. 利用求解一阶微分方程的方法, 假设可求出通解

$$p=\varphi(x,\,C_1)$$

3. 代回变量 p = y' 得:

$$y' = \varphi(x, C_1)$$



将 y'' = f(x, y') 看成关于 y' 的一阶微分方程。

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = v', 得

$$p' = f(x, p)$$

(降阶得到关于 p 的一阶微分方程)

2. 利用求解一阶微分方程的方法, 假设可求出通解

$$p = \varphi(x, C_1)$$

3. 代回变量 p = y' 得:

$$y'=\varphi(x,\,C_1)$$

所以

$$y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$$

例 求 $(1+x^2)y'' = 2xy'$ 的通解

解

例 求 $(1 + x^2)y'' = 2xy'$ 的通解

解 1. 作变量代换 p = y', 得

例 求
$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

例 求
$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

例 求
$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

$$\frac{1}{p}dp = \frac{2x}{1+x^2}dx$$

例 求
$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

$$\frac{1}{p}dp = \frac{2x}{1+x^2}dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{p}dp = \int \frac{2x}{1+x^2}dx$$

例 求
$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

$$\frac{1}{p}dp = \frac{2x}{1+x^2}dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{p}dp = \int \frac{2x}{1+x^2}dx$$
$$\Rightarrow \quad \ln|p| = \ln(1+x^2) + C_1'$$

例 求
$$(1+x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

$$\frac{1}{p}dp = \frac{2x}{1+x^2}dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{p}dp = \int \frac{2x}{1+x^2}dx$$
$$\Rightarrow \quad \ln|p| = \ln(1+x^2) + C_1'$$
$$\Rightarrow \quad p = C_1(1+x^2)$$

例 求
$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

2. 这是可分离变量微分方程

$$\frac{1}{p}dp = \frac{2x}{1+x^2}dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{p}dp = \int \frac{2x}{1+x^2}dx$$
$$\Rightarrow \quad \ln|p| = \ln(1+x^2) + C_1'$$
$$\Rightarrow \quad p = C_1(1+x^2)$$

3. 还原变量

例 求
$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

2. 这是可分离变量微分方程

$$\frac{1}{p}dp = \frac{2x}{1+x^2}dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{p}dp = \int \frac{2x}{1+x^2}dx$$
$$\Rightarrow \quad \ln|p| = \ln(1+x^2) + C_1'$$
$$\Rightarrow \quad p = C_1(1+x^2)$$

3. 还原变量

$$y' = C_1(1+x^2)$$

例 求
$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

2. 这是可分离变量微分方程

$$\frac{1}{p}dp = \frac{2x}{1+x^2}dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{p}dp = \int \frac{2x}{1+x^2}dx$$
$$\Rightarrow \quad \ln|p| = \ln(1+x^2) + C_1'$$
$$\Rightarrow \quad p = C_1(1+x^2)$$

3. 还原变量 , 并两边积分

$$v' = C_1(1+x^2)$$

例 求
$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

2. 这是可分离变量微分方程

$$\frac{1}{p}dp = \frac{2x}{1+x^2}dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{p}dp = \int \frac{2x}{1+x^2}dx$$
$$\Rightarrow \quad \ln|p| = \ln(1+x^2) + C_1'$$
$$\Rightarrow \quad p = C_1(1+x^2)$$

3. 还原变量,并两边积分

$$y' = C_1(1 + x^2) \implies y = C_1 \int (1 + x^2) dx$$

例 求
$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

2. 这是可分离变量微分方程

$$\frac{1}{p}dp = \frac{2x}{1+x^2}dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{p}dp = \int \frac{2x}{1+x^2}dx$$

$$\Rightarrow \quad \ln|p| = \ln(1+x^2) + C_1'$$

$$\Rightarrow \quad p = C_1(1+x^2)$$

3. 还原变量,并两边积分

$$y' = C_1(1+x^2) \implies y = C_1 \int (1+x^2) dx = C_1 \left(\frac{1}{3}x^3 + x + C_2\right)$$



例 求
$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$
 的通解

$$p' = \frac{2x}{1 + x^2}p$$

2. 这是可分离变量微分方程

$$\frac{1}{p}dp = \frac{2x}{1+x^2}dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{p}dp = \int \frac{2x}{1+x^2}dx$$
$$\Rightarrow \quad \ln|p| = \ln(1+x^2) + C_1'$$
$$\Rightarrow \quad p = C_1(1+x^2)$$

3. 还原变量 , 并两边积分

$$y' = C_1(1+x^2)$$
 \Rightarrow $y = C_1 \int (1+x^2)dx = C_1\left(\frac{1}{3}x^3 + x + C_2\right)$

思考 求在初始条件 $y|_{x=0} = 1$, $y'|_{x=0} = 3$ 的特解



解

解 1. 作变量代换 p = y', 得

解 1. 作变量代换 p = y', 得

$$p' = p + x$$

解 1 作变量代换 p = y', 得

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

解 1 作变量代换 p = y', 得

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

2. 这是一阶线性微分方程

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分
- 2.2 常数变易

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分 p'-p=0
- 2.2 常数变易

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分 p'-p=0 ⇒ $p=Ce^x$
- 2.2 常数变易

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分 p'-p=0 ⇒ $p=Ce^x$
- 2.2 常数变易 $p = u(x)e^x$

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分 p'-p=0 ⇒ $p=Ce^x$
- 2.2 常数变易 $p = u(x)e^x \Rightarrow u'e^x = x$

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分 p'-p=0 ⇒ $p=Ce^x$
- 2.2 常数变易 $p = u(x)e^x \Rightarrow u'e^x = x \Rightarrow u' = xe^{-x}$

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分 $p'-p=0 \Rightarrow p=Ce^x$
- 2.2 常数变易 $p = u(x)e^x \Rightarrow u'e^x = x \Rightarrow u' = xe^{-x}$

$$\Rightarrow u = \int xe^{-x}dx =$$

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分 p'-p=0 ⇒ $p=Ce^x$
- 2.2 常数变易 $p = u(x)e^x \Rightarrow u'e^x = x \Rightarrow u' = xe^{-x}$ $\Rightarrow u = \int xe^{-x} dx = -(1+x)e^{-x} + C_1$

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分 $p'-p=0 \Rightarrow p=Ce^x$
- 2.2 常数变易 $p = u(x)e^x \Rightarrow u'e^x = x \Rightarrow u' = xe^{-x}$ $\Rightarrow u = \int xe^{-x}dx = -(1+x)e^{-x} + C_1$ $\Rightarrow p = -(1+x) + C_1e^x$

例 求
$$y'' = y' + x$$
 的通解

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分 $p'-p=0 \Rightarrow p=Ce^x$
- 2.2 常数变易 $p = u(x)e^x \Rightarrow u'e^x = x \Rightarrow u' = xe^{-x}$ $\Rightarrow u = \int xe^{-x}dx = -(1+x)e^{-x} + C_1$ $\Rightarrow p = -(1+x) + C_1e^x$
- 3. 还原变量

$$v' = -(1+x) + C_1 e^x$$

例 求
$$y'' = y' + x$$
 的通解

解 1. 作变量代换 p = y', 得

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分 $p'-p=0 \Rightarrow p=Ce^x$
- 2.2 常数变易 $p = u(x)e^x \Rightarrow u'e^x = x \Rightarrow u' = xe^{-x}$ $\Rightarrow u = \int xe^{-x} dx = -(1+x)e^{-x} + C_1$

$$\Rightarrow p = -(1+x) + C_1 e^x$$

3. 还原变量 , 并两边积分

$$v' = -(1+x) + C_1 e^x$$



解 1. 作变量代换 p = y', 得

$$p' = p + x \Rightarrow p' - p = x$$

- 2. 这是一阶线性微分方程
- 2.1 齐次部分 $p'-p=0 \Rightarrow p=Ce^x$
- 2.2 常数变易 $p = u(x)e^x \Rightarrow u'e^x = x \Rightarrow u' = xe^{-x}$ $\Rightarrow u = \int xe^{-x} dx = -(1+x)e^{-x} + C_1$

$$\int p = -(1+x) + C_1 e^x$$

3. 还原变量 ,并两边积分

$$y' = -(1+x) + C_1 e^x \Rightarrow y = -x - \frac{1}{2}x^2 + C_1 e^x + C_2$$



We are here now...



计算通解的方法:

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得:

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得:

$$=f(y, p)$$

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得:

$$\frac{dp}{dx} = f(y, p)$$

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得:

$$\frac{dp}{dx} = f(y, p)$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得:

$$\frac{dp}{dx} = f(y, p)$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得:

$$\frac{dp}{dx} = f(y, p)$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$p\frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得:

$$\frac{dp}{dx} = f(y, p)$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$p\frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

(至此,降阶得到关于 p 的一阶微分方程,自变量为 y)

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得:

$$\frac{dp}{dx} = f(y, p)$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$p\frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

(至此,降阶得到关于 p 的一阶微分方程,自变量为 y)

3. 假设可解得:

$$p = \varphi(y, C_1)$$



计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得:

$$\frac{dp}{dx} = f(y, p)$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$p\frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

(至此,降阶得到关于 p 的一阶微分方程,自变量为 y)

3. 假设可解得:

$$y'=p=\varphi(y,\,C_1)$$

计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得:

$$\frac{dp}{dx} = f(y, p)$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$p\frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

(至此,降阶得到关于 p 的一阶微分方程,自变量为 y)

3. 假设可解得:

$$y' = p = \varphi(y, C_1) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \varphi(y, C_1)$$



计算通解的方法:

1. 作变量代换 p = y', 得:

$$\frac{dp}{dx} = f(y, p)$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$p\frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

(至此,降阶得到关于p的一阶微分方程,自变量为y)

3. 假设可解得:

$$y' = p = \varphi(y, C_1) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \varphi(y, C_1)$$

所以

$$x = \int \frac{1}{\varphi(y, C_1)} dy + C_2$$

解 1 作变量代换 p = y':

解 1. 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

解 1. 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$

解 1 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$

解 1 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

解 1. 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$\Rightarrow yp\frac{dp}{dy} - p^2 = 0$$

解 1. 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dv} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dv}$ 。代入上式得:

$$\Rightarrow yp\frac{dp}{dy} - p^2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{p}dp = \frac{1}{y}dy$$

解 1. 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$\Rightarrow yp\frac{dp}{dy} - p^2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{p}dp = \frac{1}{y}dy$$

3 这是分离变量方程,两边积分:

解 1. 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$\Rightarrow yp\frac{dp}{dy} - p^2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{p}dp = \frac{1}{y}dy$$

3. 这是分离变量方程, 两边积分:

$$\int \frac{1}{p} dp = \int \frac{1}{y} dy$$

解 1. 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$\Rightarrow yp\frac{dp}{dy} - p^2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{p}dp = \frac{1}{y}dy$$

3. 这是分离变量方程, 两边积分:

$$\int \frac{1}{p} dp = \int \frac{1}{y} dy \quad \Rightarrow \quad \ln|p| = \ln|y| + C_1'$$

解 1 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$\Rightarrow yp\frac{dp}{dy} - p^2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{p}dp = \frac{1}{y}dy$$

3. 这是分离变量方程, 两边积分:

$$\int \frac{1}{p} dp = \int \frac{1}{y} dy \quad \Rightarrow \quad \ln|p| = \ln|y| + C_1' \quad \Rightarrow \quad p = C_1 y$$

解 1 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$\Rightarrow yp\frac{dp}{dy} - p^2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{p}dp = \frac{1}{y}dy$$

3. 这是分离变量方程, 两边积分:

$$\int \frac{1}{p} dp = \int \frac{1}{y} dy \quad \Rightarrow \quad \ln|p| = \ln|y| + C_1' \quad \Rightarrow \quad p = C_1 y$$

4. 还原变量:

解 1. 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$\Rightarrow yp\frac{dp}{dy} - p^2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{p}dp = \frac{1}{y}dy$$

3. 这是分离变量方程,两边积分:

$$\int_{p}^{1} dp = \int_{v}^{1} dy \quad \Rightarrow \quad \ln|p| = \ln|y| + C'_{1} \quad \Rightarrow \quad p = C_{1}y$$

4. 还原变量:

$$\frac{dy}{dx} = C_1 y$$

解 1. 作变量代换 p = y':

$$y\frac{dp}{dx} - p^2 = 0$$

2. 改写: $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。代入上式得:

$$\Rightarrow yp\frac{dp}{dy} - p^2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{p}dp = \frac{1}{y}dy$$

3. 这是分离变量方程,两边积分:

$$\int_{p}^{1} dp = \int_{v}^{1} dy \quad \Rightarrow \quad \ln|p| = \ln|y| + C_{1}' \quad \Rightarrow \quad p = C_{1}y$$

4. 还原变量:

$$\frac{dy}{dx} = C_1 y \quad \Rightarrow \quad y = C_2 e^{C_1 x}.$$



解 作变量代换 p = y':

解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^3 \frac{dp}{dx} + 1 = 0$$

解 作变量代换
$$p = y'$$
:
$$dp \qquad \qquad _{3}c$$

$$p\frac{dp}{dy} \qquad y^3 \frac{dp}{dx} + 1 = 0$$

解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^{3}p\frac{dp}{dv} + 1 = y^{3}\frac{dp}{dx} + 1 = 0$$

解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^3p\frac{dp}{dy} + 1 =$$

解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^3p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow$$
 $pdp = -y^{-3}dy$

解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^{3}p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^{3}p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1}$$

解 作变量代换 p = y':

$$y^{3}p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1} \xrightarrow{\underset{y=1, p=0}{\times}}$$

解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^{3}p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1} \xrightarrow{\frac{x=1}{y}} C_{1} = -\frac{1}{2},$$

解 作变量代换 p = y':

$$y^{3}p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1} \xrightarrow{\underset{y=1, p=0}{\longrightarrow}} C_{1} = -\frac{1}{2}, p^{2} = y^{-2} - 1$$

解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^{3}p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1} \xrightarrow{\underset{y=1, p=0}{\xrightarrow{x=1}}} C_{1} = -\frac{1}{2}, p^{2} = y^{-2} - 1$$

$$\Rightarrow p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^{3}p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1} \xrightarrow{\frac{x=1}{y}} C_{1} = -\frac{1}{2}, p^{2} = y^{-2} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^{3}p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1} \xrightarrow{\frac{x=1}{y=1}, p=0} C_{1} = -\frac{1}{2}, p^{2} = y^{-2} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{ydy}{\sqrt{1 - y^{2}}} = \pm dx$$



解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^{3}p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1} \xrightarrow{\frac{x=1}{y}} C_{1} = -\frac{1}{2}, p^{2} = y^{-2} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{ydy}{\sqrt{1 - y^{2}}} = \pm dx \Rightarrow -\sqrt{1 - y^{2}} = \pm x + C_{2}$$



解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^3p\frac{dp}{dy} + 1 =$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow pap = -y \quad dy \quad \Rightarrow \quad \int pap = -\int y \quad dy$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}p^2 = \frac{1}{2}y^{-2} + C_1 \quad \xrightarrow{x=1\text{B}^{\dagger}} \quad C_1 = -\frac{1}{2}, \ p^2 = y^{-2} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{ydy}{\sqrt{1-y^2}} = \pm dx \Rightarrow -\sqrt{1-y^2} = \pm x + C_2$$

$$\Rightarrow \xrightarrow{x=1\text{B}^{\dagger}}$$

解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^3p\frac{dp}{dy} + 1 =$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1} \xrightarrow{\frac{x=1}{y}} C_{1} = -\frac{1}{2}, \ p^{2} = y^{-2} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{ydy}{\sqrt{1-y^2}} = \pm dx \Rightarrow -\sqrt{1-y^2} = \pm x + C_2$$

$$\Rightarrow \frac{x=1\text{B}^{\frac{1}{2}}}{y=1} \quad C_2 = \mp 1,$$



解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^3p\frac{dp}{dy} + 1 =$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1} \xrightarrow{\frac{x=1}{p}} C_{1} = -\frac{1}{2}, \ p^{2} = y^{-2} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{ydy}{\sqrt{1-y^2}} = \pm dx \Rightarrow -\sqrt{1-y^2} = \pm x + C_2$$

$$\Rightarrow \frac{x=1\text{R}^{\dagger}}{y=1} \quad C_2 = \mp 1, -\sqrt{1-y^2} = \pm x \mp 1$$



解 作变量代换
$$p = y'$$
:

$$y^3p\frac{dp}{dy} + 1 =$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1} \xrightarrow{\frac{x=1}{y}} C_{1} = -\frac{1}{2}, \ p^{2} = y^{-2} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{ydy}{\sqrt{1-y^2}} = \pm dx \Rightarrow -\sqrt{1-y^2} = \pm x + C_2$$

$$\Rightarrow \frac{x=1\text{R}}{y=1} \quad C_2 = \pm 1, -\sqrt{1-y^2} = \pm x \mp 1 = \pm (x-1)$$

例 求 $y^3y'' + 1 = 0$ 在初始条件 $y|_{x=1} = 1$, $y'|_{x=1} = 0$ 下的特解 解 作变量代换 p = v':

$$y^3p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$y^{3}p + 1 = 0$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^2 = \frac{1}{2}y^{-2} + C_1 \xrightarrow{x=1 \text{B}^{\frac{1}{2}}} C_1 = -\frac{1}{2}, \ p^2 = y^{-2} - 1$$

$$dy$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

$$y dy$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{ydy}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{y^2}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{y^2$$

 $\Rightarrow \frac{ydy}{\sqrt{1-v^2}} = \pm dx \Rightarrow -\sqrt{1-y^2} = \pm x + C_2$

 $\Rightarrow \xrightarrow[\nu=1]{x=1 \text{ iff}} C_2 = \mp 1, -\sqrt{1-y^2} = \pm x \mp 1 = \pm (x-1)$

例 求 $y^3y'' + 1 = 0$ 在初始条件 $y|_{x=1} = 1$, $y'|_{x=1} = 0$ 下的特解 解 作变量代换 p = v':

$$y^{3}p\frac{dp}{dy} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow pdp = -y^{-3}dy \Rightarrow \int pdp = -\int y^{-3}dy$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}p^{2} = \frac{1}{2}y^{-2} + C_{1} \xrightarrow{\underset{y=1, p=0}{x=1 \text{ p}}} C_{1} = -\frac{1}{2}, \ p^{2} = y^{-2} - 1$$

$$dy$$

 $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{y^{-2} - 1}$$

 $\Rightarrow \frac{ydy}{\sqrt{1-v^2}} = \pm dx \Rightarrow -\sqrt{1-y^2} = \pm x + C_2$

 $\Rightarrow \xrightarrow[v=1]{x=1} C_2 = \mp 1, -\sqrt{1-y^2} = \pm x \mp 1 = \pm (x-1)$