

## §3.4 向量组的秩

数学系 梁卓滨

2016 - 2017 学年 I 暑修班

# 向量组的极大无关组

$m$ 维  
向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$

# 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

## 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

满足：

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性无关；且
- 对  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  再加入任一  $\alpha_i$  后都是线性相关，

## 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

满足：

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性无关；且  $\left( \begin{array}{c} \text{“不可扩充” 的} \\ \text{线性无关} \end{array} \right)$
- 对  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  再加入任一  $\alpha_i$  后都是线性相关，

## 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

满足：

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性无关；且  $\left( \begin{array}{c} \text{“不可扩充” 的} \\ \text{线性无关} \end{array} \right)$
- 对  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  再加入任一  $\alpha_i$  后都是线性相关，

则称  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大 (线性) 无关组。

## 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

满足：

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性无关；且  $\left( \begin{array}{c} \text{“不可扩充” 的} \\ \text{线性无关} \end{array} \right)$
- 对  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  再加入任一  $\alpha_i$  后都是线性相关，

则称  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大 (线性) 无关组。

注  $r \leq s$

## 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

满足：

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性无关；且  $\left( \begin{array}{c} \text{“不可扩充” 的} \\ \text{线性无关} \end{array} \right)$
- 对  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  再加入任一  $\alpha_i$  后都是线性相关，

则称  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大 (线性) 无关组。

注  $r \leq s$  且  $r \leq m$ 。



## 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

满足：

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性无关；且  $\left( \begin{array}{c} \text{“不可扩充”的} \\ \text{线性无关} \end{array} \right)$
- 对  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  再加入任一  $\alpha_i$  后都是线性相关，

则称  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大 (线性) 无关组。

注  $r \leq s$  且  $r \leq m$ 。

---

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则极大无关组是：

## 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

满足：

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性无关；且 （“不可扩充”的  
线性无关
- 对  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  再加入任一  $\alpha_i$  后都是线性相关，

则称  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大（线性）无关组。

注  $r \leq s$  且  $r \leq m$ 。

---

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则极大无关组是：  
 $\alpha_1, \alpha_2$ ;

## 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

满足：

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性无关；且 （“不可扩充”的  
线性无关
- 对  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  再加入任一  $\alpha_i$  后都是线性相关，

则称  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大（线性）无关组。

注  $r \leq s$  且  $r \leq m$ 。

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，则极大无关组

是：

$$\alpha_1, \alpha_2; \quad \alpha_1, \alpha_3;$$

## 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

满足：

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性无关；且 （“不可扩充”的  
线性无关
- 对  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  再加入任一  $\alpha_i$  后都是线性相关，

则称  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大（线性）无关组。

注  $r \leq s$  且  $r \leq m$ 。

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则极大无关组是：

$$\alpha_1, \alpha_2; \quad \alpha_1, \alpha_3; \quad \alpha_2, \alpha_3;$$

## 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

满足：

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性无关；且 （“不可扩充”的  
线性无关
- 对  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  再加入任一  $\alpha_i$  后都是线性相关，

则称  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大（线性）无关组。

注  $r \leq s$  且  $r \leq m$ 。

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则极大无关组是：

$$\alpha_1, \alpha_2; \quad \alpha_1, \alpha_3; \quad \alpha_2, \alpha_3; \quad \alpha_2, \alpha_4;$$

## 向量组的极大无关组

$$\begin{array}{c} m\text{维} \\ \text{向量组} \end{array} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

满足：

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性无关；且 （“不可扩充”的  
线性无关
- 对  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  再加入任一  $\alpha_i$  后都是线性相关，

则称  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大（线性）无关组。

注  $r \leq s$  且  $r \leq m$ 。

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则极大无关组是：

$$\alpha_1, \alpha_2; \quad \alpha_1, \alpha_3; \quad \alpha_2, \alpha_3; \quad \alpha_2, \alpha_4; \quad \alpha_3, \alpha_4$$

## 向量组的极大无关组

**定理** 设  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的线性无关部分组, 则:

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} \iff$$

是极大无关组

## 向量组的极大无关组

**定理** 设  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的线性无关部分组, 则:

$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是极大无关组  $\iff$   $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  中每个向量  
都可由  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性表示



## 向量组的极大无关组

**定理** 设  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的线性无关部分组, 则:

$$\begin{array}{ccc} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} & \Longleftrightarrow & \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 中每个向量} \\ \text{是极大无关组} & & \text{都可由 } \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} \text{ 线性表示} \end{array}$$

**证明**

## 向量组的极大无关组

**定理** 设  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的线性无关部分组, 则:

$$\begin{array}{ccc} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} & \Longleftrightarrow & \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 中每个向量} \\ \text{是极大无关组} & & \text{都可由 } \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} \text{ 线性表示} \end{array}$$

**证明**

" $\Rightarrow$ " 对任意  $\alpha_i$  成立:  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_i$  线性相关

## 向量组的极大无关组

**定理** 设  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的线性无关部分组, 则:

$$\begin{array}{ccc} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} & \Longleftrightarrow & \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 中每个向量} \\ \text{是极大无关组} & & \text{都可由 } \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} \text{ 线性表示} \end{array}$$

**证明**

" $\Rightarrow$ " 对任意  $\alpha_i$  成立:  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_i$  线性相关, 所以  $\alpha_i$  是  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性组合

## 向量组的极大无关组

**定理** 设  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的线性无关部分组, 则:

$$\begin{array}{ccc} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} & \iff & \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 中每个向量} \\ \text{是极大无关组} & & \text{都可由 } \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} \text{ 线性表示} \end{array}$$

**证明**

" $\Rightarrow$ " 对任意  $\alpha_i$  成立:  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_i$  线性相关, 所以  $\alpha_i$  是  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性组合

" $\Leftarrow$ " 对任意  $\alpha_i$  成立:  $\alpha_i$  是  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性组合

## 向量组的极大无关组

**定理** 设  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的线性无关部分组, 则:

$$\begin{array}{ccc} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} & \iff & \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 中每个向量} \\ \text{是极大无关组} & & \text{都可由 } \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} \text{ 线性表示} \end{array}$$

**证明**

" $\Rightarrow$ " 对任意  $\alpha_i$  成立:  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_i$  线性相关, 所以  $\alpha_i$  是  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性组合

" $\Leftarrow$ " 对任意  $\alpha_i$  成立:  $\alpha_i$  是  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性组合, 所以  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_i$  线性相关

# 向量组的秩

**定理** 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。

## 向量组的秩

**定理** 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大无关组，则

## 向量组的秩

**定理** 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大无关组，则  $r = t$



# 向量组的秩

**定理** 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大无关组，则  $r = t$

**证明** 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  与  $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$  等价（相互线性表示）；且

# 向量组的秩

**定理** 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大无关组，则  $r = t$

**证明** 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  与  $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$  等价（相互线性表示）；且
- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  与  $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$  都是线性无关，

## 向量组的秩

**定理** 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大无关组，则  $r = t$

**证明** 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  与  $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$  等价（相互线性表示）；且
  - $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  与  $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$  都是线性无关，
- 所以  $r = t$

# 向量组的秩

**定理** 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大无关组，则  $r = t$

**证明** 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  与  $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$  等价（相互线性表示）；且
  - $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  与  $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$  都是线性无关，
- 所以  $r = t$

---

**定义** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大无关组所包含向量的个数，称向量组的**秩**，记为：

## 向量组的秩

**定理** 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大无关组，则  $r = t$

**证明** 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  与  $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$  等价（相互线性表示）；且
  - $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  与  $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$  都是线性无关，
- 所以  $r = t$

---

**定义** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大无关组所包含向量的个数，称向量组的**秩**，记为： $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$

## 向量组的秩

**定理** 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大无关组，则  $r = t$

**证明** 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  与  $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$  等价（相互线性表示）；且
  - $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  与  $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$  都是线性无关，
- 所以  $r = t$

---

**定义** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大无关组所包含向量的个数，称向量组的**秩**，记为： $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$

**注**  $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq s$  且  $\leq m$  (维数)。

## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则  
 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{\hspace{2cm}}$

## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{\quad 2 \quad}$$



## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{\quad 2 \quad}$$

这是:

- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组,

## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上,  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关,

## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上,  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 且  $\alpha_3, \alpha_4$  均能由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示

## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上,  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 且  $\alpha_3, \alpha_4$  均能由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2;$$

## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上,  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 且  $\alpha_3, \alpha_4$  均能由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2; \quad \alpha_4 = 2\alpha_2$$

## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上,  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 且  $\alpha_3, \alpha_4$  均能由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2; \quad \alpha_4 = 2\alpha_2$$

或者说:

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 2$

## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上,  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 且  $\alpha_3, \alpha_4$  均能由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2; \quad \alpha_4 = 2\alpha_2$$

或者说:

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 2$
- 有两个线性无关向量,



## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上,  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 且  $\alpha_3, \alpha_4$  均能由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2; \quad \alpha_4 = 2\alpha_2$$

或者说:

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 2$
- 有两个线性无关向量, 如  $\alpha_1, \alpha_2$ ,

## 向量组的秩

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上,  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 且  $\alpha_3, \alpha_4$  均能由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2; \quad \alpha_4 = 2\alpha_2$$

或者说:

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 2$
- 有两个线性无关向量, 如  $\alpha_1, \alpha_2$ , 所以  $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \geq 2$

# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & & \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)$$

# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)$$



# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)$$

# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)$$

# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

定义

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  称为  $A$  的列秩;

# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

定义

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  称为  $A$  的列秩;
- $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$  称为  $A$  的行秩;

# 秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

定义

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  称为  $A$  的列秩;
- $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$  称为  $A$  的行秩;

定理  $r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$

# 初等变换求极大无关组

**问题** 给出  $m$  维的向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 如何求出其一组极大无关组?

**步骤**

## 初等变换求极大无关组

**问题** 给出  $m$  维的向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 如何求出其一组极大无关组?

**步骤**

1.  $A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$



## 初等变换求极大无关组

**问题** 给出  $m$  维的向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 如何求出其一组极大无关组?

**步骤**

1.  $A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$
2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出  $r(A)$ 。

## 初等变换求极大无关组

**问题** 给出  $m$  维的向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 如何求出其一组极大无关组?

**步骤**

1.  $A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$

2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出  $r(A)$ 。

利用  $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$ , 得出极大无关组所包含向量的个数

## 初等变换求极大无关组

**问题** 给出  $m$  维的向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 如何求出其一组极大无关组?

**步骤**

1.  $A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$

2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出  $r(A)$ 。

利用  $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$ , 得出极大无关组所包含向量的个数

3. 通过简化的阶梯型矩阵, 容易看出线性无关的  $r(A)$  列, 这就找到一组极大无关组

# 初等变换求极大无关组

**问题** 给出  $m$  维的向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 如何求出其一组极大无关组?

**步骤**

1.  $A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$

2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出  $r(A)$ 。

利用  $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$ , 得出极大无关组所包含向量的个数

3. 通过简化的阶梯型矩阵, 容易看出线性无关的  $r(A)$  列, 这就找到一组极大无关组

4. 通过简化的阶梯型矩阵, 容易看出其余列如何用极大无关组线性表示

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**

$\alpha_1$	$\alpha_2$	$\alpha_3$	$\alpha_4$
2	1	2	3
4	1	3	5
2	0	1	2

**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**

$\alpha_1$	$\alpha_2$	$\alpha_3$	$\alpha_4$
2	1	2	3
4	1	3	5
2	0	1	2

$$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}$$

**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**  $\alpha_1$   $\alpha_2$   $\alpha_3$   $\alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$



**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**  $\alpha_1$   $\alpha_2$   $\alpha_3$   $\alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**  $\alpha_1$   $\alpha_2$   $\alpha_3$   $\alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1}$$

**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$

**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$



**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$ ;
- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组;

**例** 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

**解**  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$ ;
- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组;
- $\alpha_3 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一

个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1$   $\alpha_2$   $\alpha_3$   $\alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$



例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3;$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一

个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3;$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一

个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3$ ;
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  是极大无关组;

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$  的一

个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3$ ;
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  是极大无关组;
- $\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2$



例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1$   $\alpha_2$   $\alpha_3$   $\alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$ ;
- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组;

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$ ;
- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组;
- $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$

例 求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$  的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$ ;
- $\alpha_1, \alpha_2$  是极大无关组;
- $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ ,  $\alpha_4 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2$

例 求向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

例 求向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s),$$

$$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t),$$

例 求向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$  是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t),$



例 求向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$  是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$  是极大无关组

例 求向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ ,  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$  是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$ ,  $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$  是极大无关组

注意到  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$  能由  $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$  线性表示,

例 求向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$  是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$  是极大无关组

注意到  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$  能由  $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$  线性表示, 所以

$$r_1 \leq r_2.$$

**例** 求向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

**证明** 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$  是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$  是极大无关组

注意到  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$  能由  $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$  线性表示, 所以  
 $r_1 \leq r_2$ 。

---

**定理** 设有向量组

(A):  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$

(B):  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$

若它们等价,

**例** 求向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

**证明** 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ ,  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$  是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$ ,  $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$  是极大无关组

注意到  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$  能由  $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$  线性表示, 所以  
 $r_1 \leq r_2$ 。

---

**定理** 设有向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

若它们等价, 则  $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$ 。

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

例 设  $A_{m \times n}, B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$



例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & & & \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} & & & \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

**例** 设  $A_{m \times n}, B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

**证明** 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \overset{\gamma_1}{c_{11}} & \overset{\gamma_2}{c_{12}} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

**例** 设  $A_{m \times n}, B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

**证明** 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \begin{matrix} \gamma_1 & \gamma_2 & & \gamma_s \end{matrix} \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \end{matrix} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n$$



例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

例 设  $A_{m \times n}, B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见  $\gamma_1, \dots, \gamma_s$  由  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性表示,

例 设  $A_{m \times n}, B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见  $\gamma_1, \dots, \gamma_s$  由  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性表示, 所以

$$r(\gamma_1, \dots, \gamma_s) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

例 设  $A_{m \times n}, B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见  $\gamma_1, \dots, \gamma_s$  由  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性表示, 所以

$$r(\gamma_1, \dots, \gamma_s) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = r(A)$$

例 设  $A_{m \times n}, B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见  $\gamma_1, \dots, \gamma_s$  由  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性表示, 所以

$$r(AB) = r(\gamma_1, \dots, \gamma_s) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = r(A)$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B^{\beta_1}$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \end{matrix}$$



例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\delta_1 \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ C_{m1} \ C_{m2} \cdots C_{ms} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{array}{c} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{array} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{array}{c} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{array}$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$



例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见  $\delta_1, \dots, \delta_m$  由  $\beta_1, \dots, \beta_s$  线性表示,

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见  $\delta_1, \dots, \delta_m$  由  $\beta_1, \dots, \beta_s$  线性表示, 所以

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见  $\delta_1, \dots, \delta_m$  由  $\beta_1, \dots, \beta_s$  线性表示, 所以

$$r(\delta_1, \dots, \delta_m) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_n)$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见  $\delta_1, \dots, \delta_m$  由  $\beta_1, \dots, \beta_s$  线性表示, 所以

$$r(\delta_1, \dots, \delta_m) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_n) = r(B)$$

例 设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times s}$  为矩阵, 则  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设  $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见  $\delta_1, \dots, \delta_m$  由  $\beta_1, \dots, \beta_s$  线性表示, 所以

$$r(AB) = r(\delta_1, \dots, \delta_m) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_n) = r(B)$$