

# §5.1, 5.2 二次型与对称矩阵

数学系 梁卓滨

2016 - 2017 学年 I 暑修班

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= (6x_1 + 2x_2, 2x_1 - 2x_2) \end{aligned}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= (6x_1 + 2x_2, 2x_1 - 2x_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$f(x_1, x_2) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & \\ & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= (a_{11}x_1 + a_{12}x_2, a_{12}x_1 + a_{22}x_2) \end{aligned}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= (a_{11}x_1 + a_{12}x_2, a_{12}x_1 + a_{22}x_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地，

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x \end{aligned}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地，

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地，

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$f(x_1, x_2) = -3x_1^2 + 2x_1x_2 + 5x_2^2 =$$



## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地，

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$f(x_1, x_2) = -3x_1^2 + 2x_1x_2 + 5x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地，

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$f(x_1, x_2) = -3x_1^2 + 2x_1x_2 + 5x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地，

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$f(x_1, x_2) = -3x_1^2 + 2x_1x_2 + 5x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

## 二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地，

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$f(x_1, x_2) = -3x_1^2 + 2x_1x_2 + 5x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) = & a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ & + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \\ a_{12} & a_{22} & \\ & & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & \\ a_{13} & & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \\ \frac{1}{2} & 0 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \\ \frac{1}{2} & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

=

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$



## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 3 \\ \frac{1}{2} & 2 & 4 \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & \\ \frac{3}{2} & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= -x_1^2 \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= -x_1^2 + 2x_2^2 \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= -x_1^2 + 2x_2^2 + 0x_3^2 \end{aligned}$$



## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= -x_1^2 + 2x_2^2 + 0x_3^2 + 2 \cdot 1 \cdot x_1x_2 \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= -x_1^2 + 2x_2^2 + 0x_3^2 + 2 \cdot 1 \cdot x_1x_2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot x_1x_3 \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= -x_1^2 + 2x_2^2 + 0x_3^2 + 2 \cdot 1 \cdot x_1x_2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot x_1x_3 + 2 \cdot 0 \cdot x_2x_3 \end{aligned}$$

## 二次型：引例

例 给定二次型，写出对称矩阵  $A$ ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 给定对称矩阵  $A$ ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= -x_1^2 + 2x_2^2 + 0x_3^2 + 2 \cdot 1 \cdot x_1x_2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot x_1x_3 + 2 \cdot 0 \cdot x_2x_3 \\ &= -x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_3 + x_1x_3 \end{aligned}$$

# 二次型

定义  $n$  元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

# 二次型

定义  $n$  元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \end{aligned}$$

$$+ a_{nn}x_n^2$$

$$= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

# 二次型

定义  $n$  元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & + a_{nn}x_n^2 \\ = & (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

# 二次型

定义  $n$  元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & + a_{nn}x_n^2 \\ = & (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & & \\ a_{12} & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$



# 二次型

定义  $n$  元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & + a_{nn}x_n^2 \\ = & (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{1n} & & & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

# 二次型

定义  $n$  元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & + a_{nn}x_n^2 \\ = & (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

# 二次型

定义  $n$  元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & + a_{nn}x_n^2 \\ = & \underbrace{(x_1, x_2, \dots, x_n)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_x \end{aligned}$$

# 二次型

定义  $n$  元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & + a_{nn}x_n^2 \\ = & \underbrace{(x_1, x_2, \dots, x_n)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_x \\ = & x^T A x \end{aligned}$$

# 二次型

定义  $n$  元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & + a_{nn}x_n^2 \\ = & \underbrace{(x_1, x_2, \dots, x_n)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_x \\ = & x^T A x \end{aligned}$$

注  $n$  元二次型与对称矩阵，是一一对应

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$f =$$



## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$f = (y_1 - 2y_2)^2$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 \end{aligned}$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \end{aligned}$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \Leftrightarrow f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \Leftrightarrow f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \Leftrightarrow f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \iff f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$



## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \iff f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

变量  $\downarrow$  代换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \iff f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

变量  $\downarrow$  代换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad x = Cy$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \iff f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x = Cy \\ x^T = y^T C^T \end{matrix}$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \iff f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x = Cy \\ x^T = y^T C^T \end{matrix}$$

$\Downarrow$

$$f = (y_1, y_2) C^T A C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \iff f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x = Cy \\ x^T = y^T C^T \end{matrix}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1, y_2) C^T A C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

注 1.  $C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \Leftrightarrow f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x = Cy \\ x^T = y^T C^T \end{matrix}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1, y_2) C^T A C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

注 1.  $C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \Leftrightarrow f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x = Cy \\ x^T = y^T C^T \end{matrix}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1, y_2) C^T A C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= (y_1, y_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

注 1.  $C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \Leftrightarrow f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x = Cy \\ x^T = y^T C^T \end{matrix}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1, y_2) C^T A C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= (y_1, y_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

注 1.  $C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$

2. 变量代换可逆：



## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \Leftrightarrow f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

变量  $\Downarrow$  代换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x = Cy \\ x^T = y^T C^T \end{matrix}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1, y_2) C^T A C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= (y_1, y_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

注 1.  $C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$

2. 变量代换可逆:  $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} =$

## 线性变换：引例

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2 \iff f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

变量  $\downarrow$  代换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

$\downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1 - 2y_2)^2 \\ &\quad + 4(y_1 - 2y_2)y_2 - 3y_2^2 \\ &= y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

变量  $\downarrow$  代换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x = Cy \\ x^T = y^T C^T \end{matrix}$$

$\downarrow$

$$\begin{aligned} f &= (y_1, y_2) C^T A C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= (y_1, y_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

注 1.  $C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$

2. 变量代换可逆:  $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \cdots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ + \cdots \cdots \cdots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \cdots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \cdots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ + \cdots \cdots \cdots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \cdots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \cdots + d_ry_r^2$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \quad f = x^T A x$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \quad f = x^T A x$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$



**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \quad f = x^T A x$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy,$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f =$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T C^T$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T C^T A C y$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T \boxed{C^T A C} y \quad \boxed{B}$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \quad f = x^T A x$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T \boxed{C^T A C} y = y^T \boxed{B} y$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T \boxed{C^T A C} y = y^T \boxed{B} y$$

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_r & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$



**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

**注**

$$\bullet \quad r = \quad ;$$

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T \boxed{C^T A C} y = y^T \boxed{B} y$$

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_r & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

**注**

$$\bullet r = r(B) \quad ;$$

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T \boxed{C^T A C} y = y^T \boxed{B} y$$

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_r & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

**注**

$$\bullet r = r(B) = r(A);$$

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T \boxed{C^T A C} y = y^T \boxed{B} y$$

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_r & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

**注**

- $r = r(B) = r(A)$ ;  $d_i$  具体取值不唯一

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T \boxed{C^T A C} y = y^T \boxed{B} y$$

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_r & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

**注**

- $r = r(B) = r(A)$ ;  $d_i$  具体取值不唯一
- 可以证明  $d_1, \dots, d_r$  中正、负数的个数唯一:

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T \boxed{C^T A C} y = y^T \boxed{B} y$$

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_r & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

**注**

- $r = r(B) = r(A)$ ;  $d_i$  具体取值不唯一
- 可以证明  $d_1, \dots, d_r$  中正、负数的个数唯一:
  1. **正惯性指标**:  $d_1, \dots, d_r$  中正数的个数

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T \boxed{C^T A C} y = y^T \boxed{B} y$$

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_r & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

**定理** 对任意 $n$ 元二次型

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

一定存在非退化线性变换

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \dots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f$ 后, 可化为

$$f = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2 \quad \text{标准形}$$

其中 $d_1, \dots, d_r \neq 0$

**注**

- $r = r(B) = r(A)$ ;  $d_i$  具体取值不唯一
- 可以证明  $d_1, \dots, d_r$  中正、负数的个数唯一:
  1. **正惯性指标**:  $d_1, \dots, d_r$  中正数的个数
  2. **负惯性指标**:  $d_1, \dots, d_r$  中负数的个数

$$f = x^T A x$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x = Cy, \quad x^T = y^T C^T$$

$$f = y^T \boxed{C^T A C} y = y^T \boxed{B} y$$

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_r & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

## 配方法化二次型为标准形

- 想法:  $a^2 + 2ab =$



## 配方法化二次型为标准形

- 想法:  $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 =$

## 配方法化二次型为标准形

- 想法:  $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2$

## 配方法化二次型为标准形

- 想法:  $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2$   
 $a^2 + 2ab + 2ac =$

## 配方法化二次型为标准形

- 想法:  $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2$

$$a^2 + 2ab + 2ac = a^2 + 2a(b + c)$$

=

## 配方法化二次型为标准形

- 想法:  $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2$   
 $a^2 + 2ab + 2ac = a^2 + 2a(b + c)$   
 $= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2$   
 $=$

## 配方法化二次型为标准形

- 想法:  $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2$   
 $a^2 + 2ab + 2ac = a^2 + 2a(b + c)$   
 $= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2$   
 $= (a + b + c)^2 - (b + c)^2$

## 配方法化二次型为标准形

- 想法: 
$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= \end{aligned}$$

## 配方法化二次型为标准形

- 想法: 
$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3)\end{aligned}$$



## 配方法化二次型为标准形

- 想法: 
$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2\end{aligned}$$

## 配方法化二次型为标准形

- 想法: 
$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= \end{aligned}$$

## 配方法化二次型为标准形

- 想法: 
$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 +\end{aligned}$$

## 配方法化二次型为标准形

- 想法: 
$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= \end{aligned}$$

## 配方法化二次型为标准形

- 想法: 
$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= \end{aligned}$$

## 配方法化二次型为标准形

● 想法:  $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2$

$$\begin{aligned}a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases}$$



### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases}$$

则 
$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \\ x_2 = \\ x_3 = \end{cases}$$

则  $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \\ x_2 = \\ x_3 = \quad \quad y_3 \end{cases}$$

则  $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \\ x_2 = \quad y_2 - y_3 \\ x_3 = \quad \quad y_3 \end{cases}$$

则  $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = \quad \quad y_2 - y_3 \\ x_3 = \quad \quad \quad y_3 \end{cases}$$

则  $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} y_1 - y_2 \\ y_2 - y_3 \\ y_3 \end{pmatrix} y$$

则  $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

则  $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

则  $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$



### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

则  $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则 
$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则  $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

注 正惯性指标 = ; 负惯性指标 =

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = \quad \quad y_2 - y_3 \\ x_3 = \quad \quad \quad y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则  $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

**注** 正惯性指标 = 2; 负惯性指标 =

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = \quad y_2 - y_3 \\ x_3 = \quad \quad y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则  $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

**注** 正惯性指标 = 2; 负惯性指标 = 1

## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$= y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

$$= y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$



## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

$$= y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 = y^T C^T A C y$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

$$= y^T \boxed{C^T A C} y$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 = y^T \boxed{C^T A C} y$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 = y^T \boxed{C^T A C} y$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{C^T} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$



## 小结

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

$$= y^T \boxed{C^T A C} y$$

特别地，找到了可逆阵  $C$ ，使得

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{C^T} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$
$$=$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) \end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\ &\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2\end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$



例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

注 正惯性指标 = ； 负惯性指标 =



### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - 2y_3 \\ x_2 = \quad \quad y_2 \\ x_3 = \quad \quad \quad y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

注 正惯性指标 = 1; 负惯性指标 =

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

注 正惯性指标 = 1; 负惯性指标 = 1

## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= y_1^2 - 2y_2^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

$$= y_1^2 - 2y_2^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

$$= y_1^2 - 2y_2^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - 2y_2^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - 2y_2^2$$



## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - 2y_2^2$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - 2y_2^2$$

$$= y^T C^T A C y$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - 2y_2^2$$

$$= y^T \boxed{C^T A C} y$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - 2y_2^2$$

$$= y^T \boxed{C^T A C} y$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - 2y_2^2 = y^T \boxed{C^T A C} y$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C^T} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

## 小结

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 = x^T A x$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - 2y_2^2$$

$$= y^T \boxed{C^T A C} y$$

特别地，找到了可逆阵  $C$ ，使得

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C^T} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

=

例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2$$

$$+ 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$



例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned} f &= x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2 \\ &= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2 \\ &= \qquad\qquad\qquad + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 \end{aligned}$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + \quad \quad \quad + 2x_1x_2 - x_2^2$$

例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + x_1^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + x_1^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + x_1^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= -(x_1 - x_2)^2$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + x_1^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2$$



### 例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + x_1^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + x_1^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 = \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2 \\&= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 \\&= -\frac{1}{4}x_1^2 + x_1^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 \\&= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 = \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases}y_1 = x_1 \\y_2 = x_1 - x_2 \\y_3 = -\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\end{cases}$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + x_1^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 = \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_1 - x_2 \\ y_3 = -\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 \end{cases}$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + x_1^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 = \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_1 - x_2 \\ y_3 = -\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = y_1 - y_2 \end{cases}$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= -\frac{1}{4}x_1^2 + x_1^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 = \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_1 - x_2 \\ y_3 = -\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = -\frac{1}{2}y_1 + y_2 + y_3 \end{cases}$$

### 例 配方法化二次型为标准形

$$\begin{aligned}f &= x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1x_2 - \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + 2x_3\left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2\right) + x_3^2 \\&= -\frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 \\&= -\frac{1}{4}x_1^2 + x_1^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 \\&= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 = \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_1 - x_2 \\ y_3 = -\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = -\frac{1}{2}y_1 + y_2 + y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

C: 可逆

## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$



## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} x$$

$$= \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

$$= \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

$$= x^T A x$$

## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

$$= x^T A x$$

$$= y^T C^T A C y$$

## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

$$= x^T A x$$

$$= y^T \boxed{C^T A C} y$$



## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

$$= x^T A x$$

$$= y^T \boxed{C^T A C} y$$

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

$$= x^T A x$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

$$= y^T \boxed{C^T A C} y$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C^T} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

## 小结

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= \frac{3}{4}y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$$

$$= x^T A x$$

$$= y^T \boxed{C^T A C} y$$

特别地，找到了可逆阵  $C$ ，使得

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C^T} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$\begin{aligned} &= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2 \\ &\quad (\sqrt{2}x_2)^2 \end{aligned}$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

$$= y_1^2 - y_2^2$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

$$= y_1^2 - y_2^2$$



## 二次型的规范形

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & -2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

$$= y_1^2 - y_2^2$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & -2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - y_2^2$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & -2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - y_2^2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & -2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - y_2^2$$

特别地，找到了可逆阵  $C$ ，使得

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C^T} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & -2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2$$



## 二次型的规范形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2 = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2 = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2 = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{3} & -1 & 1 \\ 2/\sqrt{3} & -1 & 0 \end{pmatrix} y$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2 = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 2/\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{3} & -1 & 1 \\ 2/\sqrt{3} & -1 & 0 \end{pmatrix}}_C y$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2 = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 2/\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{3} & -1 & 1 \\ 2/\sqrt{3} & -1 & 0 \end{pmatrix}}_C y$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

## 二次型的规范形

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$\begin{aligned} &= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2 = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 \end{aligned}$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 2/\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{3} & -1 & 1 \\ 2/\sqrt{3} & -1 & 0 \end{pmatrix}}_C y$$

特别地，找到了可逆阵  $C$ ，使得

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{3} \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{C^T} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 2/\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{3} & -1 & 1 \\ 2/\sqrt{3} & -1 & 0 \end{pmatrix}}_C = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

# 二次型的规范形

**定理** 任意二次型  $f(x_1, \dots, x_n)$  都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

## 二次型的规范形

**定理** 任意二次型  $f(x_1, \dots, x_n)$  都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

$$\begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$



## 二次型的规范形

**定理** 任意二次型  $f(x_1, \dots, x_n)$  都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

$$A \quad \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

## 二次型的规范形

**定理** 任意二次型  $f(x_1, \dots, x_n)$  都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

$$C^T A C = \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

## 二次型的规范形

**定理** 任意二次型  $f(x_1, \dots, x_n)$  都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

也就是, 任意对称矩阵  $A$ , 都存在可逆矩阵  $C$ , 使得

$$C^T A C = \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

## 二次型的规范形

**定理** 任意二次型  $f(x_1, \dots, x_n)$  都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

也就是, 任意对称矩阵  $A$ , 都存在可逆矩阵  $C$ , 使得

$$C^T A C = \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

**注**

- $r = r(A)$ ,  $p =$  正惯性指标,  $r - p =$  负惯性指标

## 二次型的规范形

**定理** 任意二次型  $f(x_1, \dots, x_n)$  都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

也就是, 任意对称矩阵  $A$ , 都存在可逆矩阵  $C$ , 使得

$$C^T A C = \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

**注**

- $r = r(A)$ ,  $p =$  正惯性指标,  $r - p =$  负惯性指标
- $p$  是由  $A$  唯一确定的

# 合同，合同的等价条件

**定义** 设  $A, B$  为两个  $n$  阶方阵，若存在可逆  $n$  阶方阵  $C$ ，使得

$$C^T A C = B$$

则称  $A$  **合同于**  $B$ ，记为  $A \simeq B$

# 合同，合同的等价条件

**定义** 设  $A, B$  为两个  $n$  阶方阵，若存在可逆  $n$  阶方阵  $C$ ，使得

$$C^T A C = B$$

则称  $A$  合同于  $B$ ，记为  $A \simeq B$

**定理** 任意对称矩阵  $A$ ，都成立

$$A \simeq \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

# 合同，合同的等价条件

**定义** 设  $A, B$  为两个  $n$  阶方阵，若存在可逆  $n$  阶方阵  $C$ ，使得

$$C^T A C = B$$

则称  $A$  合同于  $B$ ，记为  $A \simeq B$

**定理** 任意对称矩阵  $A$ ，都成立

$$A \simeq \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

**定理** 设  $A, B$  为对称矩阵，则  $A \simeq B$  的充分必要条件是  $A, B$  具有相同的规范形（也就是，秩、正惯性指标都相等）