

# NUMPDE Exercise 6

## 1 Example 6.1

Proof that:

$$Q_T(v) = \int_T v \, dx \quad \forall v \in \mathbb{P}^2(T)$$

Forst we difin a  $\hat{v}(\hat{x}, \hat{y})$  Element and integrat over it.

$$\hat{v}(\hat{x}, \hat{y}) = c_0 + c_1\hat{x} + c_2\hat{y} + c_3\hat{x}^2 + c_4\hat{y}^2 + c_5\hat{x}\hat{y}$$

$$\int_{\hat{x}=0}^1 \int_{\hat{y}=0}^{1-\hat{x}} \hat{v} d\hat{x} = \frac{c_0}{2} + \frac{c_1 + c_2}{6} + \frac{c_3 + c_4}{12} + \frac{c_5}{24}$$

Now we kan use the midpoint rule to calculate the area  $\in V$ .

$$Q_{\hat{T}}(v) := \frac{|\hat{T}|}{3} [v(\hat{x}_1)v(\hat{x}_2)v(\hat{x}_3)]$$

Also the are of  $|\hat{T}| = \frac{1}{2}|T|$  and  $\hat{v}(\hat{x}_1) = c_0 + \frac{c_1}{2} + \frac{c_3}{4}$ ,  $\hat{v}(\hat{x}_2) = c_0 + \frac{c_1}{2} + \frac{c_3}{4}$ ,  $\hat{v}(\hat{x}_3) = c_0 + \frac{c_1}{2} + \frac{c_2}{2} + \frac{c_3}{4} + \frac{c_4}{4} + \frac{c_5}{4}$   
 $Q_{\hat{T}}(\hat{v}) = \frac{c_0}{2} + \frac{c_1+c_2}{6} + \frac{c_3+c_4}{12} + \frac{c_5}{24}$

We sowed finally that  $Q_{\hat{T}}(\hat{v}) = \int_{\hat{T}} \hat{v}$  and we know that lagrange FR are equivalent. We define  $F : \hat{T} \rightarrow T$  as an affine linear mapping.

$$\int_T v(x) \, dx = \int_T \hat{v} \circ F^{-1}(x) \, dx = \int_{\hat{T}} (\hat{v} \circ F^{-1}) \circ F(\hat{x}) |\det DF| \, d\hat{x} = |\det DF| \int_{\hat{T}} \hat{v}(\hat{x}) \, d\hat{x}$$

At last we only have to show that  $\int_{\hat{T}} \hat{v}(\hat{x}) \, d\hat{x} = Q_{\hat{T}(\hat{v})}$

$$\begin{aligned} |\det DF| Q_{\hat{T}(\hat{v})} &= |\det DF| \frac{|\hat{T}|}{3} (\hat{v}(\hat{x}_1) + \hat{v}(\hat{x}_2) + \hat{v}(\hat{x}_3)) \\ &= \frac{|\hat{T}|}{3} \left( (v \circ F)(F^{-1}(x_1)) + (v \circ F)(F^{-1}(x_2)) + (v \circ F)(F^{-1}(x_3)) \right) = \frac{|\hat{T}|}{3} (v(x_1) + v(x_2) + v(x_3)) \end{aligned}$$

## 2 Example 6.2

## 3 Example 6.3

## 4 Example 6.4