

Poluarea de interior

Fișa elevului

Nume: _____

Data: _____

Siguranță: Fereastra o deschide profesorul; nu te urca pe pervaz, pe calorifer sau pe scaun.

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran sunt trei cartonașe: **CO₂** (*în ppm*), **Temperatură** (*°C*) și **Umiditate** (%). Senzorul dă o valoare nouă **o dată la cinci secunde**, deci linia urcă în trepte.

Trei reguli. Stau la **cel puțin un metru** de cutie — altfel măsoar respirația mea, nu sala. Notez **ora** odată cu numărul; fără ea nu pot calcula nicio viteză. Și notez **câți suntem** și dacă fereastra e deschisă.

Referința (sala aerisită, goală): _____ ppm **Afară:** _____ ppm **Suntem:** _____

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Nu schimb predicția după ce măsoar.

În 15 minute, cu toată clasa înăuntru, CO₂-ul va crește cu cam _____ ppm.

După ce deschidem fereastra, se va întoarce în cam _____ minute.

pentru că _____

Urcușul — fereastra închisă, toată lumea în sală.

Minutul	CO ₂ (ppm)	T (°C)	Umiditatea (%)
0			
5			
10			
15			

Revenirea — fereastra deschisă. ☐ și ușa

Minutul	CO ₂ (ppm)	T (°C)	Umiditatea (%)
0			
1			
2			
3			
5			

Calculez vitezele. Exemplu rezolvat: $1150 - 700 = 450$ ppm în 15 min, deci $450 : 15 = 30$ ppm/min.

Urcușul: _____ - _____ = _____ ppm în _____ min, deci _____ ppm/min

Revenirea: _____ - _____ = _____ ppm în _____ min, deci _____ ppm/min

Aplicația: urcușul _____ $\pm$ _____, revenirea _____ $\pm$ _____ ppm/min. Se potrivesc? ☐ da ☐ nu

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

Urcușul s-a domolit după un timp pentru că _____

Recomandarea noastră de aerisire. De câte ori pe oră, și pentru cât timp? Folosește cele două viteze.

Limita măsurării noastre: ce *nu* vede acest senzor?

Bilet de ieșire

De câte ori pe oră ar trebui aerisită sala noastră, și de unde știi?