

Распределение концентрации газа в неоднородной среде вблизи сферического источника тепла

Городнов Георгий Б02-303

Сивачев Леонид Б05-305

МФТИ 2024

Аннотация

В разделе статистической физики общей физики рассматривается распределение Больцмана - распределение концентрации вещества в потенциальном силовом поле. Однако данное распределение выводится из предположений об однородности среды (температура вещества считается постоянными), что в общем случае неверно. Так при поиске зависимости давления в атмосфере небесных тел с использованием распределения Больцмана это предположение ошибочно и такая модель не отражает реальную зависимость. В данной работе будет сделана попытка получить более общий аналог распределения Больцмана для неизотермичного газа.

Введение

В нашей работе мы будем использовать модель идеального газа, а также будем считать, что потенциальная энергия силового поля линейно зависит от удаления от некоторой точки в пространстве. В частности будем искать зависимость концентрации вещества в атмосфере от высоты над поверхностью небесного тела. Однако мы сделаем шаг к тому, чтобы наша модель была более приближена к реальности: мы откажемся от однородности среды и независимости температуры вещества от координаты. Для этого мы воспользуемся следующими приближениями:

1. Будем считать, что небесное тело имеет сферическую форму и постоянную поддерживаемую температуру поверхности T_0 .
2. Из-за неоднородности среды нам придётся отказаться от независимости температуры, плотности и коэффициента теплопроводности вещества от координат. Однако мы всё также будем считать, что молярная теплоёмкость постоянна.
3. В работе будем опираться, на закон Фурье $\vec{q} = -\text{grad } T$, то есть будем считать, что в системе установился стационарный поток тепла.
4. Также будем считать, что длина свободного пробега гораздо меньше размеров тела.

Теплопроводность

Теплопроводностью называют один из видов переноса тепла от более нагретых частей тела к менее нагретым. Она осуществляется путём непосредственной передачи энергии от частиц с большей энергией к частицам с меньшей энергией. Для описания переноса тепла используется закон Фурье:

$$\vec{q} = -\text{grad } T$$

где q - плотность теплового потока, обозначающая количество тепловой энергии, пересекающей единичную площадь за единицу времени.

Или же:

$$\frac{dQ}{dt \cdot S} = -\kappa \frac{dT}{dr}$$

Если рассматривать распространение тепла в одном направлении. Величина κ называется коэффициентом теплопроводности и имеет размерность:

$$[\kappa] = \frac{\text{Дж}}{\text{м} \cdot \text{с} \cdot \text{К}}$$

Поскольку длина свободного пробега выражается как:

$$\lambda = \frac{1}{n\sigma}$$

То теплопроводность можно записать так:

$$\kappa = \frac{1}{3} \rho \lambda \bar{v} c_V^{\text{уд}}$$

Так как известно, что средняя скорость молекул газа зависит от температуры и не зависит от плотности, то из предположения, что σ зависит только от размеров молекул следует вывод, что теплопроводность κ (а следовательно, и скорость потока тепла) не зависит от плотности газа, а в контексте нашей задачи это означает, что теплопроводность имеет вид:

$$\kappa \sim \rho \lambda \bar{v} c_V^{\text{уд}} \sim \rho \lambda \bar{v} \sim n \frac{1}{n} \bar{v} \sim \bar{v} \sim T^{\frac{1}{2}}$$

$$\kappa(x, y, z) = A \cdot \sqrt{T(x, y, z)}$$

где A - некая константа. Из сферической симметрии задачи также следует, что фактически теплопроводность записывается:

$$\kappa(r) = A \cdot \sqrt{T(r)}$$

Зависимость температуры от высоты

В предположении, что температура поверхности небесного сферического тела поддерживается постоянной выведем зависимость $T(r)$. Запишем закон Фурье:


$$q = -\kappa \frac{dT}{dz}$$

Будем считать, что в системе установился стационарный режим, поэтому через сферу произвольного радиуса в единицу времени проходит одно и то же количество тепла, то есть:

$$qr^2 = \text{const}$$

В предыдущем параграфе получено соотношение:


$$\kappa = A \cdot T^{\frac{1}{2}}$$



Тогда, перепишем закон Фурье:

$$const = \frac{qz^2}{A} = B = -z^2 \sqrt{T} \frac{dT}{dz}$$

Проинтегрируем данное уравнение, получим зависимость $T(z)$



$$B \frac{dz}{z^2} = -\sqrt{T} dT$$

$$B \int_{z_0}^z \frac{dz}{z^2} = - \int_T^{T_0} \sqrt{T} dT$$

$$B \left(\frac{1}{z_0} - \frac{1}{z} \right) = \frac{2}{3} (T_0^{\frac{3}{2}} - T^{\frac{3}{2}})$$

$$T(z) = \left(C + \frac{D}{z} \right)^{\frac{2}{3}}$$

Где $C = T_0^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2} \frac{B}{z_0}$, а $D = \frac{3}{2} B$.

Распределение концентрации

Воспользуемся полученным распределением температур для получения распределения концентраций в атмосфере:

$$dP = -nmgdz$$

Для идеального газа известно соотношение:

$$P = nkT$$

Дифференцируя его, получим следующее:

$$dP = k(Tdn + ndT)$$

$$ndT + Tdn = -\frac{nmg}{k} dz$$


$$\frac{dn}{n} = -\frac{dT}{T} - \frac{mg}{kT} dz$$

Из полученной зависимости температуры от радиуса имеем:

$$T = \left(C + \frac{D}{z} \right)^{\frac{2}{3}}$$

$$dT = \frac{2}{3} \left(C + \frac{D}{z} \right)^{-\frac{1}{3}} \cdot \left(-\frac{D}{z^2} \right) dz$$

$$\frac{dT}{T} = \frac{\frac{2}{3} \left(-\frac{D}{z^2} \right)}{C + \frac{D}{z}} dz = -\frac{2}{3} \frac{dz}{\left(\frac{C}{D} z + 1 \right) z}$$



$$\frac{mg}{kT}dz = \frac{mg}{k(C + \frac{D}{R})^{\frac{2}{3}}}dz$$

Итоговое уравнение:

$$\frac{dn}{n} = \left(\frac{2}{3} \frac{1}{(\frac{C}{D}z + 1)z} - \frac{mg}{k(C + \frac{D}{z})^{\frac{2}{3}}} \right) dz \quad (1)$$

Теперь для нахождения зависимости $n(z)$ необходимо проинтегрировать обе части равенства, тогда слева получим:

$$\int \frac{dn}{n} = \ln n + const$$

Правую часть будем интегрировать пошагово.

1) Сначала проинтегрируем левое слагаемое в скобках:

$$\int \frac{2}{3} \frac{dz}{(\frac{C}{D}z + 1)z} = \frac{2}{3} \int \frac{dz}{(\frac{C}{D}z + 1)z} = \frac{2}{3} \left(\int \frac{dz}{z} - \frac{C}{D} \int \frac{dz}{\frac{C}{D}z + 1} \right) = \frac{2}{3} \ln \frac{Dz}{Cz + D} + const$$

2) Возьмем интеграл в правой части:

$$\int \frac{1}{(C + \frac{D}{z})^{\frac{2}{3}}} dz \quad (2)$$

С помощью замены $t^3 = (c + \frac{D}{z})$, интеграл сведется к виду:

$$-3D \int \frac{dt}{(t^3 - F^3)^2}$$

где $F^3 = C$

3) Чтобы взять этот интеграл проведем некоторые вспомогательные преобразования:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(t^3 - F^3)} &= \frac{1}{(t - F)(t^2 + Ft + F^2)} = \frac{1}{3F^2} \left(\frac{1}{t - F} - \frac{t + 2F}{t^2 + Ft + F^2} \right) \\ \frac{1}{(t^3 - F^3)^2} &= \frac{1}{9F^4} \left(\frac{1}{t - F} - \frac{t + 2F}{t^2 + Ft + F^2} \right)^2 = \\ &= \frac{1}{9F^4} \left(\frac{1}{(t - F)^2} + \frac{(t + 2F)^2}{(t^2 + Ft + F^2)^2} - \frac{2(t + 2F)}{(t - F)(t^2 + Ft + F^2)} \right) \end{aligned} \quad (3)$$

4) Проинтегрируем полученные 3 слагаемых по отдельности:

$$\int \frac{1}{9F^4} \frac{1}{(t - F)^2} dt = -\frac{1}{9F^4} \frac{1}{t - F} + const$$

5) Для того, чтобы проинтегрировать второе слагаемое воспользуемся методом Остроградского:

$$\frac{1}{9F^4} \int \frac{t^2 + 4tF + 4F^2}{(t^2 + Ft + F^2)^2} dt = \frac{1}{9F^4} \left(\int \frac{at + b}{t^2 + Ft + F^2} dt + \frac{ct + d}{t^2 + Ft + F^2} \right) \quad (4)$$

Продифференцировав обе части, составим систему линейных уравнений, откуда найдём неопределённые коэффициенты в правой части равенства

$$\frac{t^2 + 4tF + 4F^2}{(t^2 + Ft + F^2)^2} = \frac{at + b}{t^2 + Ft + F^2} + \frac{c(t^2 + Ft + F^2) - (ct + d)(2t + F)}{(t^2 + Ft + F^2)^2}$$

$$\begin{cases} 0 = a \\ 1 = aF + b + c - 2c \\ 4F = aF^2 + bF + cF - 2d - cF \\ 4F^2 = bF^2 + cF^2 - dF \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = 2 \\ c = 1 \\ d = -F \end{cases}$$

Откуда, подставляя в (4) имеем:

$$\frac{1}{9F^4} \int \frac{(t + 2F)^2}{(t^2 + Ft + F^2)^2} = \frac{1}{9F^4} \left(\int \frac{2dt}{t^2 + Ft + F^2} + \frac{t - F}{t^2 + Ft + F^2} \right) = \frac{4 \operatorname{arctg} \frac{F+2t}{F\sqrt{3}}}{9F^5\sqrt{3}} + \frac{t - F}{t^2 + Ft + F^2}$$

Теперь проинтегрируем оставшийся член в (3):

$$\begin{aligned} \frac{2(t + 2F)}{(t - F)(t^2 + Ft + F^2)} &= \frac{2(t + 2F)}{3F^2} \left(\frac{1}{t - F} - \frac{t + 2F}{t^2 + Ft + F^2} \right) = \\ &= \frac{2}{3F^2} \left(\frac{t + 2F}{t - F} + \frac{t^2 + 4Ft + 4F^2}{t^2 + Ft + F^2} \right) = \frac{2}{3F^2} \left(1 + \frac{3F}{t - F} - 1 - \frac{3Ft + 3F^2}{t^2 + Ft + F^2} \right) = \\ &= \frac{2}{3F^2} \left(\frac{3F}{t - F} - \frac{3Ft + 3F^2}{t^2 + Ft + F^2} \right) = \frac{2}{F} \left(\frac{1}{t - F} - \frac{t + F}{t^2 + Ft + F^2} \right) \end{aligned}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \frac{1}{9F^4} \int \frac{2(t + 2F)}{(t - F)(t^2 + Ft + F^2)} dt &= \frac{2}{9F^5} \int \left(\frac{1}{t - F} - \frac{t + F}{t^2 + Ft + F^2} \right) dt = \\ &= \frac{1}{9F^5} \ln(t^2 + Ft + F^2) + \frac{2}{9\sqrt{3}F^5} \operatorname{arctg} \frac{2t + F}{F\sqrt{3}} + const \end{aligned}$$

В итоге подставляя всё в (2) имеем:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(C + \frac{D}{z})^{\frac{2}{3}}} dz &= -3D \int \frac{dt}{(t^3 - F^3)^2} = -3D \left(-\frac{1}{9F^4} \frac{1}{t - F} + \frac{4}{9\sqrt{3}F^5} \operatorname{arctg} \frac{F + 2t}{F\sqrt{3}} - \frac{2}{9F^5} \ln |t - F| + \right. \\ &\quad \left. \frac{1}{9F^5} \ln(t^2 + Ft + F^2) + \frac{2}{9\sqrt{3}F^5} \operatorname{arctg} \frac{F + 2t}{F\sqrt{3}} + \frac{1}{9F^4} \frac{t - F}{t^2 + Ft + F^2} \right) + const = \\ &= -3D \left(\frac{1}{3F^3} \frac{-t}{t^3 - F^3} + \frac{2\sqrt{3}}{9F^5} \operatorname{arctg} \frac{F + 2t}{F\sqrt{3}} + \frac{1}{9F^5} \ln \frac{(t^2 + Ft + F^2)}{(t - F)^2} \right) + const = \end{aligned}$$

$$= -\frac{9}{2}B \left(\frac{1}{3F^3} \frac{-(C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}}}{\frac{3B}{2z}} + \frac{2\sqrt{3}}{9F^5} \operatorname{arctg} \frac{F + 2(C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}}}{F\sqrt{3}} + \frac{1}{9F^5} \ln \left| \frac{\frac{3B}{2z}}{((C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}} - F)^3} \right| \right) + const$$

Таким образом, проинтегрируем дифференциальное уравнение (1), получим следующее:

$$\begin{aligned} \ln \frac{n}{n_0} &= \left(\frac{2}{3} \ln \frac{Dz}{Cz + D} + \frac{9}{2} \frac{Bmg}{k} \left(\frac{1}{3F^3} \frac{-(C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}}}{\frac{3B}{2z}} + \frac{2\sqrt{3}}{9F^5} \operatorname{arctg} \frac{F + 2(C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}}}{F\sqrt{3}} + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{1}{9F^5} \ln \left| \frac{\frac{3B}{2z}}{((C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}} - F)^3} \right| \right) \right) \Big|_{z_0}^z = \\ &= \ln \left(\frac{z}{z_0} \frac{Cz_0 + D}{Cz + D} \right)^{\frac{2}{3}} + \frac{mg}{kF^3} \left(z_0 \left(C + \frac{D}{z_0} \right)^{\frac{1}{3}} - z \left(C + \frac{D}{z} \right)^{\frac{1}{3}} \right) + \\ &\quad + \frac{Bmg\sqrt{3}}{kF^5} \operatorname{arctg} \frac{F + 2(C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}}}{F\sqrt{3}} - \frac{Bmg\sqrt{3}}{kF^5} \operatorname{arctg} \frac{F + 2(C + \frac{D}{z_0})^{\frac{1}{3}}}{F\sqrt{3}} + \\ &\quad + \frac{Bmg}{2kF^5} \ln \frac{z_0}{z} \left(\frac{(C + \frac{D}{z_0})^{\frac{1}{3}} - F}{(C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}} - F} \right)^3 \\ n &= n_0 \cdot \left(\frac{z}{z_0} \frac{Cz_0 + D}{Cz + D} \right)^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{z_0}{z} \right)^{\frac{Bmg}{2kF^5}} \left(\frac{(C + \frac{D}{z_0})^{\frac{1}{3}} - F}{(C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}} - F} \right)^{\frac{3Bmg}{2kF^5}} \cdot \exp \left(\frac{mg}{kF^3} \left(z_0 \left(C + \frac{D}{z_0} \right)^{\frac{1}{3}} - z \left(C + \frac{D}{z} \right)^{\frac{1}{3}} \right) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{Bmg\sqrt{3}}{kF^5} \left(\operatorname{arctg} \frac{F + 2(C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}}}{F\sqrt{3}} - \operatorname{arctg} \frac{F + 2(C + \frac{D}{z_0})^{\frac{1}{3}}}{F\sqrt{3}} \right) \right) \quad (5) \end{aligned}$$

Для Земли

Применим полученный результат для распределения концентрации газа в атмосфере Земли, для этого зададим начальные условия: за температуру поверхности примем $T_0 = 300K$, температуру космоса примем за $T_1 = 1K$ (то есть температура на бесконечном удалении от Земли), радиус земли $z_0 = 6400$ км. Тогда из начальных условий найдём значения обозначений, которые мы вводили для краткости записи:

$$B = 2,2166 \cdot 10^{10} \text{ K}^{3/2} \cdot \text{м}$$

$$D = 3,3255 \cdot 10^{10} \text{ K}^{3/2} \cdot \text{м}$$

$$C = 1 \text{ K}^{3/2}$$

$$F = 1 \text{ K}^{1/2}$$

Для того, чтобы вычислить эти константы достаточно перейти к пределу в полученной ранее формуле $T^{3/2} = T_0^{3/2} - \frac{3}{2}B(\frac{1}{z_0} - \frac{1}{z})$. Остальные же обозначения выражаются так:

$$C = T_0^{3/2} - \frac{3}{2} \frac{B}{z_0}$$

$$D = \frac{3}{2}B$$


$$F = \left(T_0^{3/2} - \frac{3}{2}B \left(\frac{1}{z_0} - \frac{1}{z} \right) \right)^{1/3}$$

Подставляя полученные значения можно заметить, что множитель при n_0 приблизительно равен ≈ 1 . А также логарифм и арктангенс в степени экспоненты пренебрежимо малы, тогда распределение (5) примет вид:

$$n = n_0 \cdot \exp \left(\frac{mg}{kC} \left(z_0 \left(C + \frac{D}{z_0} \right)^{1/3} - z \left(C + \frac{D}{z} \right)^{1/3} \right) \right) \approx$$

$$\approx n_0 \cdot \exp \left(\frac{mgD^{1/3}}{kC} (z_0^{2/3} - z^{2/3}) \right)$$

Построим график полученной зависимости $n(z)$ и сравним полученную зависимость с обычным распределением Больцмана вблизи поверхности Земли.



На вышеприведённом графике синим обозначено обычное распределение Больцмана, а красным полученное нами распределение.

По полученному графику можно сделать вывод о том, что в нашей модели полученное нами распределение не сильно отличается от распределения Больцмана. Это следует из того, что наша модель на самом деле не отражает реальное распределение температуры от высоты, так как на Земле больше преобладают другие эффекты: парниковый, конвекция, влияние космоса (в том числе Солнца) на атмосферу Земли и другие, а теплопроводность играет второстепенную роль.

Основные результаты

1. В работе была доказана зависимость теплопроводности $\kappa \sim \sqrt{T}$ от температуры (и независимость от плотности).

2. Также была выведена зависимость температуры среды от удаления от центра силового поля $T(z) = (C + \frac{D}{z})^{2/3}$ из предположения постоянства температуры поверхности сферического источника тепла и установившегося стационарного режима с использованием полученной зависимости теплопроводности.

3. Из полученных зависимостей выведено распределение концентрации идеального газа вблизи поверхности сферического источника тепла.

$$n = n_0 \cdot \left(\frac{z}{z_0} \frac{Cz_0 + D}{Cz + D} \right)^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{z_0}{z} \right)^{Bmg/2kF^5} \left(\frac{(C + \frac{D}{z_0})^{\frac{1}{3}} - F}{(C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}} - F} \right)^{\frac{3Bmg}{2kF^5}} \cdot \exp \left(\frac{mg}{kF^3} \left(z_0 \left(C + \frac{D}{z_0} \right)^{\frac{1}{3}} - z \left(C + \frac{D}{z} \right)^{\frac{1}{3}} \right) + \frac{Bmg\sqrt{3}}{kF^5} \left(\arctg \frac{F + 2(C + \frac{D}{z})^{\frac{1}{3}}}{F\sqrt{3}} - \arctg \frac{F + 2(C + \frac{D}{z_0})^{\frac{1}{3}}}{F\sqrt{3}} \right) \right)$$

4. Полученное распределение было применено к исследованию атмосферы Земли. Полученная зависимость получилась сильно схожей с обычным распределением Больцмана, что вызвано слабым изменением температуры газа согласно выбранной модели.

5. Также можно заметить, что распределение Больцмана является частным случаем полученного распределения (если считать температуру не зависящей от координаты).

6. Полученное распределение лучше, чем распределение Больцмана, подходит для описания распределения газа в неоднородных средах вблизи источников тепла с высокой температурой, таких как атмосфера Солнца или, возможно, ионизированный газ вблизи сферического заряженного источника тепла.

Список литературы

1. Сивухин Д.В. "Общий курс физики. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика"
2. Кириченко Н.А. "Термодинамика, статистическая и молекулярная физика"
3. Фейнман Р., Леймон Р., Сендс М. "Фейнмановские лекции по физике. Том 4"