Λογαριθμικές Εξισώσεις για πιτζιτικά κύματα (Skoki's)

Ιδιότητες ριζών

- $\sqrt{a^2} = |a|$
- $\sqrt[\nu]{a} \cdot \sqrt[\nu]{\beta} = \sqrt[\nu]{a \cdot \beta}$
- $\frac{\sqrt[\nu]{a}}{\sqrt[\nu]{\beta}} = \sqrt[\nu]{\frac{a}{\beta}}$, $(\beta \neq 0)$
- $\sqrt[\mu]{\sqrt[\nu]{a}} = \sqrt[\mu\nu]{a}$
- $\sqrt[\nu\rho]{a^{\mu\rho}} = \sqrt[\nu]{a^{\mu}}$
- $\sqrt[\nu]{a^{\mu}} = a^{\mu/\nu}$

Ιδιότητες δυνάμεων

- $a^0 = 1$, $a^1 = a$, 0^0 δεν ορίζεται
- $a^\nu \cdot \beta^\nu = (a \cdot \beta)^\nu$
- $\frac{a^\nu}{\beta^\nu} = \left(\frac{a}{\beta}\right)^\nu$
- $a^\nu \cdot a^\mu = a^{\nu+\mu}$
- $\frac{a^\nu}{a^\mu} = a^{\nu-\mu}$
- $a^{-\nu} = \frac{1}{a^\nu}$
- $(a^\nu)^\mu = a^{\nu\mu}$

Ιδιότητες λογαρίθμων

δεκαδικοί λογάριθμοι

- $\log_a 1 = 0$, $(\log 1 = 0)$
- $\log_a a = 1$, $(\log 10 = 1)$
- $\log_a 0 = \begin{cases} -\infty, & a>1 \\ +\infty, & a<1 \end{cases}$ $(\log 0 = -\infty)$
- $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a (x)^\eta = \eta \log_a x$
- $\log_a \sqrt[\eta]{x} = \log_a x^{1/\eta} = \frac{1}{\eta} \log x$
- $\log_a c = \frac{1}{\log_c a}$
- $\log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$
- $a^{\log_a x} = x$, $(10^{\log x} = x)$
- $\log_e x = \ln x$