

Homework 13

BY 刘家骥 PB20071417

2022年12月18日

18, 解:

求 $f(x) = x^2$ 的二次最佳平方逼近三角多项式, 即

$$f_2(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^2 (a_i \cos ix + b_i \sin ix), x \in [-\pi, \pi]$$

得到

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos kx \, dx, \quad k = 0, 1, 2$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin kx \, dx, \quad k = 1, 2$$

因此

$$a_0 = \frac{2}{3}\pi^2, a_1 = -4, a_2 = 1$$

$$b_k = 0$$

得到

$$f_2(x) = \frac{1}{3}\pi^2 - 4\cos x + \cos 2x$$

25, 解:

(a) 证明:

对于 $f(x) \in C^2[a, b]$, 且 $f''(x) \neq 0$, 在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 的一次最佳逼近多项式为 $p_1^*(x) = c_0 + c_1x$

这里指的应该是一次最佳一致逼近多项式。

误差函数

$$e^*(x) = f(x) - p_1(x)$$

由于 $e^*(x)$ 要有 $n+2=3$ 个交错点, 也就是 $e^*(x)$ 的极值点和两个端点.

而由于 $f''(x) \neq 0$, $e^{*'}(x) = f'(x) - c_1 = 0$ 在 $[a, b]$ 内仅有一个根,

因此 $f'(x) - c_1 = 0$ 时记 $x = \tilde{x}$, 即有 $f'(\tilde{x}) = c_1$

由一次最佳一致逼近多项式定义

$$\begin{cases} f(a) - c_0 - c_1a = \rho \\ f(\tilde{x}) - c_0 - c_1\tilde{x} = -\rho \\ f(b) - c_0 - c_1b = \rho \end{cases}$$

由此得到

$$c_1 = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

记 $c = \tilde{x}$, 则有

$$c_0 = \frac{f(a) + f(c)}{2} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \frac{a + c}{2}$$

得证.

(b) 将区间替换为 $[0, \frac{\pi}{2}]$, $f(x) = \cos x$

得到

$$c_1 = -\frac{2}{\pi}, c_0 = \frac{1+f(c)}{2} + \frac{c}{\pi}$$

而由于 $c_1 = f'(c) \Rightarrow -\frac{2}{\pi} = -\sin c$, $c \in (0, \frac{\pi}{2})$

因此 $c = \arcsin \frac{2}{\pi}$, $\cos c = \frac{\sqrt{\pi^2 - 4}}{\pi} \Rightarrow c_0 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{\pi^2 - 4}}{\pi} \right) + \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{2}{\pi}$

即

$$p_1^*(x) = -\frac{2}{\pi}x + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{\pi^2 - 4}}{\pi} \right) + \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{2}{\pi}$$

26, 解:

求二次最佳一致逼近多项式.

由切比雪夫交错定理, 应该有 $n + 2 = 4$ 个交错点

设误差函数 $e^*(x) = p(x) - p_2^*(x) = p(x) - (c_0 + c_1x + c_2x^2)$

则 $e^{*'}(x) = p'(x) - (c_1 + 2c_2x) = 0$ 应有两个实根, 记为 c 和 d

$$\begin{cases} p(-1) - p_2^*(-1) = \rho \\ p(c) - p_2^*(c) = -\rho \\ p(d) - p_2^*(d) = \rho \\ p(1) - p_2^*(1) = -\rho \end{cases}$$

但是我们会发现这种方式的计算量是比较大的. 因此需要采用其他可行的方法.

例如使用 Chebyshev 多项式进行近似.

原多项式是 $p(x) = 6x^3 + 3x^2 + x + 4$, 构造一个最高次项为 1 的多项式

$$p_3^*(x) = \frac{1}{6}p(x) - p_2^*(x)$$

这个就是误差函数, 要达到最小, 令

$$p_3^*(x) = 2^{1-3}T_3(x) = x^3 - \frac{3}{4}x$$

因此近似的最佳一致逼近多项式是

$$p_2(x) = 6 \cdot p_3^*(x) = 3x^2 + \frac{11}{2}x + 4$$

27, 解:

根据定义, 在权函数 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 时, 区间 $[-1, 1]$ 内的‘一组正交基函数就是(第一类)Chebyshev 多项式.

因此设三次最佳平方逼近多项式为

$$S_3(x) = \sum_{i=0}^3 c_i T_i(x)$$

其中系数

$$c_i = \frac{(f(x), T_i(x))}{(T_i(x), T_i(x))}$$

因此

$$c_1 = c_3 = 0, \quad c_0 = \frac{\int_{-1}^1 \cos \frac{\pi}{2} x \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx}{\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx} \approx 0.4720, \quad c_2 = \frac{\int_{-1}^1 \cos \frac{\pi}{2} x T_2(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx}{\int_{-1}^1 T_2^2(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx} \approx -0.4994$$

得到

$$S_3(x) \approx -0.9988x^2 + 0.9714 \approx -x^2 + 1$$