

# LEY DE TITIUS-BODE

## Teoría.

- Ley de Titius

Hacia el año 1766, **J. B. Titius** descubrió una ley empírica sobre la posición de los planetas en el Sistema Solar. Esta ley fue publicada de manera independiente en 1772 por **Johann Elert Bode**, y fue conocida desde entonces como la ley de Titius-Bode (Aschwanden, 2017). *Esta ley establece que el radio orbital de los planetas sigue una serie matemática progresiva expresada de la siguiente forma* (Lynch, 2003):

$$r(n) = 0,4 + 0,3 \cdot 2^{n-1} \quad n = -\infty, 0, 1, 2, 3, \dots$$

donde  $n$  representa el número del planeta. En este a Mercurio se le asigna  $-\infty$ ; a Venus, el valor de 0, y así sucesivamente hasta Saturno que, en la época en que fue descubierta esta ley, era el planeta más lejano del cual se tenía conocimiento. Cabe mencionar que para que dicha ley funcione los *radios orbitales están medidos en unidades astronómicas*. Una unidad astronómica equivale a la distancia de la Tierra al Sol

Para 1772, el cinturón de asteroides (representado por el asteroide Ceres en la tabla 1), Urano, Neptuno y Plutón aún no eran descubiertos. Sin embargo, Herschel en 1781 descubrió Urano, y Piazzi, en 1801, descubrió Ceres gracias a la predicción de esta ley.

Sin embargo, se puede observar que la ley de Titius-Bode falla para las posiciones de Neptuno y Plutón. Algunos autores han tratado de explicar lo anterior debido a perturbaciones gravitacionales con el cercano cinturón de Kuiper (semillero de cometas en las afueras del Sistema Solar), así como por el movimiento del Sol alrededor de la galaxia (Llibre y Piñol, 1987).

- Otro autores.

Desde la publicación de esta ley hasta la fecha, diversos autores han tratado de encontrar una teoría física que la respalde, sin llegar a algo concluyente. Algunos empiezan por expresarla de la

siguiente manera (Aschwanden, 2017) para evitar asignar el valor de  $-\infty$  a Mercurio:

$$r(n) = 0,4 \text{ si } n = 1$$

$$r(n) = 0,4 + 0,3 \cdot 2^{n-2} \text{ si } n = 2, 3, 4, \dots$$

Aunque no se ha encontrado una teoría física única y definitiva que respalde la **ley de Titius-Bode**, el hecho de que existan algunos sistemas de satélites y sistemas extrasolares que con ligeras modificaciones se ajustan a esta ley, y el que haya una relación con las resonancias planetarias, abre la posibilidad de que algún día sea posible dar una explicación que vaya más allá de una simple coincidencia matemática



## Resultados

Mostraremos los resultados de la **ley de Titius-Bode**, comparando las distancias

distancias reales medidas con las predichas de por la serie, y así observar las

discrepancias entre la teoría y la realidad.

Primero mostramos las distancias reales entre el Sol y los planetas:

Podemos ver las distancias a los planetas de este mismo enlace [aquí](#)

```
In [2]: # primero crearemos un Data Frame, para así poder visualizar las distancias de manera simple
import pandas as pd

# creamos tres listas, una para los planetas, otra para las distancias reales y otra el orden de los planetas
planeta = [ "Mercurio", "Venus", "la Tierra", "Marte", "Ceres", "Júpiter", "Saturno", "Urano", "Neptuno" ]
# r es la distancia del sol a cada planeta por orden.
r = [0.39, 0.72, 1.00, 1.52, 2.77, 5.20, 9.54, 19.18, 30.06, 39.44 ]
# es el número de orden del planeta
n = []
for i in range(1, 11 ):
    n.append(i)

df = pd.DataFrame(list(zip(planeta, r)), columns = ['planeta', "distancia real"], index = n)
df
```

```
Out[2]:
```

	planeta	distancia real
1	Mercurio	0.39

	planeta	distancia real
2	Venus	0.72
3	la Tierra	1.00
4	Marte	1.52
5	Ceaes	2.77
6	Júpiter	5.20
7	Saturno	9.54
8	Urano	19.18
9	Neptuno	30.06
10	Pluton	39.44

Ahora vamos a calcular los resultados predichos por la ley de **ley de Titius-Bode** :

Haciendo uso de la formula corregida:

$$r(n) = 0,4 \text{ si } n = 1$$

$$r(n) = 0,4 + 0,3 \cdot 2^{(n-2)} \text{ } n = 2,3,4,\dots$$

```
In [3]: # sea rtb la distancia predicha por la fórmula de Titius-Bode.
# crearemos una lista vacia para ir registrando los cálculos de los radio

rtb = []

# haremos un bucle para hacer todos los cálculos

for j in range ( 1,11): # se hace le bucle para calcular los 10 planetas.
    if j == 1 : # condicionamos el cáclculo del primer planeta, tal como expresa la fórmu.
        x = 0.4
        rtb.append(x)
    else :
        y = 0.4 +(0.3)*(2**(j-2))
        y = round (y, 1)
        rtb.append(y)
print ( rtb)
```

```
[0.4, 0.7, 1.0, 1.6, 2.8, 5.2, 10.0, 19.6, 38.8, 77.2]
```

Ahora compararemos la distancia predicha con la real.

```
In [4]: # para ello vamos a montar un segundo dataframe con los resultados téricos con los reales

df = pd.DataFrame(list(zip(planeta, r, rtb)), columns = ['planeta', "distancia real", " di
df
```

```
Out[4]:
```

	planeta	distancia real	distancia teórica
1	Mercurio	0.39	0.4
2	Venus	0.72	0.7
3	la Tierra	1.00	1.0
4	Marte	1.52	1.6

	planeta	distancia real	distancia teórica
5	Ceares	2.77	2.8
6	Júpiter	5.20	5.2
7	Saturno	9.54	10.0
8	Urano	19.18	19.6
9	Neptuno	30.06	38.8
10	Pluton	39.44	77.2

Como podemos observar, **las discrepancias empiezan a ser apreciables a partir de Neptuno**.

Aún así, vamos a calcular la discrepancia relativa porcentual entre el valor real y el valor teórico,

y vamos a dar por malo una discrepancia mayor al 10%

In [12]:

```
for i in range ( 0,10):
    discrepancia_porcentual = (abs(r[i]-rtb[i])/ r[i])*100

    if discrepancia_porcentual > 10 :
        print ( " la discrepancia medida del planeta ", planeta [i], " es mayor al 10%")
```

```
la discrepancia medida del planeta  Neptuno  es mayor al 10%
la discrepancia medida del planeta  Pluton   es mayor al 10%
```

In [ ]: