

Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat de Ciències



SEMINARI 3: SERIES DE FOURIER

Autors:

Gerard Lahuerta & Ona Sánchez & Andrea González

1601350 — 1601181 — 1603921

15 de Maig del 2022

Índex

1	Exercici 3.2.4	3
2	Exercici 3.3.6	6
3	Exercici 3.7.11	10

1 Exercici 3.2.4

Feu el mateix amb la funció $P_{T,a}(x)$ ($0 < 2a < T$) que val $\text{sign}(x)$ a $(-a, a)$ i zero als intervals $[-T/2, -a]$ i $[a, T/2]$.


(a) **Dibuixar $P_{T,a}$ (doneu valors concrets de T i a)**

Per dibuixar $P_{T,a}$, farem us de la comanda *piecewise*.

```
var('x,T,a',domain = 'real')
var('n',domain = 'integer')
assume(a>0)
assume(T>2*a)

a = 2
T = 6
P = piecewise((-T/2,-a),0),((-a,0),-1),([0,a],1),((a,T/2),0),var=X)
plot(P,(x,-T/2,T/2))
```

Output:



(b) **Trobar** a_0 .

```
a0 = (2/T)*integral(1-abs(x)/a,(x,-T/2,T/2)).simplify_full()  
show(a0)
```

Output:

Executant aquest codi, el *show* ens mostra el valor d' a_0 que és $\frac{1}{2}$.

(c) **Trobar els coeficients de Fourier** a_n i b_n . **Calcular** c_n .

```
an=2/T*(integral(-1*cos(2*pi*n*x/T),(x,-a,0))+  
    integral(1*cos(2*pi*n*x/T),(x,0,a))).simplify_full()  
show(an)  
  
bn=2/T*(integral(-1*sin(2*pi*n*x/T),(x,-a,0))+  
    integral(1*sin(2*pi*n*x/T),(x,0,a))).simplify_full()  
show(bn)  
  
cn = 1/2*(an-I*bn)  
show(cn)
```

Output:

$$a_n = 0$$
$$b_n = -\frac{2(\cos(\frac{3}{2}\pi) - 1)}{\pi n}$$
$$c_n = \frac{i(\cos(\frac{3}{2}\pi) - 1)}{\pi n}$$

(d) Dibuixar el polinomis de Fourier $s_7(x)$ i $s_3(x)$ i comparar amb la gràfica de $P_{T,a}$.

```


s3=a0/2+sum(bn(n)*sin(2*pi*n*x/T) for n in range(1,4))
s7=a0/2+sum(bn(n)*sin(2*pi*n*x/T) for n in range(1,8))
Q = s3.plot(x,-T/2,T/2)+s7.plot(x,-T/2,T/2, color = 'red')
W = plot(P,(x,-T/2,T/2), color = 'green')
show(W+Q)

```

Output:

$$s_3 = \frac{\sin(6x)}{3\pi} + \frac{\sin(4x)}{2\pi} + \frac{\sin(2x)}{\pi} + \frac{1}{2}$$

$$s_7 = 3\frac{\sin(\frac{7}{3}\pi \cdot x)}{7\pi} + 3\frac{\sin(\frac{5}{3}\pi x)}{5\pi} + 3\frac{\sin(\frac{4}{3}\pi x)}{4\pi} + 3\frac{\sin(\frac{2}{3}\pi x)}{2\pi} + 3\frac{\sin(\frac{1}{3}\pi x)}{1\pi} + \frac{1}{4}$$




2 Exercici 3.3.6

Feu el mateix que a l'exercici anterior amb la funció $f(x) = x^2$ quan $x \in [0, 2\pi]$.

- (a) Definiu aquest funció en Sage amb la comanda `piecewise`.

```
var('x')
P = piecewise([([0, 2*pi], x^2)], var=x)
plot(P)
```

Output:



- (b) Trobeu els a_n , b_n quan n va de 0 a 10.

```
an=[P.fourier_series_cosine_coefficient(n) for n in range(11)]
bn=[P.fourier_series_sine_coefficient(n) for n in range(11)]
show(an, bn)
```

Output:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	$\frac{8}{3}\pi^2$	4	1	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{4}{49}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{81}$	$\frac{1}{25}$
b	0	-4π	-2π	$-\frac{4}{3}\pi$	$-\pi$	$-\frac{4}{5}\pi$	$-\frac{2}{3}\pi$	$-\frac{4}{7}\pi$	$-\frac{1}{2}\pi$	$-\frac{4}{9}\pi$	$-\frac{2}{5}\pi$

(c) Trobeu els polinomis trigonomètric d'ordre 5 i d'ordre 10.

```
T = 2*pi
s5=sum(an[n]*cos(2*pi*n*x/T) +bn[n]*sin(2*pi*n*x/T) for n in range(0,5))
show(s5)

s10=sum(an[n]*cos(2*pi*n*x/T) +bn[n]*sin(2*pi*n*x/T) for n in range(0,10))
show(s10)
```

Output:


$$s_5 = \frac{8}{3}\pi^2 - \pi \sin(4x) - \frac{4}{3}\pi \sin(3x) - 2\pi \sin(2x) - 4\pi \sin(x) + \frac{1}{4}\cos(4x) + \frac{4}{9}\cos(3x) \\ + \cos(2x) + 4\cos(x)$$

$$s_{10} = \frac{8}{3}\pi^2 - \frac{4}{9}\pi \sin(9x) - \frac{1}{2}\pi \sin(8x) - \frac{4}{7}\pi \sin(7x) - \frac{2}{3}\pi \sin(6x) - \frac{4}{5}\pi \sin(5x) - \pi \sin(4x) \\ - \frac{4}{3}\pi \sin(3x) - 2\pi \sin(2x) - 4\pi \sin(x) + \frac{4}{81}\cos(9x) + \frac{1}{16}\cos(8x) + \frac{4}{49}\cos(7x) \\ + \frac{1}{9}\cos(6x) + \frac{4}{25}\cos(5x) + \frac{1}{4}\cos(4x) + \frac{4}{9}\cos(3x) + \cos(2x) + 4\cos(x)$$

(d) Feu un gràfic que compari les gràfiques de T i s_{10} . S'observa fenomen de Gibbs?

```
P1 = plot(P, (x,0,2*pi))  
P2 = plot(s10,(x,-2,8), color = 'red')  
show(P1+P2)
```

Output:



Com és pot observar al gràfic, la funció s_{10} (sèrie de Fourier d'ordre 10) pateix el fenòmen de *Gibbs* (fent que als extrems de la "periodicitat" vagi al punt mig).

(e) Dibuixeu, en un sol gràfic, els polinomis s_n per $n = 1, 2, 3, 5, 7, 15$.

```
n_list = [1, 2, 3, 5, 7, 15]
s_list = []
plot_list = []

an=[P.fourier_series_cosine_coefficient(n) for n in range(16)]
bn=[P.fourier_series_sine_coefficient(n) for n in range(16)]


for i in n_list:
    s_list.append(sum(an[n]*cos(2*pi*n*x/T) \
                      + bn[n]*sin(2*pi*n*x/T) for n in range(0,i+1)))

color_list = ['black','blue','red','green','purple','orange']

for i,j in zip(s_list,color_list):
    plot_list.append(plot(i,(x,-2,8), color = j))

show(sum(plot_list))
```

Output:




3 Exercici 3.7.11

- (a) Reescaleu els coeficients i poseu $C_n = Tc_n$. Dibuixeu els punts $\{(n/T, C_n) : |n/T| \leq 8\}$ quan $T = 2, 4, 16, 30$ (és el dibuix de l'espectre amb signe).

```
var('x')
T = 2
P = piecewise([([-T/2, -1/2], 0), ((-1/2, 1/2), 1), ((1/2, T/2), 0)], var=x)
plot(P)
```

Output:



```
var('n', 't')

an=2/t*(integral(cos(2*pi*n*x/t),(x,-1/2,1/2))).simplify_full()

bn=2/t*(integral(sin(2*pi*n*x/t),(x,-1/2,1/2))).simplify_full()

cn = 1/2*(an-I*bn)

show(an)
show(bn)
show(cn)
```

Output:

$$a_n = \frac{2\sin(\frac{\pi n}{t})}{\pi n}$$
$$b_n = 0$$
$$c_n = \frac{\sin(\frac{\pi n}{t})}{\pi n}$$

Com que $b_n = 0$, es calcula c_n com $\frac{1}{2} \cdot a_n$.


```

fac = 1
for T in [2, 4, 16, 30]:
    cn=1/T*(integral(cos(2*pi*n*x/T),(x,-1/2,1/2))).simplify_full()


    r1 = range(-8*T*fac,0)
    r2 = range(1,8*T*fac+1)
    p = [(n/fac/T,cn(n/fac)*T) for n in r1]
    p += [(n/fac/T,cn(n/fac)*T) for n in r2]
    show(points(p,color='red', pointsize = 10) )

```


Output:




(a) $T = 2$



(b) $T = 4$



(c) $T = 16$



(d) $T = 30$