

Zusammenfassung Gew. Diff'gleichungen

© Tim Baumann, <http://timbaumann.info/uni-spicker>

Def (Klassifikation von DGLn).

- (I) **Gewöhnliche** DGL: Gesucht ist Funktion in einer Variable
Partielle DGL: Gesucht ist Funktion in mehreren Variablen
- (II) **Ordnung** einer DGL: Höchste Ableitung der gesuchten Funktion, die in Gleichung vorkommt
- (III) **Explizite DGL**: Gleichung der Form $y^{(k)} = f(t, y, \dot{y}, \dots, y^{(k-1)})$
Implizite DGL: Allgemeinere Form $F(t, y, \dot{y}, \dots, y^{(k)}) = 0$
- (IV) **Skalare** DGL: Gesucht ist Funktion mit Wert in \mathbb{R}
 n -dimensionale DGL: Gesuchte Funktion hat Wert in \mathbb{R}^n
- (V) **Lineare** DGL: Gleichung hat die Form
$$a_k(t)y^{(k)}(t) + a_{(k-1)}(t)y^{(k-1)}(t) + \dots + a_1(t)\dot{y}(t) + a_0(t)y(t) = 0$$
- (VI) **Autonome** DGL: Gleichung der Form $F(y, \dot{y}, \dots, y^{(k)}) = 0$
(keine Abhängigkeit von t , Zeitinvarianz)

Notation. Sei im Folgenden I stets ein Intervall in \mathbb{R} .

- Def.** • Es sei $\mathcal{D} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Eine differenzierbare Funktion $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt **Lösung** von $\dot{y} = f(t, y)$, falls für alle $t \in I$ gilt: $\dot{y}(t) = f(t, y(t))$.
- Es sei $\mathcal{D} \subset \mathbb{R} \times \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_{k \text{ mal}}$, $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Eine k -mal differenzierbare Funktion $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt **Lösung** von $y^{(k)} = f(t, y, \dot{y}, \dots, y^{(k-1)})$, falls für alle $t \in I$ gilt:
$$y^{(k)} = f(t, y(t), \dot{y}(t), \dots, y^{(k-1)}(t))$$

Satz. • Ist $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Lösung von $y^{(k)} = f(t, y, \dot{y}, \dots, y^{(k-1)})$ (1.2), dann ist
$$(y_1, \dots, y_k) : I \rightarrow \mathbb{R}^{kn}$$
$$t \mapsto (y_1(t), \dots, y_k(t)) = (y(t), \dot{y}(t), \dots, y^{(k-1)}(t))$$
eine Lösung von System (1.3)

$$\dot{y}_1 = y_2$$

$$\dot{y}_2 = y_3$$

$$\dot{y}_3 = y_4$$

$$\vdots$$

$$\dot{y}_{k-1} = y_k$$

$$\dot{y}_k = f(t, y_1, y_2, \dots, y_{k-1}, y_k)$$

- Ist $(y_1, \dots, y_k) : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Lösung von (1.3), dann ist $y = y_1 : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Lösung von (1.2).

Satz. • Ist $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Lösung von AWP (1.1), dann ist

$$(y_1, y_2) : I \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$$

$$t \mapsto (y_1(t), y_2(t)) = (t, y(t))$$

eine Lösung des AWP (1.4)

$$\dot{y}_1(t) = 1, y_1(t_0) = t_0, \dot{y}_2(t) = f(y_1(t), y_2(t)), \quad y_2(t_0) = y_0$$

- Ist $(y_1, y_2) : I \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ eine Lösung von (1.4), dann ist $y = y_2 : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Lösung von (1.1).