

Numerične metode - preizkusi iz teorije

Ladisk

12. februar 2019

Kazalo

1	Datum: 11.1.2019	2
2	Datum: 28.1.2019	4
3	Datum: 11.2.2019	7

1 Datum: 11.1.2019

1. vprašanje

Podano tabelo podatkov: $x = (0, 1, 2)$, $y = (1, 4, 2)$ je potrebno interpolirati. Najprej predstavite interpolacijo podane tabele kot problem reševanja sistema linearnih enačb, nato predstavite Lagrangevo interpolacijsko metodo in jo uporabite na tabeli podatkov. Pojasnite razlike med obema pristopoma. Ali je rezultat enak? (35 %)

Okviren odgovor (skice tukaj niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora)

Polinomska interpolacija: podane imamo 3 točke, zato uporabimo interpolacijo s polinomom 2. stopnje:

$$y = a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0. \quad (1)$$

Nastavimo sistem enačb oblike $A \cdot x = b$:

_____ Točk: 5

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Določimo neznanke (tukaj samo nakažemo rešitev, numerično pravilen postopek je z uporabo Gaussove eliminacije):

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

_____ Točk: 5

Lagrangeva metoda: enačbi Lagrangeve interpolacijske metode:

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^{n-1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad (4)$$

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} y_i \cdot l_i(x). \quad (5)$$

_____ Točk: 5

Najprej definiramo Lagrangeve polinome:

$$\begin{aligned} l_0(x) &= \frac{x-1}{0-1} \cdot \frac{x-2}{0-2} \\ l_1(x) &= \frac{x-0}{1-0} \cdot \frac{x-2}{1-2} \\ l_2(x) &= \frac{x-0}{2-0} \cdot \frac{x-1}{2-1} \end{aligned} \quad (6)$$

Definiramo Lagrangev interpolacijski polinom:

_____ Točk: 5

$$P(x) = 1 \cdot l_0(x) + 4 \cdot l_1(x) + 2 \cdot l_2(x). \quad (7)$$

_____ Točk: 5

Glavna razlika med metodama je, da pri Lagrangevi interpolaciji ni potrebno reševati sistema enačb, zato je takšen pristop numerično manj zahteven.

_____ Točk: 5

Metodi vrmeta enako interpolacijsko krivuljo.

_____ Točk: 5

2. vprašanje

Za drugi odvod izpeljite: centralno diferenčno shemo 2. reda natančnost in diferenčno shemo naprej 1. reda natančnosti. (35 %)

Okviren odgovor (skice tukaj niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora)

Centralna diferenčna shema za 2. odvod: razvijemo Taylorjevo vrsto naprej in nazaj do 3. odvoda:

$$f(x+h) = f(x) + h f'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \frac{h^3}{6} f'''(x) + \mathcal{O}(h^4) \quad (1)$$

$$f(x-h) = f(x) - h f'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) - \frac{h^3}{6} f'''(x) + \mathcal{O}(h^4) \quad (2)$$

_____ Točk: 5

Enačbi seštejemo:

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2 f''(x) + \mathcal{O}(h^4) \quad (3)$$

in izrazimo drugi odvod:

$$f''(x) = \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2) \quad (4)$$

_____ Točk: 5

Pomembno je, da Taylorjevo vrsto razvijemo do vključno 3. odvoda, saj tako dobimo končno napako 2. reda (po deljenju s h^2). Tretji odvod se nato ob seštevanju enačb izniči. V primeru, da bi vrsto razvili le do 2. odvoda, bi dobili končno napako 1. reda.

_____ Točk: 5

Diferenčna shema naprej: za diferenčno shemo naprej moramo razviti dve Taylorjevi vrsti:

$$f(x+h) = f(x) + h f'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \mathcal{O}(h^3) \quad (5)$$

$$f(x+2h) = f(x) + 2h f'(x) + \frac{4h^2}{2} f''(x) + \mathcal{O}(h^3) \quad (6)$$

_____ Točk: 5

Enačbo (5) pomnožimo z 2 in ji odštejemo enačbo (6):

$$2f(x+h) - f(x+2h) = [2f(x) - f(x)] + [2h f'(x) - 2h f'(x)] + \left[\frac{2h^2}{2} f''(x) - \frac{4h^2}{2} f''(x) \right] + \mathcal{O}(h^3) \quad (7)$$

Izraz poenostavimo:

$$2f(x+h) - f(x+2h) = f(x) - h^2 f''(x) + \mathcal{O}(h^3) \quad (8)$$

_____ Točk: 5

Izrazimo drugi odvod. Ker enačbo delimo s h^2 dobimo red napake 1:

$$f''(x) = \frac{f(x) - 2f(x+h) + f(x+2h)}{h^2} + \mathcal{O}(h) \quad (9)$$

_____ Točk: 5

Ker smo napako $\mathcal{O}(h^3)$ delili s h^2 , dobimo končno napako 1. reda.

_____ Točk: 5

3. vprašanje

Zapišite uteži Simpsonove 1/3 metodo za numerično integriranje. Za tabelo podatkov $(x_0, x_1, \dots), (y_0, y_1, \dots)$ prikažite uporabo osnovnega in sestavljenega Simpsonovega pravila; komentirajte napako. Pokažite, kako lahko s pomočjo Richardsonove ekstrapolacije rezultata s korakom h in $2h$ izračunamo boljši približek. (30 %)

Okviren odgovor (skice tukaj niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora)

Uteži Simpsonove 1/3 metode: $w = \left[\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right] \cdot h$

_____ Točk: 5

Za osnovno pravilo potrebujemo 3 ekvidistančne točke:

$$x = [x_0, x_1, \dots]$$

$$y = [y_0, y_1, \dots]$$

Primer integrala:

$$I = \left(\frac{y_0}{3} + \frac{4 \cdot y_1}{3} + \frac{y_2}{3} \right) \cdot h \quad (1)$$

_____ Točk: 5

Sestavljeno pravilo.

$$x = [x_0, x_1, \dots]$$

$$y = [y_0, y_1, \dots]$$

Primer integrala:

$$I = \left(\frac{y_0}{3} + \frac{4 \cdot y_1}{3} + \frac{y_2}{3} + \frac{y_2}{3} + \frac{4 \cdot y_3}{3} + \frac{y_4}{3} \right) \cdot h \quad (2)$$

oziroma:

$$I = \left(\frac{y_0}{3} + \frac{4 \cdot y_1}{3} + \frac{2 \cdot y_2}{3} + \frac{4 \cdot y_3}{3} + \frac{y_4}{3} \right) \cdot h \quad (3)$$

_____ Točk: 5

Pri sestavljenem 1/3 Simpsonovem pravilu je pomembno, da je število intervalov sodo. (Tukaj je priporočljiva **skica**)

_____ Točk: 5

Napaka sestavljene Simpsonove metod je 4. reda: $-\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\eta)$.

_____ Točk: 5

Izračunamo integral s korakom $2h$ in korakom h :

$$I_{2h} = \left(\frac{y_0}{3} + \frac{4y_2}{3} + \frac{y_4}{3} \right) \cdot 2h \quad (4)$$

$$I_h = \left(\frac{y_0}{3} + \frac{4y_1}{3} + \frac{2y_2}{3} + \frac{4y_3}{3} + \frac{y_4}{3} \right) \cdot h \quad (5)$$

Za izboljšano aproksimacijo integrala uporabimo enačbo:

$$I = \frac{2^n I_h - I_{2h}}{2^n - 1} = \frac{16 I_h - I_{2h}}{15} \quad (6)$$

_____ Točk: 5

2 Datum: 28.1.2019

1. vprašanje

Matriko:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 6 & 8 \end{bmatrix} \quad (1)$$

(1.) preoblikujte v Gaussovo eliminirano obliko. (2.) Kakšne oblike je matrika po preoblikovanju?

Ce \mathbf{A} predstavlja razširjeno matriko sistema linearnih enačb in je zadnji stolpec vektor konstant, določite

(3.) rang osnovne in razširjene matrike. (4.) Kaj nam preoblikovana matrika lahko pove o sistemu enačb?

(5.) Ali ima podani sistem enolično rešitev? (6.) Katero operacijo izvedemo, da po Gaussovi eliminaciji dobimo rešitev sistema?

(35 %)

Okviren odgovor (skice tukaj niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora)

(1.) Postopek preoblikovanja matrike A :

$$A_1 = A_1 - A_0 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 6 & 8 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$A_2 = A_2 - 2 \cdot A_0 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$A_2 = A_2 - 0.5 \cdot A_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -0.5 \end{bmatrix} \quad (4)$$

(5)

_____ Točk: 10

(2.) Matrika je zgornje trikotna.

_____ Točk: 5

(3.) Rang razširjene matrike je enak 3. Rang osnovne matrike je enak 2.

_____ Točk: 5

(4.) Preoblikovana matrika nam pove rang osnovne matrike in rang razširjene matrike. Posledično izvemo ali ima sistem rešitev ali ne.

_____ Točk: 5

(5.) Tak sistem enačb **nima** enolične rešitve.

_____ Točk: 5

(6.) Da dobimo rešitev sistema enačb moramo uporabiti **obratno vstavljanje**.

_____ Točk: 5

2. vprašanje

Tabelo podatkov x_i , y_i želimo aproksimirati s funkcijo $f(x) = ax^{3/2} + b$. Za podano funkcijo pokažite, kako to izvedemo s pomočjo metode najmanjše kvadratične napake? Nastavite sistem enačb za določitev parametrov a in b !

(30 %)

Okviren odgovor (skice tukaj niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora)

Uporabimo enačbo za metodo najmanjših kvadratov:

$$S(a, b) = \sum_{i=0}^{n-1} (y_i - (ax_i^{3/2} + b))^2 \quad (1)$$

_____ Točk: 5

Vemo, da v stacionarni točki velja:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 0 \quad \text{in} \quad \frac{\partial S}{\partial b} = 0. \quad (2)$$

_____ Točk: 5

Izvedemo odvajanje:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 2 \cdot \sum_{i=0}^{n-1} (y_i - (ax_i^{3/2} + b)) \cdot x_i^{3/2}, \quad (3)$$

sledi:

$$0 = \sum_{i=0}^{n-1} (ax_i^3 + bx_i^{3/2} - x_i^{3/2} y_i) \quad (4)$$

_____ Točk: 5

Iz:

$$\frac{\partial S}{\partial b} = 2 \cdot \sum_{i=0}^{n-1} (y_i - (ax_i^{3/2} + b)) \cdot (-1), \quad (5)$$

sledi:

$$0 = \sum_{i=0}^{n-1} (a x_i^{3/2} + b - y_i). \quad (6)$$

_____ Točk: 5

Nastavimo lahko sistem enačb:

$$a \sum_{i=0}^{n-1} x_i^3 + b \sum_{i=1}^{n-1} x^{3/2} = \sum_{i=0}^{n-1} x_i^{3/2} y_i \quad (7)$$

in

$$a \sum_{i=1}^{n-1} x^{3/2} + b \sum_{i=1}^{n-1} 1 = \sum_{i=1}^{n-1} y_i \quad (8)$$

_____ Točk: 5

3. vprašanje

Kakšna je razlika med reševanjem diferencialnih enačb glede na začetne pogoje in reševanjem glede na robne pogoje? Zapišite centralno diferenčno shemo za odvoda \dot{x} in \ddot{x} . Pokažite, kako za robna pogoja: $x(t=0\text{ s}) = 1$ in $x(t=2\text{ s}) = 0$ rešite diferencialno enačbo: $\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$. Rešite s pomočjo centralne diferenčne sheme drugega reda. Uporabite fizikalne točke pri $t = [0,1,2]$ s. (35 %)

Okviren odgovor (skice tukaj niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora)

Pri začetnem problemu pri sistemu d.e. poznamo vrednosti vseh dodatnih enačb pri isti vrednosti neodvisne spremenljivke in tako lahko začnemo numerično integracijo. Pri robnem problemu dodatne enačbe, potrebne za rešitev d.e., poznamo pri različnih vrednosti neodvisne spremenljivke.

_____ Točk: 5

Centralna diferenčna shema za \dot{x} :

$$\dot{x}_i = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2h} \quad (1)$$

_____ Točk: 5

Centralna diferenčna shema za \ddot{x} :

$$\ddot{x}_i = \frac{x_{i-1} - 2x_i + x_{i+1}}{h^2} \quad (2)$$

_____ Točk: 5

Enačbo zapišemo s pomočjo centralne diferenčne sheme:

$$\ddot{x} = -c\dot{x} - kx \quad (3)$$

$$\frac{x_{i-1} - 2x_i + x_{i+1}}{h^2} = -c \frac{-x_{i-1} + x_{i+1}}{2h} - kx_i \quad (4)$$

_____ Točk: 5

Ker vemo, da uporabljamo samo točke pri $t = (0, 1, 2)$ sekund, **lahko zapišemo $x_i = x_1$ samo pri 1 sekundi**. To pomeni, da dobimo:

$$x_0 = x(0\text{ s}) \quad (5)$$

$$x_1 = x(1\text{ s}) \quad (6)$$

$$x_2 = x(2\text{ s}) \quad (7)$$

_____ Točk: 5

Če te vrednosti vstavimo poznane vrednosti $x(0) = 1$ in $x(2) = 0$ v enačbo (4) dobimo:

$$\frac{1 - 2x_1 + 0}{h^2} = -c \frac{-1 + 0}{2h} - kx_1 \quad (8)$$

oziroma

$$\frac{-2x_1 + 1}{h^2} = \frac{c}{2h} - kx_1 \quad (9)$$

Točk: 5

upoštevamo še, da je korak h enak 1 (točke (0, 1, 2) si sledijo s korakom 1):

$$-2x_1 + 1 = \frac{c}{2} - kx_1 \quad (10)$$

in izrazimo x_1 :

$$x_1 = \frac{c - 2}{2(k - 2)} \quad (11)$$

Točk: 5

3 Datum: 11.2.2019

1. vprašanje

Matriki \mathbf{A} :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

z uporabo principov sistema linearnih enačb, izračunajte inverzno matriko.

(35 %)

Okviren odgovor (skice tukaj niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora)

Vemo, da mora veljati:

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} \quad (2)$$

kar lahko drugače zapišemo kot:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Točk: 5

Sedaj rešujemo 3 različne sisteme enačb. Vsak sistem enačb nam poda en stolpec inverza matrike \mathbf{A} .

Prvi sistem

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$a_1 + 2a_2 + 3a_3 = 1 \quad (5)$$

$$a_1 + a_3 = 0 \quad (6)$$

$$-a_1 + a_2 + a_3 = 0 \quad (7)$$

Točk: 5

Iz enačbe (6) izrazimo a_1 in vstavimo v enačbo (7):

$$a_1 = -a_3 \quad (8)$$

$$-(-a_3) + a_2 + a_3 = 0 \quad (9)$$

$$a_2 = -2a_3 \quad (10)$$

a_1 in a_2 vstavimo v enačbo (5):

$$(-a_3) + 2(-2a_3) + 3a_3 = 1 \quad (11)$$

$$-a_3 - 4a_3 + 3a_3 = 1 \quad (12)$$

$$-2a_3 = 1 \quad (13)$$

Sedaj lahko izračunamo vrednosti:

$$a_3 = -\frac{1}{2} \quad (14)$$

$$a_1 = \frac{1}{2} \quad (15)$$

$$a_2 = 1 \quad (16)$$

Točk: 5

Drugi sistem

Enak postopek ponovimo tudi za drugi sistem.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$b_1 + 2b_2 + 3b_3 = 0 \quad (18)$$

$$b_1 + b_3 = 1 \rightarrow b_1 = 1 - b_3 \quad (19)$$

$$-b_1 + b_2 + b_3 = 0 \rightarrow -(1 - b_3) + b_2 + b_3 = 0 \rightarrow b_2 = 1 - 2b_3 \quad (20)$$

Točk: 5

Vstavimo v enačbo (18) in izračunamo vrednosti:

$$(1 - b_3) + 2(1 - 2b_3) + 2b_3 = 0 \rightarrow b_3 = \frac{3}{2} \quad (21)$$

$$b_1 = -\frac{1}{2} \quad (22)$$

$$b_2 = -2 \quad (23)$$

Točk: 5

Tretji sistem

Enak postopek ponovimo tudi za tretji sistem.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (24)$$

$$c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 0 \quad (25)$$

$$c_1 + c_3 = 0 \rightarrow c_1 = -c_3 \quad (26)$$

$$-c_1 + c_2 + c_3 = 1 \rightarrow -(-c_3) + c_2 + c_3 = 1 \rightarrow c_2 = 1 - 2c_3 \quad (27)$$

Točk: 5

Vstavimo v enačbo (25) in izračunamo vrednosti:

$$(-c_3) + 2(1 - 2c_3) + 2c_3 = 0 \rightarrow c_3 = 1 \quad (28)$$

$$c_1 = -1 \quad (29)$$

$$c_2 = -1 \quad (30)$$

Točk: 5

Vse dobljene vrednosti a_i , b_i in c_i vstavimo v enačbo (3). Vidimo, da smo izračunali inverzno matriko:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,5 & -0,5 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -0,5 & 1,5 & 1 \end{bmatrix} \quad (31)$$

2. vprašanje

Predstavite bisekcijsko metodo za numerično reševanje enačb; prikažite postopek tudi na primeru funkcije $f(x) = x^2 - 3x - 3$ in izvedite dva koraka iskanja ničle (začnite z $x_0 = -3$, $x_1 = 0$) (30 %)

Okviren odgovor (skice tukaj niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora)

Povzetek metode je:

- najprej preverimo če imata vrednosti $f(x_0)$ in $f(x_1)$ različna predznaka,
- interval $[x_0, x_1]$ razdelimo na pol in dobimo $x_2 = (x_0 + x_1)/2$,
- če imata $f(x_0)$ in $f(x_2)$ različne predznake, je nov interval $[x_0, x_2]$, sicer je $[x_2, x_1]$,
- v naslednjem koraku definiramo nov korak $[x_0, x_1]$ glede na prej določen interval.
- postopek ponavljamo dokler ne dosežemo želene natančnosti: $|x_1 - x_0| < \varepsilon$.

Bisekcijska metoda sicer ne zahteva, vendar opombo, da preverjamo končnost vsote $|f(x_0)| + |f(x_1)|$ za preprečitev identifikacije pola ali večkratne, štejemo pozitivno.

Točk: 5

Tukaj je na mestu **SKICA**

Točk: 5

Izvedemo iskanje ničle za podano funkcijo. Preverimo če na intervalu $[x_0, x_1]$ obstaja ničla:

$$f(x_0 = -3) = 15 \quad (1)$$

$$f(x_1 = 0) = -3 \quad (2)$$

$$\text{sign}(f(x_0)) \neq \text{sign}(f(x_1)) \quad (3)$$

Točk: 5

Prvi korak

Najprej izračunamo vrednost x_2 :

$$x_2 = \frac{x_0 + x_1}{2} = -1,5 \quad (4)$$

izračunamo vrednosti pri $x_0 = -3$, $x_1 = 0$ in $x_2 = -1,5$:

$$f_0 = f(-3) = (-3)^2 - 3(-3) - 3 = 15 \quad (5)$$

$$f_1 = f(0) = 0^2 - 3 \cdot 0 - 3 = -3 \quad (6)$$

$$f_2 = f(-1,5) = (-1,5)^2 - 3(-1,5) - 3 = 3,75 \quad (7)$$

Točk: 5

Vrednosti f_0 in f_2 imata enaka predznaka, zato definiramo nov interval: $[-1,5; 0]$. To postane naš novi začetni interval: $x_0 = -1,5$, $x_1 = 0$.

Točk: 5

Drugi korak

$$x_2 = \frac{-1,5 + 0}{2} = -0,75 \quad (8)$$

Izračunamo vrednosti funkcije:

$$f_0 = f(-1,5) = 3,75 \quad (9)$$

$$f_1 = f(0) = -3 \quad (10)$$

$$f_2 = f(-0,75) = -0,1875 \quad (11)$$

Vrednosti f_0 in f_2 imata različna predznaka, zato definiramo nov interval: $[-1,5; -0,75]$. To postane naš novi začetni interval: $x_0 = -1,5$, $x_1 = -0,75$.

Točk: 5

3. vprašanje

Predstavite Eulerjevo metodo za reševanje diferencialnih enačb.

Na primeru diferencialne enačbe: $\ddot{x} + kx = 0$, pokažite kako diferencialno enačbo 2. reda preoblikujemo na sistem dveh diferencialnih enačb 1. reda. Če so začetni pogoji: $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 1$, potem pokažite izračun prvih dveh časovnih korakov z Eulerjevo metodo ($k = 1$ in korak: $h = 1$). (35 %)

Okviren odgovor (skice tukaj niso podane; študente pa vzpodbujamo, da jih uporabljajo, saj lahko bistveno pripomorejo k jasnosti odgovora)

Eulerjeva metoda temelji na razvoju Taylorjeve vrste do drugega člena:

$$y(t+h) = y(t) + y'(t, y(t)) h + \mathcal{O}(h^2) \quad (1)$$

Izrazimo prvi odvod:

$$y'(t) = f(t, y) \quad (2)$$

Točk: 5

Koraki Eulerjeve metode so naslednji:

1. $i = 0$, poznamo $y(t_0)$ in $y'(t_0, y(t_0))$

2. Izračunamo vrednost funkcije pri $t_{i+1} = t_i + h$

$$y_{i+1} = y_i + f(t_i, y_i) h \quad (3)$$

3. $i = i + 1$ in ponovimo korak 2

Koraka 2 in 3 ponavljamo do t_n .

Točk: 5

Diferencialno enačbo $\ddot{x} + kx = 0$ zapišemo kot sistem diferencialnih enačb prvega reda. Preoblikujemo enačbo:

$$\ddot{x} = -kx \quad (4)$$

Zapišemo nove oznake:

$$y_0 = x \quad (5)$$

$$y_1 = \dot{x} \quad (6)$$

Točk: 5

in jih odvajamo:

$$y'_0 = x' = y_1 \quad (7)$$

$$y'_1 = x'' = -kx_0 \quad (8)$$

Dobili smo sistem dveh diferencialnih enačb prvega reda.

Točk: 5

Poznamo začetne pogoje:

$$x(0) = 0 \quad (9)$$

$$\dot{x}(0) = 1 \quad (10)$$

in tudi vrednost:

$$\ddot{x}(0) = -kx(0) = 0 \quad (11)$$

Točk: 5

Prvi korak

Sistem enačb v prvi točki:

$$y_0(t_1) = y_0(0) + y_1(0) h = 0 + 1 \cdot 1 = 1 \quad (12)$$

$$y_1(t_1) = y_1(0) - k y_0(0) h = 1 - 1 \cdot 0 \cdot 1 = 1 \quad (13)$$

Točk: 5

Drugi korak

Sistem enačb v drugi točki:

$$y_0(t_2) = y_0(t_1) + y_1(t_1) h = 1 + 1 \cdot 1 = 2 \quad (14)$$

$$y_1(t_2) = y_1(t_1) - k y_0(t_1) h = 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = 0 \quad (15)$$

Točk: 5