

南京林业大学试卷 B(A 卷) (参考答案)

课程 概率统计 B

2015~2016 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 若 A, B 是随机事件, 则以下结论正确的是 (B) .

(A) $P(B \cup A) = P(A)$

(B) $P(BA) = P(A)$

(C) $P(AB) = P(B)$

(D) $P(A - B) = P(A) - P(B)$

2. 设随机变量 X 的分布律为 $P(X = k) = a \left(\frac{1}{2}\right)^k, (k = 1, 2, \dots)$, 则 $a =$ (B) .

(A) 0.5

(B) 1

(C) 2

(D) -1

3. 设随机变量 (X, Y) , 且方差 $D(X) = 25, D(Y) = 36$, 相关系数 $\rho_{XY} = 0.4$,

则 $D(3X - 2Y) =$ (C) .

(A) 40

(B) 85

(C) 37

(D) 61

4. 设 X_1, \dots, X_n 是来自正态总体 $X \sim N(0, 1)$, \bar{X}, S^2 分别是样本的均值和样本方差, 则下列不正确的是 (D)

(A) $\bar{X} \sim N(0, 1)$

(B) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$

(C) $\frac{\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

(D) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$

5. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 μ 和 σ^2 未知, 若样本容量为 n , 且分位点均指定为“上侧分位点”时,

则 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间为 (B) .

(A) $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)} \right)$

(B) $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} \right)$

(C) $\left(\frac{(n-1)S^2}{t_{0.025}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{t_{0.975}^2(n-1)} \right)$

(D) $\left(\bar{X} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1) \right)$

二、填空题 (每空 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B 为随机事件且互不相容, 且 $P(A \cup B) = 0.8, P(A) = 0.2$, 是 $P(B) =$ 0.6

2. 已知 5 只黄色小鸡和 4 只黑色小鸡, 随机地从中取出 2 只, 则取出的小鸡颜色相同的概率为

$$\frac{4}{9} \quad (\text{用数字作答}).$$

3. 设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 则应用切比雪夫不等式得 $P(|X - \mu| \geq 3\sigma) \leq \frac{1}{9}$

4. 设 X_1, X_2, X_3 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的样本, 则当 $a = 2$ 时, $\hat{\mu} = X_1 - aX_2 + 2X_3$ 是总体均值 μ 的无偏估计。

5. 设 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 则 $P(X < 0) = 0.2$

三、(12 分) 在秋菜运输中, 某汽车可能到甲、乙、丙三地去拉菜, 设到此三处拉菜的概率分别为 0.2, 0.5, 0.3 而在各处拉到一级菜的概率分别为 0.1, 0.3, 0.7

(1) 求汽车拉到一级菜的概率;

(2) 已知汽车拉到一级菜, 求该车菜是乙地拉来的概率。

解:

四、(12 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos x, & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求: (1)

$P\left(-\frac{\pi}{4} < X < \frac{\pi}{4}\right)$; (2) X 的分布函数; (3) $Y = 2X + \pi$ 的概率密度函数。

解: (1) $P\left(-\frac{\pi}{4} < X < \frac{\pi}{4}\right) = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \cos x dx = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 0, & x < -\frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin x, & -\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 1, & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$(3) F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2X + \pi \leq y) = P\left(X \leq \frac{y - \pi}{2}\right) = F_X\left(\frac{y - \pi}{2}\right)$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{2} f_X\left(\frac{y - \pi}{2}\right) = \begin{cases} \frac{1}{4} \sin\left(\frac{y}{2}\right), & 0 \leq y \leq 2\pi \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

五、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < |x| < 1, |y| < x \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

(1) 求随机变量 X 和 Y 的边缘概率密度; (2) 求 $P\left(X < \frac{1}{2}, Y > 0\right)$;

(3) 问 X 和 Y 是否相互独立?

解: (1) 边缘概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x 1 dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} 1+y, & -1 < y < 0 \\ 1-y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

$$(2) P\left(X < \frac{1}{2}, Y > 0\right) = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^x 1 dy = \frac{1}{8}$$

(3) 因为 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不是相互独立的。

六、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$

求 (1) $E(X), E(Y)$; (2) $Cov(X, Y)$; (3) ρ_{XY} .

$$\text{解: (1) } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_x^1 6x^2 dy = \frac{1}{2}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_x^1 6xy dy = \frac{3}{4}$$

$$(2) E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_x^1 6x^2 y dy = \frac{2}{5}$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{40}$$

$$(3) E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_x^1 6x^3 dy = \frac{3}{10}$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_x^1 6xy^2 dy = \frac{3}{5}$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{3}{10} - \frac{1}{4} = \frac{1}{20}, \quad D(Y^2) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

七、(12 分) 设某总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $\theta > -1$ 为未知参数. 且

X_1, \dots, X_n 是来自总体的一个样本, 试求 θ 的矩估计量和最大似然估计量。

解: (1) 求矩估计量: 由 $E(X) = \frac{1+\theta}{2+\theta} = \bar{X}$ 得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$

(2) 求最大似然估计量: 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta+1)x_i^\theta, \quad \ln L(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0, \quad \text{解得 } \theta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}.$$

八、(10 分) 电工器材厂生产一种云母带, 其厚度服从正态分布, 且平均厚度经常保持为 0.13mm, 某日开工后检验 10 处的厚度, 算出平均值为 0.146mm, 样本标准差为 0.015mm, 问该日云母带的厚度的均值与 0.13mm 有无显著差异? 显著性水平 $\alpha = 0.02$ ($z_{0.01} = 2.33$,

$$t_{0.01}(9) = 2.82, t_{0.01}(10) = 2.76)$$

解: 检验假设: $H_0: \mu = 0.13, H_1: \mu \neq 0.13$.

因 σ 未知, 采用 t 检验法, 选择统计量为 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(9)$.

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{0.146 - 0.13}{0.015/\sqrt{10}} = 3.373 > t_{0.01}(9) = 2.82,$$

所以拒绝原假设 H_0 , 即认为该日云母带的厚度的均值与 0.13mm 有显著差异。