Дефиниция 1 *Булевата функция $f \in \mathcal{F}_2$ наричаме* самодвойнствена*, ако $f = f^\star$. Означаваме:*

$S^n = \{f \in \mathcal{F}_2^n \mid f \text{ е самодвойнствена}\}, \quad S = \bigcup_{n=1}^{\infty} S^n$.

Примери: както вече видяхме, $x, \overline{x} \in S$. Също така, $xy, x \vee y, \widetilde{0}, \widetilde{1} \notin S$.

За медианата m също проверихме, че $m \in S$. Лесно се съобразява, че няма самодвойнствени булеви функции на две променливи, които да зависят съществено и от двете си променливи.

Лема 2 $f \in S^n \iff \forall \alpha \in \{0,1\}^n \ f(\alpha) \neq f(\overline{\alpha})$.

Доказателство. $f \in S$ означава $f = f^\star$, т.е. $f(\alpha) = \overline{f(\overline{\alpha})}$ за всяко $\alpha \in \{0,1\}^n$. Това е същото като $f(\alpha) \neq f(\overline{\alpha})$ за всяко $\alpha \in \{0,1\}^n$, тъй като две булеви стойности са противоположни точно когато са различни.

Следствие 3 $|S^n| = 2^{2^{n-1}}$.

Доказателство. Лявата половина на вектора на една самодвойнствена функция еднозначно определя дясната половина, така че имаме свобода да избираме половината 2^{n-1} стойности на f.

Например, ако $f : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$, $f \in S$ и векторът на f започва с 0100, то $f = 01001101$.

Твърдение 4 *Множеството S е затворено.*

Доказателство. Проверяваме двете условия от критерия за затвореност:

1. $(I_k^n)^\star(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \overline{\overline{x_k}} = x_k = I_k^n(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, така че $I_k^n \in S$.
2. Нека $f, g_1, \ldots, g_k \in S$ и $h = f(g_1, \ldots, g_k)$. От принципа за двойнственост: $h^\star = f^\star(g_1^\star, \ldots, g_k^\star) = f(g_1, \ldots, g_k) = h$, така че $h \in S$.

Монотонни булеви функции

В множеството $\{0,1\}^n$ въвеждаме релацията *предшестване* $\preccurlyeq$.

За $\alpha, \beta \in \{0,1\}^n$, $\alpha = a_1 a_2 \ldots a_n$, $\beta = b_1 b_2 \ldots b_n$:

$$\alpha \preccurlyeq \beta \iff a_1 \leq b_1, \ a_2 \leq b_2, \ \ldots, \ a_n \leq b_n.$$

Лесно се вижда, че $\preccurlyeq$ е частична наредба, която не е линейна при $n > 1$.

Изрично да отбележим, че предшестването на n-мерни булеви вектори е нова частична наредба и тя не съвпада със стандартната линейна наредба (освен при $n = 1$). Съобразете, че всъщност стандартната линейна наредба *разширява* предшестването.

Въвеждаме още една релация $\prec \bullet$ в $\{0,1\}^n$, която ще наричаме *непосредствено предшестване*,

$$\alpha \prec \bullet \, \beta \ \Leftrightarrow \ \exists i (a_i = 0 \ \& \ b_i = 1 \ \& \ \forall j \neq i \ (a_j = b_j)).$$

С други думи, $\alpha \prec \bullet \, \beta$, ако α и β се различават в единствена позиция, в която α има 0, а β има 1.

Лема 5 *Нека $\alpha \preccurlyeq \beta$ и $\alpha \neq \beta$. Съществува редица*

$$\alpha_1 \prec \bullet\, \alpha_2 \prec \bullet \ldots \prec \bullet\, \alpha_k,$$

такава че $\alpha_1 = \alpha,\ \alpha_k = \beta$.

Доказателство. По условие, α и β се различават в $s \geq 1$ позиции, нека тези позиции имат номера $i_1, i_2, \ldots, i_s$. Следователно, векторите α и β изглеждат по следния начин:

$$\begin{aligned} \alpha &= \ldots a_{i_1} \ldots a_{i_2} \ldots\ldots a_{i_s} \ldots, \\ \beta &= \ldots b_{i_1} \ldots b_{i_2} \ldots\ldots\ b_{i_s} \ldots. \end{aligned}$$

При това имаме, че $\alpha \preccurlyeq \beta$, така че $a_{i_1} = a_{i_2} = \ldots = a_{i_s} = 0$ и
$b_{i_1} = b_{i_2} = \ldots = b_{i_s} = 1$.

Идеята е да променим тези нули на единици на s стъпки. Нека $\alpha_1 = \alpha$, α_2 се получава от α с инвертиране на a_{i_1}, α_3 се получава от α с инвертиране на a_{i_1} и a_{i_2} и така нататък, α_s се получава от α с инвертиране на $a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_{s-1}}$ и накрая $\alpha_{s+1} = \beta$. Ясно е, че при $k = s+1$ получаваме исканата редица: $\alpha = \alpha_1 \prec \bullet\, \alpha_2 \prec \bullet \ldots \prec \bullet\, \alpha_k = \beta$.

От лемата става ясно, че релацията $\preccurlyeq$ представлява рефлексивното и транзитивно затваряне на релацията $\prec \bullet$.

Дефиниция 6 *Булевата функция $f \in \mathcal{F}_2$ наричаме* монотонна*, ако за всеки $\alpha, \beta \in \{0,1\}^n$ имаме: $\alpha \preccurlyeq \beta \Longrightarrow f(\alpha) \leq f(\beta)$. Означаваме:*
$M^n = \{f \in \mathcal{F}_2^n \mid f$ *е монотонна*$\}$, $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} M^n$.

Примери: $x,\ xy,\ x \vee y,\ \widetilde{0},\ \widetilde{1} \in M$; $\overline{x},\ x \oplus y \notin M$. Наистина, $0 \preccurlyeq 1$, но $\overline{0} = 1 > 0 = \overline{1}$ и $01 \preccurlyeq 11$, но $0 \oplus 1 = 1 > 0 = 1 \oplus 1$.

За разлика от останалите множества от булеви функции, които разглеждаме, тук формула за $|M^n|$ не е известна. Въпросът за намиране на такава формула е поставен от Дедекинд в края на 19-ти век и все още не е решен, известни са само асимптотични оценки.

Твърдение 7 *Нека $f \in \mathcal{F}_2^n$ е такава, че $f \notin M$. Тогава съществуват $\alpha, \beta \in \{0,1\}^n$, такива че $\alpha \prec \bullet\, \beta$ и $f(\alpha) > f(\beta)$ (т.е. $f(\alpha) = 1$ и $f(\beta) = 0$).*

Доказателство. Тъй като $f \notin M$, съществуват $\alpha', \beta' \in \{0,1\}^n$, такива че $\alpha' \preccurlyeq \beta'$ и $f(\alpha') > f(\beta')$. В частност, $\alpha' \neq \beta'$ и от горната лема съществува редица $\alpha_1 \prec \bullet\, \alpha_2 \prec \bullet \ldots \prec \bullet\, \alpha_k$, такава че $\alpha_1 = \alpha'$ и $\alpha_k = \beta'$. Да допуснем, че за всяко $i < k$ имаме $f(\alpha_i) \leq f(\alpha_{i+1})$. Тогава е ясно, че получаваме: $f(\alpha_1) \leq f(\alpha_2) \leq \ldots \leq f(\alpha_k)$, което влече $f(\alpha') = f(\alpha_1) \leq f(\alpha_k) = f(\beta')$. Достигнахме до противоречие с избора на α' и β'. Така съществува $i < k$, такова че $f(\alpha_i) > f(\alpha_{i+1})$ и също $\alpha_i \prec \bullet\, \alpha_{i+1}$, което означава че $\alpha = \alpha_i$ и $\beta = \alpha_{i+1}$ изпълняват нужните условия.

Твърдение 8 *Множеството M е затворено.*

Доказателство. Проверяваме двете условия от критерия за затвореност:

1. Нека $\alpha, \beta \in \{0,1\}^n$, $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n$, $\beta = b_1 b_2 \dots b_n$. Ако е изпълнено $\alpha \preccurlyeq \beta$, то $a_i \leq b_i$ за всяко i. Тогава $I_k^n(\alpha) = a_k \leq b_k = I_k^n(\beta)$ и с това установихме, че $I_k^n \in M$.

2. Нека $f, g_1, \dots, g_k \in M$ и $h = f(g_1, \dots, g_k)$. Да вземем $\alpha, \beta \in \{0,1\}^n$, такива че $\alpha \preccurlyeq \beta$. Тъй като $g_1, \dots, g_k \in M$ имаме

$$g_1(\alpha) \leq g_1(\beta),\ \dots,\ g_k(\alpha) \leq g_k(\beta),$$

така че можем да запишем $(g_1(\alpha), \dots, g_k(\alpha)) \preccurlyeq (g_1(\beta), \dots, g_k(\beta))$. Сега използваме, че $f \in M$, което дава $f(g_1(\alpha), \dots, g_k(\alpha)) \leq f(g_1(\beta), \dots, g_k(\beta))$ или което е същото $h(\alpha) \leq h(\beta)$. Получихме, че $h \in M$.

Линейни булеви функции

Дефиниция 9 *Булевата функция $f \in \mathcal{F}_2$ наричаме* линейна, *ако нейният полином на Жегалкин има вида $a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n$. Означаваме:* $L^n = \{f \in \mathcal{F}_2^n \mid f \text{ е линейна}\}$, $L = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$.

Примери: $x, \overline{x} = x \oplus \widetilde{1} \in L$, $x \oplus y \in L$, $xy \notin L$, $x \vee y = xy \oplus x \oplus y \notin L$.

Ясно е, че $|L^n| = 2^{n+1}$, тъй като в общия вид на линеен полином има $n+1$ свободни коефициенти.

Твърдение 10 *Множеството L е затворено.*

Доказателство. Проверяваме двете условия от критерия за затвореност:

1. Полиномът на Жегалкин на $I_k^n(x_1, \dots, x_n)$ е x_k, така че $I_k^n \in L$.

2. Нека $f, g_1, \dots, g_k \in L$ и $h = f(g_1, \dots, g_k)$. Да въведем означения за коефициентите: $f(y_1, \dots, y_k) = b_0 \oplus b_1 y_1 \oplus \dots \oplus b_k y_k$ и $g_i(x_1, \dots, x_n) = a_{i0} \oplus a_{i1} x_1 \oplus \dots \oplus a_{in} x_n$ за $i = 1, \dots, n$. Тогава

$$\begin{aligned} h(x_1, \dots, x_n) &= f(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, \dots, x_n)) \\ &= b_0 \oplus b_1 g_1(x_1, \dots, x_n) \oplus \dots \oplus b_k g_k(x_1, \dots, x_n) \\ &= b_0 \oplus b_1(a_{10} \oplus a_{11} x_1 \oplus \dots \oplus a_{1n} x_n) \oplus \dots \\ &\qquad \oplus b_k(a_{k0} \oplus a_{k1} x_1 \oplus \dots \oplus a_{kn} x_n) \\ &= c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus \dots \oplus c_n x_n, \end{aligned}$$

където $c_0 = b_0 \oplus b_1 a_{10} \oplus \dots \oplus b_k a_{k0}$ и при $i \geq 1$, $c_i = b_1 a_{1i} \oplus \dots \oplus b_k a_{ki}$. Окончателно, $h \in L$.

Критерий за пълнота на множество от булеви функции

Теорема 11 (Пост-Яблонски) *Множеството $F \subseteq \mathcal{F}_2$ е пълно тогава и само тогава, когато $F \not\subseteq T_0$, $F \not\subseteq T_1$, $F \not\subseteq S$, $F \not\subseteq M$, $F \not\subseteq L$.*

Доказателство. Лесната посока е ($\Longrightarrow$). Нека F е пълно и да допуснем, че $F \subseteq K$ за някое $K \in \{T_0, T_1, S, M, L\}$. От свойствата на затварянето, $\mathcal{F}_2 = [F] \subseteq [K] = K$, тъй като K е затворено. Получихме, че K съдържа всички булеви функции - противоречие. Идеята тук е, че щом $F \subseteq K$ и K е затворено, то не е възможно с формули над F да се излезе от множеството K, т.е. чрез формули над F не е възможно да получим функциите извън K, от което следва, че F не може да е пълно.

За другата посока ($\Longleftarrow$), нека $F \nsubseteq K$ за $K \in \{T_0, T_1, S, M, L\}$. Да изберем $f_0 \in F \setminus T_0$, $f_1 \in F \setminus T_1$, $f_S \in F \setminus S$, $f_M \in F \setminus M$ и $f_L \in F \setminus L$. Нека $F' = \{f_0, f_1, f_S, f_M, f_L\}$. Достатъчно е да покажем, че F' е пълно, тъй като $F' \subseteq F$. Доказателството разбиваме на три етапа.

Етап 1. (осигуряване на константите)

Нека $g_0(x) = f_0(x, x, \ldots, x)$ и $g_1(x) = f_1(x, x, \ldots, x)$.

Преди всичко, $g_0, g_1 \in [F']$. Тъй като $f_0 \notin T_0$, $g_0(0) = f_0(0, 0, \ldots, 0) = 1$ и аналогично $f_1 \notin T_1$, така че $g_1(1) = f_1(1, 1, \ldots, 1) = 0$. Имаме четири случая за другите две стойности $g_0(1)$ и $g_1(0)$.

Случай 1. $g_0(1) = 0$ и $g_1(0) = 0$. Тогава $g_0(x) = \overline{x}$ и $g_1 = \widetilde{0}$. Константата $\widetilde{1}$ получаваме като $g_0(g_1(x))$.

Случай 2. $g_0(1) = 1$ и $g_1(0) = 0$. Тогава $g_0 = \widetilde{1}$ и $g_1 = \widetilde{0}$.

Случай 3. $g_0(1) = 1$ и $g_1(0) = 1$. Тогава $g_0 = \widetilde{1}$ и $g_1(x) = \overline{x}$. Константата $\widetilde{0}$ получаваме като $g_1(g_0(x))$.

Забележете, че и в трите случая имаме $\widetilde{0}, \widetilde{1} \in [F']$.

Случай 4. $g_0(1) = 0$ и $g_1(0) = 1$. Тогава $g_0(x) = g_1(x) = \overline{x}$ и дотук имаме само $\overline{x} \in [F']$. Да вземем функцията $f_S \notin S$. Можем да изберем $\alpha \in \{0,1\}^n$, такова че $f_S(\alpha) = f_S(\overline{\alpha})$. Нека $\alpha = a_1 a_2 \ldots a_n$. Да разгледаме функцията $g_S(x) = f_S(x^{a_1}, x^{a_2}, \ldots, x^{a_n})$. Преди всичко, $g_S \in [F']$, тъй като $x^{a_i} \in \{x, \overline{x}\} \subseteq [F']$. За двете стойности на g_S имаме:

$$g_S(0) = f_S(0^{a_1}, 0^{a_2}, \ldots, 0^{a_n}) = f_S(\overline{a_1}, \overline{a_2}, \ldots, \overline{a_n}) = f_S(\overline{\alpha}),$$
$$g_S(1) = f_S(1^{a_1}, 1^{a_2}, \ldots, 1^{a_n}) = f_S(a_1, a_2, \ldots, a_n) = f_S(\alpha).$$

Така $g_S(0) = g_S(1)$ и g_S е константа и тъй като $g_0(x) = \overline{x} \in [F']$, получаваме другата константа като $g_0(g_S(x))$.

Преборихме се за двете константи $\widetilde{0}$, $\widetilde{1}$ и в четирите случая. В един от случаите липсва отрицанието, което води до следващия етап.

Етап 2. (осигуряване на отрицание)

За функцията $f_M \notin M$ от доказана лема по-горе можем да изберем $\alpha, \beta \in \{0,1\}^n$, такива че $\alpha \prec \bullet \beta$ и $f_M(\alpha) = 1$, $f_M(\beta) = 0$. За подходящо i можем да запишем $\alpha = a_1 \ldots a_{i-1} 0 a_{i+1} \ldots a_n$ и $\beta = a_1 \ldots a_{i-1} 1 a_{i+1} \ldots a_n$. Да разгледаме функцията $g_M(x) = f_M(a_1, \ldots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \ldots, a_n)$. Ясно е, че $g_M \in [F']$, тъй като g_M е суперпозиция на f_M и на константите, които са осигурени от първия етап. За стойностите на g_M имаме: $g_M(0) = f_M(\alpha) = 1$ и $g_M(1) = f_M(\beta) = 0$. Така $g_M(x) = \overline{x}$ и вече разполагаме с отрицание.

Етап 3. (осигуряване на конюнкция)

Да разгледаме полинома на Жегалкин на $f_L \notin L$. Нека $xyz_1 \dots z_k$ е един *най-къс* нелинеен член на този полином (примерът $f_L = xyz \oplus xy$ показва защо това е важно). Заместваме променливите $z_1, \dots, z_k$ с $\widetilde{1}$ и всички останали променливи (без x, y) с $\widetilde{0}$. Тъй като всеки друг нелинеен член на полинома на f_L съдържа поне една променлива, различна от $x, y, z_1, \dots, z_k$, при заместването този член се анулира и така получаваме $g_L(x, y) = xy \oplus ax \oplus by \oplus c$. Тъй като сме заместили променливи с константи, от първия етап $g_L \in [F']$. Да направим следната смяна на променливите: $x = u \oplus b$ и $y = v \oplus a$. Получаваме функцията

$$\begin{aligned} h_L(u, v) &= g_L(u \oplus b, v \oplus a) = (u \oplus b)(v \oplus a) \oplus a(u \oplus b) \oplus b(v \oplus a) \oplus c \\ &= uv \oplus ua \oplus bv \oplus ba \oplus au \oplus ab \oplus bv \oplus ba \oplus c = uv \oplus d, \end{aligned}$$

където $d = c \oplus ab$. Ясно е, че имаме $h_L \in [F']$, тъй като h_L е получена от g_L със суперпозиция на $u \oplus b, v \oplus a \in [\overline{x}]$, като отрицанието е осигурено на втория етап. Ако $d = 0$, то $uv = h_L(u, v)$. Ако $d = 1$, то $uv = g_M(h_L(u, v))$. С това е осигурена и конюнкцията.

След трите етапа $\{\overline{x}, xy\} \subseteq [F']$, така че F' е пълно и окончателно F също е пълно.

Дефиниция 12 *Булевата функция $f \in \mathcal{F}_2$ се нарича* Шеферова*, ако $\{f\}$ е пълно множество.*

Примери: чертата на Шефер $x|y = \overline{xy}$ и стрелката на Пирс $x \downarrow y = \overline{x \vee y}$ са Шеферовите функции на две променливи.

От теоремата на Пост-Яблонски, f е Шеферова тогава и само тогава, когато $f \notin T_0, f \notin T_1, f \notin S, f \notin M, f \notin L$. Следващата теорема показва, че е достатъчно да проверим само първите три от тези непринадлежности.

Теорема 13 (критерий за Шеферовост) *За булева функция $f \in \mathcal{F}_2$: f е Шеферова тогава и само тогава, когато $f \notin T_0 \cup T_1 \cup S$.*

Доказателство. Ако f е Шеферова, то $f \notin T_0 \cup T_1 \cup S$ следва от теоремата на Пост-Яблонски.

Нека $f \notin T_0 \cup T_1 \cup S$. Тогава $f(0, 0, \dots, 0) = 1$ и $f(1, 1, \dots, 1) = 0$. Но $(0, 0, \dots, 0) \preccurlyeq (1, 1, \dots, 1)$, така получаваме $f \notin M$. Допускаме, че $f \in L$. Нека $f(x_1, \dots, x_n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n$. От $f(0, 0, \dots, 0) = 1$, $a_0 = 1$. От $f(1, 1, \dots, 1) = 0$, $a_0 \oplus a_1 \oplus \dots \oplus a_n = 0$, което влече $a_1 \oplus \dots \oplus a_n = 1$. Но тогава:

$$\begin{aligned} f^\star(x_1, \dots, x_n) &= a_0 \oplus a_1(x_1 \oplus 1) \oplus \dots \oplus a_n(x_n \oplus 1) \oplus 1 \\ &= f(x_1, \dots, x_n) \oplus a_1 \oplus \dots \oplus a_n \oplus 1 = f(x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Получихме $f \in S$, което е противоречие. Така $f \notin T_0 \cup T_1 \cup S \cup M \cup L$ и от теоремата на Пост-Яблонски, функцията f е Шеферова.

Едно множество $F \subseteq \mathcal{F}_2$ се нарича *базис*, ако F е пълно и никое собствено подмножество на F не е пълно. Например, всяка Шеферова функция образува базис с един елемент. Примери за базиси с два елемента: $\{\overline{x},\ xy\}$ и $\{\overline{x},\ x \vee y\}$ От теоремата на Пост-Яблонски е ясно, че всеки базис се състои от най-много 5 функции (всъщност може да се види, че са най-много 4).

Примерна задача. Дадено е множеството от булеви функции

$$F = \{xy,\ \overline{x},\ \widetilde{0},\ \widetilde{1},\ x \oplus y \oplus z,\ xy \oplus xz \oplus yz\}.$$

Да се намерят всички базиси, които се съдържат във F.

Решение. Образуваме таблица, в която показваме принадлежността на всяка от функциите във F към 5-те основни множества T_0, T_1, S, M, L. Ще казваме, че една функция f *покрива* множеството K, ако $f \notin K$. Покриването ще отбелязваме със $\star$.

	T_0	T_1	S	M	L
xy			$\star$		$\star$
$\overline{x}$	$\star$	$\star$		$\star$	
$\widetilde{0}$		$\star$	$\star$		
$\widetilde{1}$	$\star$		$\star$		
$x \oplus y \oplus z$				$\star$	
$xy \oplus xz \oplus yz$					$\star$

Само най-долните два реда се нуждаят от коментар.

За функцията $x \oplus y \oplus z$: очевидно запазва 0 и 1, също е самодвойнствена: $(x \oplus y \oplus z)^\star = (x \oplus 1) \oplus (y \oplus 1) \oplus (z \oplus 1) \oplus 1 = x \oplus y \oplus z$, немонотонна: $100 \preccurlyeq 110$ и $1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$, линейна.

За функцията $m = xy \oplus xz \oplus yz$: запазва 0 и 1, проверихме по-горе, че е самодвойнствена, монотонна: съобразете, че $xy \oplus xz \oplus yz = xy \vee xz \vee yz$, така че m е суперпозиция на конюнкции и дизюнкции, нелинейна.

За да покрием T_0 задължително трябва да вземем $\overline{x}$ или $\widetilde{1}$.

Случай 1. Взимаме $\overline{x}$. Покрити са T_0, T_1, M. За да покрием S имаме три варианта.

Случай 1.1. Взимаме xy. Покрити са S и L. Получаваме базисът $\{\overline{x},\ xy\}$.

Случай 1.2. Взимаме $\widetilde{0}$. Покрит е S и остава да покрием L. Можем да вземем xy, но тогава няма да получим базис, тъй като xy покрива и S, така че $\widetilde{0}$ става излишна. Затова имаме единствен вариант да вземем m. Получаваме базисът $\{\overline{x},\ \widetilde{0},\ m\}$.

Случай 1.3. Взимаме $\widetilde{1}$. Разсъждението е както в предния случай 1.2. Получаваме базисът $\{\overline{x},\ \widetilde{1},\ m\}$.

Дотук намерихме всички базиси, които съдържат $\overline{x}$. По-нататък няма да взимаме отрицанието.

Случай 2. Взимаме $\widetilde{1}$. Покрити са T_0 и S. Единственият начин да покрием T_1 е да вземем $\widetilde{0}$. Единственият начин да покрием M е да вземем $x \oplus y \oplus z$. Остава да покрием L.

Случай 2.1. Взимаме xy. Получаваме базисът $\{\widetilde{1},\ \widetilde{0},\ x \oplus y \oplus z,\ xy\}$. Забележете, че xy покрива и S, но няма как да премахнем константата $\widetilde{0}$ или $\widetilde{1}$, тъй като няма друга функция, покриващата T_1 или T_0.

Случай 2.2. Взимаме m. Получаваме базисът $\{\widetilde{1},\ \widetilde{0},\ x \oplus y \oplus z,\ m\}$.

Така видяхме, че в множеството F се съдържат пет базиса.