Ще разгледаме два примера за обикновена индукция.

Пример 1. Нека $P(n)$ да бъде $n < 2^n$.
База: $P(0)$ съвпада с $0 < 2^0 = 1$, което е изпълнено.
Стъпка: нека $P(n)$ е изпълнено, т.е. $n < 2^n$. Тогава:

$$n + 1 \ < \ 2^n + 1 \ \leq \ 2^n + 2^n \ = \ 2^{n+1}.$$

Индуктивната хипотеза използвахме в първото неравенство. Получихме $P(n+1)$, т.е. $n + 1 < 2^{n+1}$. С това доказателството е завършено, т.е. получихме $n < 2^n$ за всяко естествено n.

Пример 2. (закон на Де Морган за крайни фамилии)
За произволни множества $A_1, A_2, \ldots, A_n$ е в сила: $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.
В случая $P(n)$ е свойството $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

База на индукцията: при $n = 1$, $P(1)$ има вида $\overline{A_1} = \overline{A_1}$, което очевидно е вярно. Обединение или сечение на фамилия с един елемент A е просто самото множество A.

Стъпка на индукцията: да предположим, че $P(n)$ е вярно за някое $n \geq 1$. Тогава:

$$\begin{aligned}
\overline{\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i} \ &= \ \overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i \ \cup \ A_{n+1}} \\
&= \ \overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} \ \cap \ \overline{A_{n+1}} \\
&= \ \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i} \ \cap \ \overline{A_{n+1}} \ = \ \bigcap_{i=1}^{n+1} \overline{A_i}.
\end{aligned}$$

Първото равенство е ясно от дефиницията за обединение на фамилия. Във второто равенство се използва законът на Де Морган за две множества. В третото равенство е приложена индуктивната хипотеза. Четвъртото равенство следва от дефиницията за сечение на фамилия.

Успяхме да докажем $P(n+1)$ след допускане, че $P(n)$ е вярно.

Окончателно, $P(n)$ е вярно за всяко n.

В някои случаи е удобно да се използва така наречената *пълна математическа индукция*. Ако $P(0)$ е вярно и също така за всяко $n \in \mathbb{N}$ е вярно, че $P(0)$ & $P(1)$ & $\ldots$ & $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$, то можем да заключим че $P(n)$ е вярно за всяко n.

Може би изглежда, че пълната математическа индукция е по-силна от обикновената, тъй като при нея се използва по-силна индуктивна хипотеза.

Оказва се, обаче, че двете индукции са еквивалентни за твърдения относно множеството на естествените числа.

И накрая да отбележим, че с индукция могат да се правят и дефиниции на редици. По-точно, дефинира се първият член на редицата a_0 и след това се показва как се дефинира a_{n+1} с използването на a_i за $i \leq n$.

Пример 5. Степенуването a^n за естествено n може да се въведе така: $a^0 = 1, \;\; a^{n+1} = a^n.a$.

Пример 6. Редицата $F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ се състои от *числата на Фибоначи*.

Релации

За всеки два обекта a и b имаме *наредената двойка* (a, b). Тя се отличава от чифта $\{a, b\}$ по следното основно свойство:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \;\&\; b = d.$$

По този начин, при $a \neq b$ имаме $(a, b) \neq (b, a)$ за разлика от $\{a, b\} = \{b, a\}$.

Дефиниция 1 *Нека A и B са множества.* Декартово произведение *на A и B е множеството:*

$$A \times B \;=\; \{(a, b) \mid a \in A \;\&\; b \in B\} \;=\; \{x \mid \exists a \in A \exists b \in B \; x = (a, b)\}.$$


По този начин, $A \times B$ се състои от *всички* наредени двойки (a, b), за които $a \in A$ и $b \in B$.

Пример 1: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ е Евклидовата равнина след отъждествяване на точките с техните координати.

Пример 2: при $A \;=\; \{1, 2\}$ и $B \;=\; \{1, 2, 3\}$ имаме

$$A \times B \;=\; \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}.$$

Най-просто е да си мислим за $A \times B$ като следната правоъгълна мрежа:



Множеството $A \times A = A^2$ наричаме *Декартов квадрат* на A.

Ако A е затвореният интервал $[0, 1]$, то A^2 е геометричен квадрат, разположен в първи квадрант.

Аналогично, за всяко $n > 2$ и обекти $a_1, a_2, \ldots, a_n$ разглеждаме *наредената n-орка* $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, за която е в сила основното свойство:

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n) = (b_1, b_2, \ldots, b_n) \iff a_1 = b_1 \ \& \ a_2 = b_2 \ \& \ \ldots \ \& \ a_n = b_n$$
$$\iff \forall i \leq n \ a_i = b_i.$$

За дадени n множества $A_1, A_2, \ldots, A_n$ дефинираме тяхното Декартово произведение:

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n \ = \ \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \ \& \ a_2 \in A_2 \ \& \ \ldots \ \& \ a_n \in A_n\}.$$

Забележете, че няма принципна разлика между $A \times B \times C$, което се състои от елементи (a, b, c), $(A \times B) \times C$, което се състои от елементи $((a, b), c)$ и $A \times (B \times C)$, което се състои от елементи $(a, (b, c))$. В някакъв смисъл и трите множества представят идеята, че a е пръв елемент, b е втори елемент и c е трети елемент. По-точно, трите множества са различни, защото скобите се разполагат различно, но между тях съществува естествено съответствие.

Множеството $\underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{n \text{ пъти}}$ означаваме с A^n и наричаме *n-та Декартова степен* на A.

Дефиниция 2 *Всяко подмножество $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ наричаме n-местна релация над множествата $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Ако $R \subseteq A^n$, то R наричаме n-местна релация в A. При $n = 2$ говорим за* бинарна *релация.*

Често записваме aRb вместо $(a, b) \in R$ и $a\not{R}b$ вместо $(a, b) \notin R$.

Дефиниция 3 *Нека R е бинарна релация над A и B, $R \subseteq A \times B$.*
Домейн (дефиниционна област) *на R е множеството*

$$Dom(R) \ = \ \{a \in A \mid \exists b \in B \ (a, b) \in R\}.$$

Рейндж (област от стойности) *на R е множеството*

$$Ran(R) \ = \ \{b \in B \mid \exists a \in A \ (a, b) \in R\}.$$

Забележете, че $Dom(R) \subseteq A$, но от никъде не следва $Dom(R) = A$. Аналогично, $Ran(R) \subseteq B$ и може $Ran(R)$ да е собствено подмножество на B.

Пример 1: $R \ = \ \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.
Геометрично R представлява затворен кръг с радиус 1 и център в $(0, 0)$.
За него имаме: $Dom(R) = [-1, 1] = Ran(R)$. За множеството $Dom(R)$ можем да си мислим като проекцията на R върху абсцисната ос. По същия начин, $Ran(R)$ е проекцията на R върху ординатната ос.

Забележете, че $R \subset Dom(R) \times Ran(R)$, т.е. R е собствено подмножество на $Dom(R) \times Ran(R) = [-1, 1] \times [-1, 1]$, което е целият квадрат с център $(0, 0)$ и страна 2.

Пример 2: $R = A \times B$, т.е. възможно най-голямата релация над A и B. За нея имаме: $Dom(R) = A$ при $B \neq \emptyset$ и $Ran(R) = B$ при $A \neq \emptyset$.

Разбира се, ако $A = \emptyset$ или $B = \emptyset$, то $A \times B = \emptyset$, така че в такъв случай $R = \emptyset$ и $Dom(R) = Ran(R) = \emptyset$.

Видове релации

Дефиниция 4 *Нека A е множество и R е бинарна релация в A, $R \subseteq A^2$. Казваме, че:*

1. *R е* рефлексивна *в A, ако* $\forall a \in A\ (a, a) \in R$.
2. *R е* антирефлексивна *в A, ако* $\forall a \in A\ (a, a) \notin R$.
3. *R е* транзитивна*, ако* $\forall a \in A \forall b \in A \forall c \in A(aRb\ \&\ bRc \Longrightarrow aRc)$.
4. *R е* симетрична*, ако* $\forall a \in A \forall b \in A(aRb \Longrightarrow bRa)$.
5. *R е* антисиметрична*, ако* $\forall a \in A \forall b \in A(aRb\ \&\ bRa \Longrightarrow a = b)$.

Да означим $Id_A = \{(a, a) \mid a \in A\}$, което ще наричаме *идентитет в A*.

R е рефлексивна в A тогава и само тогава, когато $Id_A \subseteq R$.


R е антирефлексивна в A тогава и само тогава, когато $Id_A \cap R = \emptyset$.


Като графична илюстрация на видовете релации представяме елементите на A с кръгчета, а елементът (a, b) на релацията R със стрелка от кръгчето за a към кръгчето за b.

R е рефлексивна в A, ако във всяко кръгче a има примка: 

R е антирефлексивна в A, ако в никое кръгче a няма примка: 

R е транзитивна, ако за всеки три кръгчета a, b, c, ако има стрелка от a към b и от b към c, то задължително има стрелка от a към c: 

R е симетрична, ако винаги когато има стрелка от a към b, то има стрелка и от b към a (но може и да няма стрелки между a и b): 

R е антисиметрична, ако не е възможно между две различни кръгчета a и b да има стрелки от a към b и също от b към a: 

Пример 1: $\leq = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a \leq b\}$. Рефлексивна, не е антирефлексивна ($0 \leq 0$), транзитивна, не е симетрична ($0 \leq 1$, но $1 \not\leq 0$), антисиметрична. $Dom(\leq) = Ran(\leq) = \mathbb{N}$.

Пример 2: $<= \{(a,b) \in \mathbb{N}^2 \mid a < b\}$. Не е рефлексивна ($0 \not< 0$), антирефлексивна, транзитивна, не е симетрична ($0 < 1$, но $1 \not< 0$), антисиметрична (предпоставката $a < b$ & $b < a$ е винаги невярна, така че от нея следва всичко). $Dom(<) = \mathbb{N}$, $Ran(<) = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Пример 3: $R = Id_A = \{(a,a) \mid a \in A\} = \{(a,b) \in A^2 \mid a = b\}$. Рефлексивна, антирефлексивна само при $A = \emptyset$, транзитивна, симетрична, антисиметрична ($a = b$ & $b = a$ влече $a = b$). $Dom(R) = Ran(R) = A$.

Пример 4: $R = \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 \mid ab \geq 0\}$. За домашно.