

Линейные операторы

Определение: Отображение \hat{A} пространства V_n называется линейным оператором в этом пространстве, если:

- 1) Отображение \hat{A} переводит пространство V_n в себя: $\forall \vec{x} \in V_n : \hat{A}\vec{x} \in V_n$ (вектор в вектор)
- 2) Линейность:
 - а. $\forall \vec{x}, \vec{y} \in V_n : \hat{A}(\vec{x} + \vec{y}) = \hat{A}\vec{x} + \hat{A}\vec{y}$ (образ суммы равен сумме образов)
 - б. $\forall \vec{x} \in V_n$ и $\forall \alpha \in R : \hat{A}(\alpha \vec{x}) = \alpha \cdot \hat{A}\vec{x}$ (постоянный множитель можно вынести за знак линейного оператора)

Свойства линейного оператора:

- 1) Всякий линейный оператор переводит ноль-вектор в ноль-вектор.
- 2) Под действием линейного оператора любая линейная комбинация системы векторов отображается в линейную комбинацию образов этих векторов.
- 3) Линейный оператор переводит линейно зависимую систему векторов в линейно зависимую систему. То есть всякий линейный оператор сохраняет линейную зависимость. Но линейно независимая система не обязательно отображается в линейно независимую систему.

Способы задания линейного оператора:

- 1) Словесное описание действия линейного оператора
- 2) При помощи матрицы линейного оператора в фиксированном базисе

Матрица линейного оператора в базисе состоит из координат образов базисных векторов в этом же базисе, записанных по столбцам.

✓ Как написать матрицу A линейного оператора \hat{A} ?

- 1) Фиксируем базис
- 2) Находим образы базисных векторов под действием линейного оператора (в векторном виде)
- 3) Находим координаты образов базисных векторов в этом же базисе
- 4) Записываем координаты образов в матрицу по столбцам

✓ Для чего нужна матрица линейного оператора? Ответ: Для нахождения образа произвольного вектора в

координатном виде. Если $\vec{x} = x_1 \cdot \vec{e}_1 + x_2 \cdot \vec{e}_2 + x_3 \cdot \vec{e}_3$, то $\hat{A}\vec{x} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, где y_1, y_2, y_3 – координаты образа вектора \vec{x}

в базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$.

✓ Как связаны матрицы линейного оператора в разных базисах? Формула связи: $A_{\vec{b}_2} = P^{-1} \cdot A_{\vec{b}_1} \cdot P$, где $P = P_{\vec{b}_1 \rightarrow \vec{b}_2}$

✓ Что такое матрица перехода от базиса к базису?

$$P_{\vec{b}_1 \rightarrow \vec{b}_2} = \begin{pmatrix} \text{координаты векторов} \\ \text{второго базиса в} \\ \text{первом базисе (по столбцам)} \end{pmatrix}$$

Собственные значения (СЗ) и собственные векторы (СВ) линейного оператора.

Определение: Ненулевой вектор $\vec{a} (\vec{a} \neq \vec{0})$ называется собственным вектором линейного оператора \hat{A} , отвечающим собственному значению λ , если $\hat{A}\vec{a} = \lambda \vec{a}$

Замечания:

- 1) Собственный вектор не может быть нулевым, собственное значение может быть равно нулю
- 2) Собственный вектор пропорционален своему образу. Коэффициент пропорциональности и есть собственное значение.

✓ Как найти СЗ и СВ? Ответ:

СЗ находятся с помощью характеристического уравнения: $|A - \lambda E| = 0$.

СВ для СЗ λ_k – это решение однородной системы линейных уравнений с матрицей $(A - \lambda E)$.

Оператор простого типа

Определение: Оператор \hat{A} называется оператором простого типа, если его собственные векторы образуют базис в пространстве V_n . Т.е. собственных векторов ровно n -штук и они линейно независимы.

Ядро и образ линейного оператора

Определение: Ядро линейного оператора – это множество всех векторов, переходящих в ноль-вектор.

$\ker \hat{A} = \{ \vec{x} \in V_n : \hat{A}\vec{x} = \vec{0} \}$ Ядро оператора образует линейное пространство.

Определение: Образ линейного оператора – это множество всех векторов, для которых есть прообразы:

$\text{Im } \hat{A} = \{ \vec{y} \in V_n : \exists \vec{x} \in V_n : \hat{A}\vec{x} = \vec{y} \}$. Образ линейного оператора образует линейное пространство.

- Чтобы найти ядро линейного оператора, надо решить ОСЛУ с матрицей $A \Rightarrow \dim \ker A = n - rA$, где n – размерность всего пространства.
- Чтобы найти образ линейного оператора, надо матрицу линейного оператора умножить на произвольный вектор.

$$\dim V_n = \dim(\ker A) + \dim(\text{Im } A)$$

Обратимость линейного оператора

Определение: Оператор \hat{A}^{-1} называется обратным для \hat{A} , если $\forall x \in V_n : (\hat{A} \cdot \hat{A}^{-1})(\vec{x}) = (\hat{A}^{-1} \cdot \hat{A})(\vec{x}) = \vec{x}$

Критерий обратимости линейного оператора в терминах его матрицы:

Оператор \hat{A} обратим \Leftrightarrow обратима его матрица $A \Leftrightarrow |A| \neq 0$

Матрицей обратного линейного оператора \hat{A}^{-1} будет A^{-1} .

✓ Схема нахождения обратной матрицей:

1) $|A| \neq 0 \Rightarrow A$ – невырожденная, обратима

$$2) A \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \Leftrightarrow M_{ij} \Leftrightarrow A^* = \begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

$$3) A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A^*$$

Связь обратимости линейного оператора \hat{A} с ядром и образом линейного оператора:

1) Критерий обратимости в терминах его ядра:

линейный оператор \hat{A} - обратим $\Leftrightarrow \ker \hat{A} = \{ \vec{0} \}$ (ядро нулевое), $rA = \dim V_n$

2) Критерий обратимости в терминах его образа:

линейный оператор \hat{A} - обратим $\Leftrightarrow \text{Im } \hat{A} = V_n$ (образ совпадает со всем пространством)

Размерность ядра: $\dim \ker \hat{A} = \dim V_n - rA$

Размерность образа: $\dim \text{Im } \hat{A} = rA$

Диагонализуемость матрицы

Матрица линейного оператора \hat{A} диагонализуема \Leftrightarrow оператор \hat{A} - простого типа, т.е. имеет базис из собственных векторов. В собственном базисе матрица линейного оператора будет диагональной, по главной диагонали стоят собственные значения линейного оператора:

$$A_{\text{соб. базис}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Чтобы привести матрицу оператора к диагональному виду, надо найти собственные значения (с помощью хар.ур-я), найти собственные векторы, убедиться, что они образуют базис и вычислить матрицу оператора в собст. базисе с помощью формулы связи матриц в разных базисах.