

Appunti Teoria delle Interazioni Fondamentali

Giacomo Galliani, corso dei prof. A. Vicini, M. Zaro

Anno accademico 2025-2026

capitolo 1	Il propagatore di Feynman	Page 3
1.1	Il propagatore del campo scalare	3
1.2	Il propagatore fermionico	6
1.3	Il propagatore del fotone	8
	Un primo esempio di calcolo — 11	
capitolo 2	La teoria dell'urto	Page 13
2.1	Calcolo del processo $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$	15
2.2	Urto compton	23
capitolo 3	Rinormalizzazione e contributi a più loop	Page 25
	I controtermini — 25	
3.1	Esempio di calcolo: self energia del fotone	29
	Fattori di forma elettromagnetici — 31	
capitolo 4	Interazioni elettrodeboli	Page 33
4.1	La teoria efficace di Fermi	33
4.2	Una teoria di gauge per le interazioni elettrodeboli	35
4.3	Applicazione: il decadimento del muone	38
capitolo 5	Esercizi del primo modulo	Page 40
5.1	Scattering Bhabha	40
	Calcolo dell'ampiezza — 40 • Sezione d'urto — 42 • Analisi della singolarità per $\theta \rightarrow 0$ — 43 •	
	Analisi del contributo di Z_0 — 44	
5.2	Decadimento del muone	46
	Scomposizione in termini di fattori di forma — 46 • Larghezza di decadimento — 47 • Limiti sui	
	fattori di forma — 50	

5.3	Rinormalizzazione nella teoria di Yukawa	51
	Campo fermionico — 51 • Campo scalare — 52 • Costante di accoppiamento — 56	
5.4	Rinormalizzazione teoria di Yukawa - seconda versione	59
	Campo spinoriale — 60 • Campo scalare — 62 • Costante di accoppiamento — 64 • Controtermini in diversi schemi di rinormalizzazione — 66	
5.5	Nuova fisica nel decadimento del muone	68
	Regole di Feynman della teoria — 68 • Contributo al fattore di forma — 69 • Calcolo esplicito degli integrali di loop — 72	

1

Il propagatore di Feynman

1.1 Il propagatore del campo scalare

Lo scopo principale del corso è capire come si possono fare *praticamente* calcoli di ampiezze di transizione. Poiché trattiamo di particelle elementari, ad energie molto alte, il linguaggio adatto è la teoria quantistica dei campi. A differenza però di un corso in qft, qui considereremo solamente dei campi con dirette applicazioni fisiche.

Come detto, vogliamo studiare ampiezze di transizione, cioè processi di scattering. Quasi sempre, penseremo allo scattering fra due (o più) particelle nel modo seguente: all'inizio $t = -\infty$ abbiamo due particelle infinitamente distanti, che non sentono l'effetto di una sull'altra. Successivamente, le particelle entrano nel range dell'interazione: questo è un punto delicato, dove tipicamente non siamo in grado di risolvere le equazioni esattamente. Dovremo quindi ricorrere a tecniche perturbative. D'altra parte, alla fine abbiamo ancora la *teoria libera*, cioè due particelle che all'infinito non si sentono più.

Alla luce di questa discussione qualitativa, è chiaro che il calcolo base che dovremo impostare è la probabilità che una particella venga creata in un punto x , e venga misurata (cioè distrutta) in y .

L'elemento di matrice rilevante in questo caso, se consideriamo un campo scalare ϕ , è dato da

$$\langle 0 | \phi(y) \phi(x) | 0 \rangle \quad (1.1)$$

Poiché si tratta di un campo scalare, possiamo scrivere

$$\phi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (e^{-ipx} a_p + e^{ipx} a_p^\dagger) \quad (1.2)$$

dobbiamo allora calcolarci

$$\langle 0 | \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (e^{-ipy} a_p + e^{ipy} a_p^\dagger) \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{p'}}} (e^{-ip'x} a_{p'} + e^{ip'x} a_{p'}^\dagger) | 0 \rangle \quad (1.3)$$

Nella teoria quantistica, gli $a_p, a_p^\dagger$ non sono semplici coefficienti di Fourier, ma sono gli operatori di distruzione e costruzione che obbediscono alle relazioni di commutazione

$$[a_p, a_{p'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^3(p - p') \quad (1.4)$$

$$[a_p, a_{p'}] = 0 \quad (1.5)$$

$$[a_p^\dagger, a_{p'}^\dagger] = 0 \quad (1.6)$$

Ricordando poi che vale $a_p |0\rangle = 0, \forall p$, l'unico contributo non nullo all'integrale viene dal prodotto

$$a_p a_{p'}^\dagger = a_{p'}^\dagger a_p + (2\pi)^3 \delta^3(p - p') \quad (1.7)$$

A questo punto, a_p annichila il vuoto e l'unico pezzo che conta è il commutatore. L'integrale in p' a questo punto è banale grazie alla delta di Dirac, ed otteniamo


$$\langle 0 | \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-ip(y-x)} | 0 \rangle \quad (1.8)$$

Questo oggetto può essere scritto in maniera manifestamente covariante. Basta scrivere il fattore $(2E_p)^{-1}$ come il risultato di un integrale per residui:

$$\langle 0 | \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{dp_0}{2\pi i} \frac{-e^{-ip(y-x)}}{p^2 - m^2} | 0 \rangle \quad (1.9)$$

Per vedere questo, scrivi $p^2 - m^2 = p_0^2 - \underbrace{(p_2 + m^2)}_{E_p^2}$. Allora, vista come una funzione della variabile

complessa p_0 la funzione ha due poli sull'asse reale, dove $p_0 = \pm E_p$. Ora dobbiamo scegliere il cammino di integrazione. La scelta tipica è nota come *prescrizione di Feymann*, ed è la seguente: prendi l'asse reale, e circonda con semicerchio *inferiore* il primo polo, con un semicerchio *superiore* il secondo polo. Per chiudere il cammino di integrazione, considera il segno di $x_0 - y_0$: se è positivo, allora chiudi il cammino nel semipiano superiore, se è negativo nel semipiano inferiore.



Questa funzione della differenza $x - y$ è detta *propagatore*, la indicheremo con $D(x - y)$, ed è la funzione di green dell'equazione di Klein-Gordon. Ciò vuol dire che soddisfa ¹

$$((\partial^\mu \partial_\mu)_x + m^2)D(y - x) = -i\delta^4(x - y) \quad (1.10)$$

A partire da questo, si definisce il propagatore di Feymann, come

$$D_F(x - y) = \begin{cases} D(y - x), & \text{se } y_0 > x_0 \\ D(x - y), & \text{se } y_0 < x_0 \end{cases} \quad (1.11)$$

Una nota su come definiamo e normalizziamo gli stati. Noi partiamo sempre dallo stato di vuoto, $|0\rangle$, che è definito come lo stato che viene annichilito dall'operatore di distruzione, ovvero realizza

$$a_{\vec{k}} |0\rangle = 0, \forall \vec{k} \quad (1.12)$$

Invece, agendo su questo con gli operatori di creazione, creiamo gli stati delle particelle. Possiamo agire anche più volte ed ottenere stati di più particelle con lo stesso momento:

$$|k\rangle = N_1 a_{\vec{k}}^\dagger |0\rangle \quad (1.13)$$

$$|2k\rangle = N_2 a_{\vec{k}}^\dagger a_{\vec{k}}^\dagger |0\rangle \quad (1.14)$$

questi stati sono tra loro ortogonali. Per vederlo, calcoliamo il prodotto scalare:

$$\langle 2k | k \rangle = N_2^* N_1 \langle 0 | a_{\vec{k}} a_{\vec{k}} a_{\vec{k}}^\dagger | 0 \rangle \quad (1.15)$$

$$= N_2^* N_1 \langle 0 | a_{\vec{k}} (1 - a_{\vec{k}}^\dagger a_{\vec{k}}) | 0 \rangle \quad (1.16)$$

$$= N_2^* N_1 \langle 0 | a_{\vec{k}} | 0 \rangle = 0 \quad (1.17)$$

Per avere stati ortonormali, dobbiamo imporre la corretta normalizzazione. Ingenuamente, uno potrebbe richiedere

$$\langle \vec{k} | \vec{k}' \rangle = (2\pi)^3 \delta(\vec{k} - \vec{k}') \quad (1.18)$$

ma questa in realtà *non* è una scelta corretta, perché non è lorentz-invariante. Per trovare un corretto punto di partenza, considera allora

¹Per verificarlo, passa nello spazio di Fourier. Indicando con $\tilde{D}(p)$ le componenti di Fourier, trovi allora che deve valere $(p^2 - m^2)\tilde{D}(p) = i$. Da questa ottieni un'espressione per $\tilde{D}$, e scrivendo il propagatore come trasformata di Fourier, ritrovi proprio la nostra espressione.

$$\frac{d^3k}{2E_p} = d^4k \delta(k^2 - m^2) \theta(k_0) \quad (1.19)$$

che si verifica facilmente da destra verso sinistra, integrando rispetto al tempo, usando le proprietà della delta di Dirac. In particolare, la misura a sinistra è uno scalare di Lorentz. D'altra parte, anche $d^3k \delta(\vec{k})$ è uno scalare, e posso scrivere

$$d^3k \delta(\vec{k}) = \left(\frac{d^3k}{2E_p} \right) \delta(\vec{k}) 2E_p \quad (1.20)$$

concludiamo che $\delta(k)(2E_p)$ è uno scalare! scriveremo allora

$$|k\rangle = \sqrt{2E} a_{\vec{k}}^\dagger |0\rangle \quad (1.21)$$

1.2 Il propagatore fermionico

Consideriamo la lagrangiana di Dirac

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}(x)(i\gamma_\mu \partial^\mu - m)\psi(x) \quad (1.22)$$

e la conseguente equazione di Dirac, che si ottiene usando le equazioni di eulero-lagrange:

$$(i\cancel{\partial} - m)\psi(x) = 0, \quad \cancel{\partial} := \gamma_\mu \partial^\mu \quad (1.23)$$

La soluzione è scomponibile in onde piane, secondo

$$\psi(x) = u_{\vec{p}} e^{-ipx} + v_{\vec{p}} e^{ipx} \quad (1.24)$$

dove le funzioni u, v (chiamate spesso *spinori*), obbediscono alle equazioni

$$\begin{cases} (\cancel{p} - m)u_{\vec{p}} = 0 \\ (\cancel{p} + m)v_{\vec{p}} = 0 \end{cases} \quad (1.25)$$

la più generale soluzione dell'equazione di Dirac è data da

$$\psi(x) = \int \frac{d^3p}{\sqrt{2E_p}(2\pi)^3} \sum_s \left(b_{\vec{p}}^s u_{\vec{p}}^s e^{-ipx} + d_{\vec{p}}^{\dagger, s} v_{\vec{p}}^s e^{ipx} \right) \quad (1.26)$$

Ora, quando quantizzo la teoria, voglio che gli stati rispettino la statistica fermionica: questo impone le leggi di *anti-commutazione*:²

$$\{b_{\vec{p}}^r, b_{\vec{p}'}^{\dagger, s}\} = (2\pi)^3 \delta_{rs} \delta(\vec{p} - \vec{p}') = \{d_{\vec{p}}^r, d_{\vec{p}'}^{\dagger, s}\} \quad (1.27)$$

Ora che abbiamo chiaro come si descrive un fermione in teoria dei campi, vogliamo calcolare il propagatore fermionico. Questo vuol dire determinare la funzione di green $S_R(x - y)$, t.c.

$$(i\not{D} - m)S_R(x - y) = i\delta(x - y)\mathbb{I}_{4 \times 4} \quad (1.28)$$

una osservazione importante è che posso allora scrivere $(i\not{D} + m)D_R(x - y)$, con D_R il propagatore del campo scalare. Infatti,

$$(i\not{D} - m)(i\not{D} + m)D_R(x - y) = (-\square + m^2)D_R(x - y) = i\delta(x - y) \quad (1.29)$$

nell'ultima uguaglianza abbiamo usato il fatto che il propagatore del campo scalare è la funzione di green dell'equazione di Klein-Gordon. Ma allora vale

$$S_R(x - y) = (i\not{D} + m) \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^3} \frac{i}{p^2 - m^2} e^{ip(x-y)} = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^3} \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2} e^{ip(x-y)} \quad (1.30)$$

d'altra parte, potevamo ottenere immediatamente lo stesso risultato passando in trasformata di Fourier,

$$i\delta(x - y) = (\not{p} - m)S_R(x - y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} (\not{p} - m)\tilde{S}_R(p) e^{-ip(x-y)} \quad (1.31)$$

Ricordando ora che

$$i\delta(x - y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{-ip(x-y)} \quad (1.32)$$

troviamo dunque che

$$(\not{p} - m)\tilde{S}_R = i \implies \tilde{S}_R = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2} \implies \tilde{S}_F(p) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \quad (1.33)$$

in accordo con quello precedentemente trovato.

²c'è un modo semplice di vedere perché questo deve valere. Per la statistica fermionica, è impossibile creare dal vuoto uno stato avente due particelle identiche. Ciò è automaticamente realizzato se valgono le relazioni di anticommutazione, perchè $b_p^{\dagger, r} b_{p'}^{\dagger, s} |0\rangle = -b_{p'}^{\dagger, s} b_p^{\dagger, r} |0\rangle$. Dunque gli stati fermionici sono completamente antisimmetrici nelle etichette (momento, spin, ecc.) che li caratterizzano.

1.3 Il propagatore del fotone

Cominciamo con lo scrivere la lagrangiana della QED:

$$\mathcal{L}_{QED} = \bar{\psi}(i\gamma_\mu(\partial^\mu + ieA^\mu) - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \mathcal{L}_{GF} \quad (1.34)$$

Non tutti i termini sono immediati, dunque spieghiamo lo scopo di ciascun termine:

1. $F_{\mu\nu}$ è la parte dinamica del campo e.m. Questo permette di ottenere le equazioni di Maxwell $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$.
2. Il campo A_μ compare anche nel pezzo di lagrangiana di Dirac. Questo termine rappresenta l'accoppiamento fra il potenziale di gauge e i campi di materia. Classicamente, avremmo scritto $-A_\mu J^\mu$, ma sappiamo che per un fermione di Dirac, la corrente è data da $J_\mu = -e\bar{\psi}\gamma_\mu\psi$.
3. Il termine $\mathcal{L}_{GF}$ è detto gauge fixing. Vedremo più in dettaglio dopo che senza questo termine, la lagrangiana è invariante rispetto a trasformazioni di gauge locali. Questo però genera una ambiguità, che non permette di calcolare il propagatore. Una possibile scelta per il gauge fixing è $\mathcal{L}_{GF} = -(1/2)(\partial_\mu A^\mu)^2$.

Vediamo più in dettaglio la trasformazione locale di cui parlavamo. Supponiamo che il campo si trasformi come

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = e^{ie\alpha(x)}\psi(x) \implies \bar{\psi}(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x) = \bar{\psi}(x)e^{-ie\alpha(x)} \quad (1.35)$$

vediamo come cambia la lagrangiana: la parte di Dirac *non* è invariante, infatti

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}(i\cancel{\partial} - m)\psi = i\bar{\psi}\cancel{\partial}\psi - m\bar{\psi}\psi \quad (1.36)$$

il termine con la massa è invariante, mentre invece il primo termine contiene una derivata che agisce su $\alpha(x)$, che non è costante per ipotesi. In particolare, calcoliamo

$$\mathcal{L}'_{\text{Dirac}} = -m\bar{\psi}\psi + i\bar{\psi}e^{-i\alpha(x)}(e^{i\alpha(x)}(\cancel{\partial}\psi) + ie\gamma^\mu\partial_\mu\alpha(x)e^{ie\alpha(x)}\psi) \quad (1.37)$$

$$= \mathcal{L}_{\text{Dirac}} + i\bar{\psi}(ie\gamma^\mu\partial_\mu)\psi \quad (1.38)$$

Dunque, possiamo avere una lagrangiana invariante, se inseriamo un campo che si trasformi come

$$A_\mu \rightarrow A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu\alpha(x) \quad (1.39)$$

tipicamente, la lagrangiana di Dirac con l'aggiunta di questo termine di interazione, che ci accorgiamo a posteriori essere il termine di accoppiamento materia-campo e.m. della lagrangiana di Maxwell classica, si scrive

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \quad (1.40)$$

dove abbiamo introdotto la *derivata covariante*, data da

$$D^\mu = \partial^\mu + ieA^\mu \quad (1.41)$$

In particolare, per tutto quello che abbiamo detto, vale che

$$\not{D}\psi \rightarrow \not{D}\psi' = e^{ie\alpha(x)}\psi \quad (1.42)$$

così che la lagrangiana è ad occhio invariante. Una teoria di questo tipo si dice teoria di *gauge*, con gruppo di gauge $G = U(1)$, perché le trasformazioni $e^{ie\alpha(x)}$ sono mappe dallo spaziotempo al gruppo di Lie $U(1)$.

In questo caso particolare, gli elementi del gruppo sono rappresentati sempre come scalari. Questo è un caso particolare, che deriva dalla semplicità del gruppo di gauge $U(1)$. Vedremo che ad esempio in cromodinamica, il gruppo di gauge sarà più complicato, e come questo porti a grandi differenze fisiche nella teoria.

Ora, il campo A_μ è descritto da un vettore, quindi ha quattro componenti. Mi chiedo se queste componenti sono *fisiche*, ovvero se sono tutte indipendenti fra di loro. Scopriremo che in realtà solamente due sono indipendenti, e in particolare diremo che il fotone è descritto da due gradi di libertà *trasversali*. Vediamo perché:

Inanzitutto, c'è la libertà di gauge: il campo è invariante se aggiungo il gradiente di qualunque funzione scalare: dunque posso sempre fissare il gauge ponendo una componente uguale a 0. Chiaramente allora la libertà di gauge toglie un grado di libertà al fotone.

Ora, quando inserisco il termine di gauge fixing, una parte del tensore $F_{\mu\nu}$ si ricombina con questo, e forma una divergenza totale, che non contribuisce all'azione, e conseguentemente alle equazioni del moto: si trova che alla fine queste sono date da

$$\square A^\nu = J^\nu \implies \square \partial_\nu A^\nu = \partial_\nu J^\nu = 0 \quad (1.43)$$

dove nell'ultima abbiamo usato che J^ν è la corrente conservata, associata alle trasformazioni di fase globali. Ma questo significa che se definisco un campo ϕ come

$$\phi := \partial_\mu A^\mu \implies \square \phi = 0 \quad (1.44)$$

questo fissa un altro grado di libertà, e dunque gli unici gradi sono 2. Ora, abbiamo accennato al fatto che il gauge fixing serve al calcolo della funzione di green. Vediamo più in dettaglio: il propagatore del fotone è la funzione di Green, cioè la soluzione dell'equazione

$$\square \Delta^{\mu\nu} - \partial^\mu \partial_\lambda \Delta^{\lambda\nu} = -g^{\mu\nu} \delta(x-y) \quad (1.45)$$

questo *senza* il gauge fixing: abbiamo già detto che se introduciamo il secondo termine, allora bisogna semplicemente risolvere

$$\square \Delta^{\mu\nu} = -g^{\mu\nu} \delta(x-y) \quad (1.46)$$

Per risolverla, passiamo nello spazio di Fourier:

$$\Delta^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \tilde{\Delta}(p) e^{-ipx} \implies \tilde{\Delta}(p) = p^{-2} \quad (1.47)$$

dunque il propagatore del fotone è dato da

$$\Delta^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{e^{-ipx}}{p^2 + i\epsilon} \quad (1.48)$$

abbiamo menzionato che i due gradi di libertà indipendenti del fotone sono gradi trasversali. Vediamo perché: decomponiamo il campo A^μ in termini di Fourier:

$$A_\mu = \int \frac{d^3k}{\sqrt{2\omega}(2\pi)^3} \sum_s (\epsilon_\mu^s a_{\vec{k}}^s e^{-ikx} + \epsilon_\mu^{*,s} a_{\vec{k}}^{\dagger,s} e^{ikx}) \quad (1.49)$$

ora, i vettori ϵ_μ che indicano la direzione del fotone, sono vettori quadridimensionali, e come tali posso decomporlo in

$$\epsilon_\mu(\vec{k}) = \epsilon_{T,\mu} + a k_\mu + b \bar{k}_\mu \quad (1.50)$$

dove in particolare:

1. se scrivo $k_\mu = (k, \vec{k})$, allora $\bar{k}_\mu = (k, -\vec{k})$
2. Il vettore $\epsilon_{T,\mu} = (0, \vec{\epsilon}_T)$ è un vettore tridimensionale, e *trasversale*: questo vuol dire che soddisfa $\vec{k} \cdot \vec{\epsilon}_T = 0$

Ora, chiaramente poiché se prendo $\partial_\mu \rightarrow k_\mu$, è chiaro che $\partial_\mu A^\mu \propto b$. D'altra parte, abbiamo visto che dalle equazioni del moto, $\partial_\mu A^\mu$ non interagisce con gli altri campi e non partecipa alla dinamica: posso dunque porre $b = 0$. D'altra parte, con una trasformazione di gauge posso sempre porre $a = 0$. Questo prova il nostro punto.

Questo trova una applicazione pratica nella *somma sulle polarizzazioni*: infatti, spesso vorremo calcolare

$$\sum_{\lambda} \epsilon_{\mu}(p, \lambda) \epsilon^{\nu}(p, \lambda) = \Pi^{\mu\nu} \quad (1.51)$$

Ora, qualunque cosa sia $\Pi^{\mu\nu}$, poiché i vettori di polarizzazione sono trasversali, deve certamente valere che $\Pi^{\mu\nu} p_{\nu} = \Pi^{\mu\nu} \bar{p}_{\nu} = 0$. Non è difficile convincersi che il tensore più generale che soddisfa questa condizione è dato da

$$\Pi_{\mu\nu} = -g_{\mu\nu} + \frac{p_{\mu} \bar{p}_{\nu} + \bar{p}_{\mu} p_{\nu}}{p \cdot \bar{p}} \quad (1.52)$$

in un calcolo realistico, l'espressione si semplifica ulteriormente. Questo perché se calcolo un elemento di matrice, questo spesso ha la forma

$$M = M_{\mu} \epsilon_{\lambda}^{\mu}(p) \quad (1.53)$$


D'altra parte, vale l'identità di Ward, che ci dice $\partial_{\mu} M^{\mu} = 0 \implies p_{\mu} M^{\mu} = 0$. Dunque quando prendo il prodotto del tensore $\Pi^{\mu\nu}$ e lo contraggo con l'elemento di matrice ϵ_{μ} , solo la parte proporzionale alla metrica sopravvive. Per questo motivo, in tutti i calcoli pratici useremo

$$\Pi^{\mu\nu} = -g^{\mu\nu} \quad (1.54)$$

1.3.1 Un primo esempio di calcolo

Come primo esempio di calcolo di un processo realistico, consideriamo il caso di un fotone, con polarizzazione r e momento p , che da origine ad una coppia particella - antiparticella, con momenti k_1, k_2 e spin s_1, s_2 .

Questo è il famoso (e importante) risultato che una coppia elettrone-positrone può formarsi a partire da un fotone incidente. Il suo diagramma di Feynman è dato da



Calcolare l'elemento di matrice ci permetterà di scrivere la regola di Feynman per questo vertice. Il problema è il seguente, voglio calcolare

$$\langle k_1, k_2 | p \rangle = \langle 0 | \sqrt{2E_1} \sqrt{2E_2} b_{k_1}^{r_1} d_{k_2}^{r_2} \underbrace{\left(-i \int d^4 x e \bar{\psi} \gamma_{\mu} \psi A^{\mu} \right)}_{\text{Hamiltoniana d'interazione}} a_p^{\dagger, r} \sqrt{2\omega} | 0 \rangle \quad (1.55)$$

il prossimo step è di scrivere $\psi, \bar{\psi}, A^\mu$ in trasformata di Fourier, esplicitando così gli operatori di creazione e distruzione. D'altra parte, faccio la seguente osservazione: poiché il campo A^μ moltiplica l'operatore $a_p^{\dagger, r}$, sapendo le relazioni di commutazione di $a, a^\dagger$, posso commutare i due operatori, e a annichilisce il vuoto. L'unico contributo non nullo avviene quando il commutatore non è banale, cioè quando viene selezionato a_p . Un ragionamento uguale vale anche per b, d e si trova che l'elemento di matrice diventa

$$\langle k_1, k_2 | p \rangle = (-ie) \int d^4x \langle 0 | \bar{u}_{k_1}^{r_1} e^{ik_1x} \gamma_\mu v_{k_2}^{r_s} e^{ik_2x} \epsilon^{\mu, r} e^{-ipx} | 0 \rangle \quad (1.56)$$

In particolare, gli esponenziali che rimangono dallo sviluppo di Fourier si ricombinano in una delta di Dirac, che esprime la conservazione dell'impulso:

$$\langle k_1, k_2 | p \rangle = (-ie)(2\pi)^4 \delta(k_1 + k_2 - p) \bar{u}_{k_1} \gamma^\mu v_{k_2} \epsilon_\mu(p) \quad (1.57)$$

notiamo in particolare il coefficiente $-ie\gamma^\mu$: questo è particolare di questo vertice, ed è la sua regola di Feynman.

Oltre alla regola specifica del vertice, osserviamo una proprietà universale di questi processi: per ogni fermione entrante, questo porta con sé $u(p)$, per ogni anti-fermione entrante, questo porta con sé $\bar{v}(p)$. Similmente, se il fermione è uscente porta $\bar{u}(p)$, e un antifermione uscente $v(p)$. Non è difficile convincersi che queste regole discendono dalle relazioni di commutazione degli operatori di creazione e distruzione.

2

La teoria dell'urto

Siamo pronti ad applicare quello che abbiamo imparato per cominciare a fare dei conti pratici: vogliamo calcolare degli elementi di matrice, al fine di determinare la sezione d'urto di alcuni processi fisici.

Ma cosa è una sezione d'urto? vediamo con un esempio schematico. Abbiamo un insieme di particelle, di tipo B, che vengono lanciate contro un bersaglio, ovvero delle particelle di tipo A. L'impatto avviene su una superficie S . Se pensiamo che le particelle di tipo B siano in un cubetto di lato ℓ_B e di densità ρ_B , e il bersaglio sia di lato ℓ_A e di densità ρ_A , è intuitivo che varrà

$$N_{\text{eventi}} \propto \rho_A \rho_B \ell_A \ell_B S \quad (2.1)$$

La *sezione d'urto* σ è definita come la costante di proporzionalità. Dimensionalmente, è un'area. Uno può pensarla come l'area effettiva delle particelle di tipo A, viste dalle particelle di tipo B.

Ora, immaginiamo che le particelle di tipo B vengano lanciate sul bersaglio, tutte ad una diversa altezza. Se indichiamo con b il *parametro d'impatto*, cioè la distanza minima fra la particella e il bersaglio, tutte le particelle B avranno diverso parametro di impatto. Indicata con $P(b)$ la probabilità che avvenga l'impatto dato un certo parametro di impatto (quantità che tipicamente viene fornita dalla teoria di campo), allora vale

$$N_{\text{eventi}} = \int d^2b \rho_B \ell_B P(b) = \rho_B \ell_B \int d^2b P(b) \quad (2.2)$$

Se il bersaglio è singolo, $N_A = 1$, e $N_B = \frac{N_B}{S} \sigma = \rho_B \ell_B \sigma$. Concludiamo allora che

$$\sigma = \int d^2b P(b) \quad (2.3)$$

Il calcolo di questo integrale è particolarmente tedioso, perché in $P(b) = |\langle i | f \rangle|^2$ vorremo scrivere gli stati iniziali e finali come autostati dell'impulso. D'altra parte, dobbiamo effettuare l'integrale nello

spazio. Dovremmo quindi prendere dei pacchetti d'onda piccati, e poi alla fine del conto prendere il limite di pacchetto molto piccato. Alla fine del lungo calcolo, si trova che

$$d\sigma = dp_f \frac{(2\pi)^4 \delta(P_A + P_B - P_f) M_{AB \rightarrow f}^2}{4E_A E_B |p_{z,A}/E_A + p_{z,B}/E_B|} \quad (2.4)$$

Il differenziale dp_f rappresenta un volumetto infinitesimo nello spazio delle fasi. In generale, per n corpi nello stato finale si scrive

$$dp_f = \left(\prod_i^n \frac{d^3 p_i}{(2\pi)^3 2E_i} \right) (2\pi)^4 \delta(p_{IN} - \sum_i p_i) \quad (2.5)$$

Per fissare meglio le idee, vediamo invece come si scrive per due corpi finali. Allora avremmo

$$dp_{f2} = \frac{d^3 p_1 d^3 p_2}{(2\pi)^2 4E_1 E_2} \delta(p_1 + p_2 - p_{IN}) \quad (2.6)$$

Nel caso più generale, i due corpi hanno masse diverse. Questo vuol dire che $p_1^2 = m_1^2 \neq p_2^2 = m_2^2$. Posso usare la delta per integrare in $d^3 p_2$, ed ottenere

$$dp_{f2} = \frac{d^3 p_1}{(2\pi)^2 4E_1 E_2} \delta(E_1 + E_2 - E_{IN}) = \frac{p_1^2 dp_1 d\Omega^2}{(2\pi)^2 4E_1 E_2} \delta(E_1 + E_2 - E_{IN}) \quad (2.7)$$

Ora, vorremo usare l'ultima delta nell'energia per integrare in dp_1 . Per farlo, devo scrivere

$$\delta(E_1 + E_2 - E_{IN}) = \delta(p_1 - \bar{p}_1) \left(\frac{d}{dp_1} (E_1 + E_2 - E_{IN}) \right)^{-1} \quad (2.8)$$

Per trovare $\bar{p}_1$ si tratta solamente di algebra, perché possiamo metterci nel SR del centro di massa dove $P_{IN} = 0$, e scriveremo $E_1 = \sqrt{m_1^2 + p_1^2}$, $E_2 = \sqrt{m_2^2 + p_2^2}$, $E_{IN} = \sqrt{m_1^2 m_2^2 + 2p_1^2}$. Si trova infine che

$$\bar{p}_1^2 = \frac{E_{IN}^4 + m_1^4 + m_2^4 - 2E_{IN}^2 m_1^2 - 2E_{IN}^2 m_2^2 - 2m_1^2 m_2^2}{4E_{IN}^2} = \frac{\lambda(E_{IN}^2, m_1^2, m_2^2)}{4E_{IN}^2} \quad (2.9)$$

Troviamo infine che vale

$$dp_{f2} = \frac{d\varphi d\cos\theta}{16\pi^2} \frac{\bar{p}_1}{E_{IN}} \quad (2.10)$$

2.1 Calcolo del processo $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$


Consideriamo ora la lagrangiana

$$\mathcal{L} = \underbrace{i\bar{\psi}_e \not{D}\psi_e - m_e\bar{\psi}_e\psi_e}_{\text{elettrone}} + \underbrace{i\bar{\psi}_\mu \not{D}\psi_\mu - m_\mu\bar{\psi}_\mu\psi_\mu}_{\text{muone}} - \underbrace{\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}}_{\text{fotone}} \quad (2.11)$$

Poichè la derivata covariante è la stessa che agisce su entrambi i campi di materia, e ricordando che vale $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$, i due campi hanno diversa massa ma stessa carica (che è proprio quello che succede sperimentalmente con elettrone e muone).


• Osservazione: •

Poichè i due campi di materia compaiono disaccoppiati, questo vuol dire che i due campi non interagiscono direttamente tra di loro. Ad esempio, un processo del tipo



non è permesso da questa teoria. (e in effetti non si osserva neanche in natura)

Ora, quello che noi faremo è calcolare processi al *primo ordine*. Questo vuol dire che considereremo dei diagrammi ad albero, dove non ci sono dei loop chiusi. In particolare, il primo step è sempre disegnare le particelle uscenti ed entranti:




A questo punto, bisogna collegare il diagramma in modo che

1. Tutti i processi siano permessi dalla lagrangiana
2. Non si formino loop chiusi

In questo caso, l'unica possibilità è data da ¹

¹In caso ci fossero più possibilità, dobbiamo considerarle tutte separatamente e sommare su queste



Usando le regole di feynman che abbiamo visto, è l'elemento di matrice legato a questo processo sarà dato da

$$M_{\vec{s}} = \bar{v}_{s_1}(p_1)(ie\gamma_\mu)u_{s_2}(p_2)\frac{-ig^{\mu\nu}}{(p_1 + p_2)^2 + i\epsilon}\bar{u}_{s_3}(p_3)(ie\gamma_\nu)v_{s_4}(p_4) \quad (2.12)$$

Infatti:

1. Nel primo pezzo riconosco il vertice calcolato nella sezione precedente. Questo spiega il fattore $ie\gamma_\mu$. D'altra parte, ho una particella e^- entrante con momento p_2 , che porta con sé un fattore $u(p_2)$, mentre il positrone con momento p_1 porta un fattore $\bar{v}(p_1)$.
2. In mezzo, il fotone deve propagarsi: dunque riconosciamo il propagatore del fotone, con momento $p_1 + p_2$, grazie alla conservazione del momento
3. I fattori della fine si ottengono esattamente come quelli del primo pezzo.

Per calcolare la probabilità del processo dobbiamo calcolare

$$P_{e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-} = |M_{\vec{s}}|^2 = M_{\vec{s}}M_{\vec{s}}^* \quad (2.13)$$

dobbiamo quindi calcolarci $M_{\vec{s}}^*$. Andiamo per pezzi, abbiamo che:

$$(\bar{v}(p_1)ie\gamma^\mu u(p_2))^* = (-ie)u^+(p_2)(\gamma^0\gamma^\mu)^+v(p_1) \quad (2.14)$$

Ricordando che $\gamma^{0+} = \gamma^0$, si ha che

$$(\bar{v}(p_1)ie\gamma^\mu u(p_2))^* = (-ie)u^+(p_2)\gamma^{\mu+}\gamma^0v(p_1) \quad (2.15)$$

ora, $\gamma^{\mu+}\gamma^0 = \gamma^0\gamma^\mu$, e quindi

$$(\bar{v}(p_1)ie\gamma^\mu u(p_2))^* = (-ie)u^+(p_2)\gamma^0\gamma^\mu v(p_1) \quad (2.16)$$

$$= (-ie)\bar{u}(p_2)\gamma^\mu v(p_1) \quad (2.17)$$

Osservazione:-

Prendere il complesso coniugato equivale a percorrere la linea fermionica al contrario!

L'intero complesso coniugato dell'elemento di matrice sarà allora dato da

$$M_{\vec{s}}^* = v_{s_1}(p_1)(-ie\gamma_\mu)\bar{u}_{s_2}(p_2)\frac{ig^{\mu\nu}}{(p_1+p_2)^2-i\epsilon}u_{s_3}(p_3)(-ie\gamma_\nu)\bar{v}_{s_4}(p_4) \quad (2.18)$$

a *polarizzazione fissata* $\vec{s} = (s_1, s_2, s_3, s_4)$, la probabilità del processo è data da $M_{\vec{s}}M_{\vec{s}}^*$. D'altra parte, molte volte, e la cosa semplifica anche i calcoli, noi non misuriamo lo spin di questi oggetti, e possiamo *sommare sulle polarizzazioni*:

$$P_{e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-} = \sum_{\vec{s}} (MM^*)_{\vec{s}} \quad (2.19)$$

dovremo allora imparare a gestire scritture del tipo

$$\sum_{\vec{s}} \bar{v}_{s_1}(p_1)_\alpha (ie\gamma_{\alpha\beta}^\mu) u_{s_2}(p_2)_\beta \bar{u}_{s_2}(p_2)_\gamma (-ie)\gamma_{\gamma\delta}^{\mu'} v_{s_1}(p_1)_\delta \quad (2.20)$$

dove abbiamo esplicitato anche gli indici degli spinori. Ora, per valutare questa espressione dobbiamo chiaramente usare la regola delle *somme di spin*, che in generale ricordiamo essere data da:

$$\sum_{s_1} u_{s_1}(p_1)_\beta \bar{u}_{s_1}(p_1)_\gamma = \not{P}_2{}_{\beta\gamma} + m\mathbb{I}_{\beta\gamma} \quad (2.21)$$

E quella dello spinore v è simile, solamente con un segno meno davanti alla massa. Dunque la riga precedente si riduce a

$$\sum_{\vec{s}} \bar{v}_{s_1}(p_1)_\alpha (ie\gamma_{\alpha\beta}^\mu) u_{s_2}(p_2)_\beta \bar{u}_{s_2}(p_2)_\gamma (-ie)\gamma_{\gamma\delta}^{\mu'} v_{s_1}(p_1)_\delta = e^2(\not{P}_1{}_{\delta\alpha} - m\mathbb{I}_{\delta\alpha}\gamma_{\alpha\beta}^\mu(\not{P}_2{}_{\beta\gamma} + m\mathbb{I}_{\beta\gamma})\gamma_{\gamma\delta}^{\mu'}) \quad (2.22)$$

$$= e^2\text{Tr}((\not{P}_1 - m)\gamma^\mu(\not{P}_2 + m)\gamma^{\mu'}) \quad (2.23)$$

A questo punto non è difficile vedere che la somma sullo spin di tutto l'elemento quadro di matrice si riduce a

$$P_{e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-} = e^2\text{Tr}((\not{P}_1 - m_e)\gamma^\mu(\not{P}_2 + m_e)\gamma^{\mu'})\frac{g_{\mu\nu}g_{\mu'\nu'}}{(p_1+p_2)^4}e^2\text{Tr}((\not{P}_3 - m_\mu)\gamma^\nu(\not{P}_2 + m_\mu)\gamma^{\nu'}) \quad (2.24)$$

Questa riga rivela quanto sia importante capire come sia importante sapere come fare la traccia delle matrici gamma. Vediamo allora come si calcola:

$$\text{Tr}(\gamma^\mu) = \text{Tr}(\gamma^\mu \underbrace{\gamma^s \gamma^s}_{=\mathbb{I}}) = \text{Tr}(\gamma^s \gamma^\mu \gamma^s) = -\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^s \gamma^s) = -\text{Tr}(\gamma^\mu) \quad (2.25)$$

Dunque, $\text{Tr}(\gamma^\mu) = 0$. Più in generale, si mostra con gli stessi passaggi che vale

$$\text{Tr}(\gamma^{\mu_1} \dots \gamma^{\mu_n}) = (-)^n \text{Tr}(\gamma^{\mu_1} \dots \gamma^{\mu_n}) \quad (2.26)$$

dunque quando ho la traccia di un numero dispari di matrici gamma, sappiamo già che il risultato è zero. Se invece ne ho due?

$$\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) = \frac{1}{2} \text{Tr}(\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}) \quad (2.27)$$

$$= \frac{2g^{\mu\nu} \text{Tr}(\mathbb{I}_{4 \times 4})}{2} = 4g^{\mu\nu} \quad (2.28)$$

Per 4 matrici, si usano trucchi simili per dimostrare che

$$\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = 4g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - 4g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + 4g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho} \quad (2.29)$$

trucchi simili possono essere usati se ho più di 4 matrici, ma è consigliato usare dei programmi appositi.

Nel nostro calcolo, dobbiamo usare la formula per 2 e per 4 matrici. Ora, per creare una coppia di muoni, l'energia totale deve essere superiore a due volte la massa del muone, che sperimentalmente è circa 200 volte la massa dell'elettrone. Per questo motivo, possiamo fare l'ottima approssimazione di $m_e \simeq 0$, per semplificare i conti. La traccia sullo stato iniziale è allora data da

$$\text{Tr}(\not{P}_1 \gamma^\mu \not{P}_2 \gamma^\rho) = P_{1\alpha} P_{2\beta} \text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\mu \gamma^\beta \gamma^\rho) \quad (2.30)$$

$$= 4P_{1\alpha} P_{2\beta} [g^{\alpha\mu} g^{\beta\rho} - g^{\alpha\beta} g^{\mu\rho} + g^{\alpha\rho} g^{\mu\beta}] \quad (2.31)$$

La traccia sullo stato finale è leggermente più complicata perché non possiamo trascurare la massa del muone. Dovremmo dunque calcolare

$$\text{Tr}((\not{P}_3 - m_\mu) \gamma^\nu (\not{P}_2 + m_\mu) \gamma^\sigma) = \text{Tr}(\not{P}_3 \gamma^\nu \not{P}_2 \gamma^\sigma) - m_\mu^2 \text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\sigma) \quad (2.32)$$

Svolgendo l'algebra contraendo gli indici, si trova infine

$$\sum_{\vec{s}} |M|^2 = \frac{32e^2}{(P_1 + P_2)^4} (P_1 \cdot P_4 P_3 \cdot P_2 + P_1 \cdot P_3 P_4 \cdot P_2 + 2m_\mu^2 P_1 \cdot P_2) \quad (2.33)$$

Per trattare meglio l'espressione, introduciamo 3 invarianti, detti *invarianti di Mandelstam*. Sono definiti come

$$\begin{cases} s = (P_1 + P_2)^2 = 2m_e^2 + 2P_1 \cdot P_2 \simeq 2P_1 \cdot P_2 \\ t = (P_1 - P_2)^2 = m_e^2 + m_\mu^2 - 2P_1 \cdot P_3 \\ u = (P_1 - P_4)^2 = m_e^2 + m_\mu^2 - 2P_1 \cdot P_4 \end{cases} \quad (2.34)$$

Non sono completamente indipendenti tra di loro, poiché vale $s + t + u = \sum_i m_i^2$, come si verifica facilmente per questo caso. Invertendo le definizioni è possibile scrivere i prodotti scalari fra momenti in termini di invarianti di Mandelstam, e in questo modo troviamo che possiamo scrivere

$$\sum_{\vec{s}} |M|^2 = \frac{32e^4}{s^2} \left(\frac{(u - m_\mu^2)^2}{4} + \frac{(t - m_\mu^2)^2}{4} + m_\mu^2 \frac{s}{2} \right) \quad (2.35)$$

Apriamo ora una parentesi sulle dimensioni delle nostre quantità. Per la sezione d'urto deve valere

$$[\sigma] = [\ell]^2 = [E]^{-2} \quad (2.36)$$

ma poiché tipicamente scriviamo

$$\sigma = \frac{1}{8E_{IN}^2} |M|^2 dp_S \quad (2.37)$$

ciò implica che il prodotto fra l'elemento di matrice al quadrato e l'elemento dello spazio delle fasi deve essere *sempre adimensionale*. Dalla definizione di dp_s si trova che

$$[dp_S] = [E]^{-4+2n} \implies [|M|^2] = [E]^{4-2n} \quad (2.38)$$

nel caso di $n = 2$, cioè nel caso di nostro interesse per il momento, entrambi sono adimensionali.

Facciamo ora delle considerazioni *cinematiche* per determinare i valori degli invarianti da scrivere nell'elemento di matrice. Inanzitutto, ci mettiamo nel sistema del centro di massa. Allora,

$$P_1 + P_2 = (2E, \vec{0}) \implies s = 4E^2 \quad (2.39)$$

Poiché il momento deve conservarsi, i momenti uscenti dovranno essere opposti tra di loro, e prendere ciascuno metà dell'energia. Possiamo scrivere dunque

$$\begin{cases} P_3 = (E, P \sin \theta, 0, P \cos \theta), & P = \sqrt{E^2 - m_\mu^2} \\ P_4 = (E, -P \sin \theta, 0, -P \cos \theta) \end{cases} \quad (2.40)$$

strettamente parlando, ci sarebbe da considerare anche un angolo φ , che però possiamo sempre mettere a zero data la simmetria cilindrica del sistema. Trovo allora che vale anche

$$\begin{cases} t = (P_1 - P_3)^2 = -2E^2 \left(1 - \frac{p}{E} \cos \theta\right) + m_\mu^2 \\ u = (P_1 - P_4)^2 = -2E^2 \left(1 + \frac{p}{E} \cos \theta\right) + m_\mu^2 \end{cases} \quad (2.41)$$

sostituiamo allora nell'elemento di matrice:

$$\sum_{\vec{s}} |M|^2 = \frac{32e^4}{16E^4} \left(\frac{4E^4}{4} \left(1 + \frac{p}{E} \cos \theta\right)^2 \frac{4E^4}{4} \left(1 - \frac{p}{E} \cos \theta\right)^2 + \frac{4m_\mu^2 E^2}{2} \right) = \quad (2.42)$$

$$= 4e^4 \left(1 + \frac{m_\mu^2}{E^2} + \left(1 - \frac{m_\mu^2}{E^2} \cos^2 \theta\right) \right) \quad (2.43)$$

abbiamo finalmente scritto l'elemento di matrice! Ora possiamo assemblare la sezione d'urto:

$$d\sigma = \frac{1}{8E^2} \sum_{\vec{s}} |M|_{\vec{s}}^2 (1/4) dp_s \quad (2.44)$$


ho diviso per 4 perché devo mediare per su tutte le possibili configurazioni iniziali: anche se non misuro le polarizzazioni, lo stato iniziale avrà una polarizzazione random che non posso sapere! La sezione d'urto sarà allora (esplicitando lo spazio delle fasi finale a due corpi)

$$d\sigma = \frac{1}{32E_{IN}^2} \sum_{\vec{s}} |M|_{\vec{s}}^2 \frac{\sqrt{E^2 - m_\mu^2}}{2E} \frac{d^2\Omega}{16\pi^2} \quad (2.45)$$

e infine esplicitando l'elemento di matrice,

$$d\sigma = \frac{1}{32E^2} \frac{4e^4}{16\pi^2} \left(1 + \frac{m_\mu^2}{E^2} + \left(1 - \frac{m_\mu^2}{E^2}\right) \cos^2 \theta \right) \frac{\sqrt{1 - \frac{m_\mu^2}{E^2}}}{2} d\cos \theta d\varphi \quad (2.46)$$

avendo fatto questo lungo conto, è lecito chiedersi se per un diagramma simile dobbiamo rifare tutti i conti, o se in un certo senso possiamo "riciclare" il risultato ottenuto. Consideriamo ad esempio un processo $e^+ \mu^+ \rightarrow e^+ \mu^+$. L'unico diagramma di Feynman che possiamo disegnare è dato da



Modulo una rotazione, questo diagramma è equivalente al diagramma del processo che abbiamo precedentemente considerato!

Se provassimo a calcolare l'elemento di matrice del processo, ci accorgeremmo che matematicamente le due formulazioni sono equivalenti, se però faccio le sostituzioni

$$\begin{cases} P_1 \rightarrow Q_1 \\ P_2 \rightarrow -Q_3 \\ P_3 \rightarrow Q_4 \\ P_4 \rightarrow -Q_2 \end{cases} \quad (2.47)$$

Possiamo allora facilmente verificare come cambiano gli invarianti di Mandelstam:

$$\begin{cases} s \rightarrow t' \\ t \rightarrow u' \\ u \rightarrow s' \end{cases} \quad (2.48)$$

e calcoliamo immediatamente il modulo quadro dell'elemento di matrice del processo:

$$|M|_{e^+\mu^+\rightarrow e^+\mu^+}^2 = \frac{32e^4}{t^2} \left(\frac{(s - m_\mu)^2}{4} + \frac{(u - m_\mu)^2}{4} + \frac{t}{2}m_\mu^2 \right) \quad (2.49)$$

questa è nota come *simmetria di crossing*.

Torniamo a parlare del nostro elemento di matrice. In particolare, notiamo una simmetria in $\cos\theta$. Potevamo aspettarcela? In realtà, si tratta di una conseguenza del fatto che abbiamo sommato su tutte le polarizzazioni. Vediamo allora cosa facciamo se consideriamo un processo a polarizzazioni fisse, ad esempio $e_L^+ e_L^- \rightarrow \mu_L^+ \mu_L^-$. Cosa cambia nel calcolo?

Siccome non vogliamo buttare via tutto i progressi che abbiamo fatto tracciando le matrici gamma, possiamo sommare su tutte le polarizzazioni, e poi proiettare sul sottospazio di nostro interesse. In particolare, l'elemento di matrice è dato da

$$M = \bar{v}_L(p_1) \left(\frac{1 + \gamma^5}{2} \right) \gamma^\mu \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) u(p_2) \quad (2.50)$$

Così che la traccia sullo stato iniziale diventa

$$\text{Tr} \left(\not{p}_1 \gamma^\mu \not{p}_2 \gamma^\sigma \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) \right) \quad (2.51)$$

Ritroviamo quindi metà traccia che abbiamo già calcolato per lo stato polarizzato, più un'altra traccia che include anche la γ^5 . Come si tracciano le matrici di Dirac se ho anche una γ^5 ? Inanzitutto γ^5 è il prodotto di 4 gamma con indici diversi, quindi $\text{Tr}\gamma^5 = 0$. Vale inoltre che $\text{Tr}\gamma^5\gamma^\nu\gamma^\mu = 0$, e anche che la traccia del prodotto di γ^5 con un numero dispari di gamma è 0. Dunque la prima traccia non banale, e quella anche che interessa a noi, è data da

$$\text{Tr}(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma) = 4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \quad (2.52)$$

a questo punto, si tratta solamente di svolgere il prodotto delle nuove tracce, e di sostituire i nuovi prodotti fra i momenti che appaiono in termini degli invarianti di Mandelstam, e si ottiene che

$$M_{LL \rightarrow LL}^2 = e^4(1 + \cos\theta)^2 \quad (2.53)$$

Questo stesso risultato si può ottenere in un modo un po' più fisico, in termini della conservazione del momento angolare.

Consideriamo infatti la coppia elettrone-positrone che stanno per collidere. Siamo sempre nel limite di alte energie, e possiamo considerarli massless. Per particelle massless, la chiralità (cioè l'autovalore di γ^5) e l'elicità (cioè l'autovalore di $\vec{p} \cdot \vec{\sigma}$) coincidono, mentre per le antiparticelle massless, sono una l'opposto dell'altra. I momenti saranno $P = (E, 0, 0, E)$ per l'elettrone, e $\bar{P} = (E, 0, 0, -E)$ per il positrone.

Scriviamo esplicitamente gli spinori: ² Per l'elettrone avremo (nel limite ultra-relativistico)

$$u(P) = \begin{pmatrix} \sqrt{P \cdot \sigma} \xi^+ \\ \sqrt{P \cdot \bar{\sigma}} \xi^+ \end{pmatrix} \quad (2.54)$$

con $\sigma_z \xi^+ = \xi^+$. Ma questo implica che $P \cdot \sigma = E(1 + \sigma_z)$, $P \cdot \bar{\sigma} = E(1 - \sigma_z)$, cioè

$$u(P) = \sqrt{2E} \begin{pmatrix} \xi^+ \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.55)$$

Similmente per il positrone ci interessa

$$v(P) = \begin{pmatrix} \sqrt{\bar{P} \cdot \sigma} \xi^- \\ -\sqrt{\bar{P} \cdot \bar{\sigma}} \xi^- \end{pmatrix} = \sqrt{2E} \begin{pmatrix} \xi^- \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.56)$$

Possiamo allora calcolare esplicitamente il termine

²Nota che con il formalismo di sommare sulle polarizzazioni, e al limite proiettare dopo sulla polarizzazione desiderata, non abbiamo fino ad ora dovuto mai scrivere uno spinore esplicitamente.

$$\epsilon_{in}^\mu = \bar{v}(\vec{p})\gamma^\mu u(P) = \underbrace{(\sqrt{2E}\xi^-, 0)}_{=\bar{v}(\vec{P})} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2E}\xi^+ \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.57)$$

Svolgendo il prodotto righe per colonne,

$$\epsilon_{in}^\mu = 2E\xi^-\bar{\sigma}^\mu\xi^+ = 2E \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.58)$$

Ora, per quanto riguarda il termine, ϵ_{out}^μ , questo risulta da una rotazione, nel piano (x,z), della polarizzazione iniziale. Esplicitamente,


$$\epsilon_{out}^\mu = R(\theta)^\mu_\nu \epsilon_{in}^\nu = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\theta \\ i \\ -\sin\theta \end{pmatrix} \quad (2.59)$$

ora semplicemente vale che

$$|M|^2 \propto |\epsilon_{in}\epsilon_{out}|^2 = (1 + \cos\theta)^2 \quad (2.60)$$

2.2 Urto compton

Un processo leggermente più complicato consiste nell'urto compton, che è l'urto fra un fotone ed un elettrone, $e^-\gamma \rightarrow e^-\gamma$. In effetti, in questo caso sono possibili due diagrammi di Feynman:



Quindi, rispetto al calcolo $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$, dobbiamo calcolare $|M_1|^2, |M_2|^2, 2\text{Re}(M_1M_2^*)$. Per farlo, usiamo le stesse regole di Feynman della sezione precedente. L'unica differenza è che ora nello stato intermedio

c'è un fermione, e dunque apparirà il propagatore fermionico. Sempre sommando su tutte le possibili polarizzazioni, guardando al primo diagramma scriveremo

$$|M_1|^2 = e^4 \text{Tr} \left(\not{p}_3 \gamma^{\mu_4} \frac{\not{p}_1 + \not{p}_2}{(p_1 + p_2)^2} \gamma^{\mu_2} \not{p}_1 \gamma^{\nu_2} \frac{\not{p}_1 + \not{p}_2}{(p_1 + p_2)^2} \gamma^{\nu_4} \right) g_{\mu_2 \nu_2} g_{\mu_4 \nu_4} \quad (2.61)$$

$$= e^4 \text{Tr} \left(\not{p}_3 \gamma^\mu \frac{\not{p}_1 + \not{p}_2}{(p_1 + p_2)^2} \gamma^\nu \not{p}_1 \gamma_\nu \frac{\not{p}_1 + \not{p}_2}{(p_1 + p_2)^2} \gamma_\mu \right) \quad (2.62)$$

L'espressione sembra essere più complicata di quella precedente, perché si tratta della traccia di 8 matrici di Dirac. D'altra parte, ci accorgiamo che, data l'algebra di Clifford, si ha che

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu = -\gamma_\mu \gamma^\mu \gamma^\nu + 2g^{\mu\nu} \gamma_\mu = -4\gamma^\nu + 2\gamma^\nu = -2\gamma^\nu \quad (2.63)$$

Usando quindi anche la ciclicità della traccia, l'argomento di matrice si scrive più semplicemente come

$$|M_1|^2 = \frac{16e^4}{s^2} \text{Tr} \left(\not{p}_3 (\not{p}_1 + \not{p}_2) \not{p}_1 (\not{p}_1 + \not{p}_2) \right) \quad (2.64)$$

queste sono solo 4 matrici, e le sappiamo tracciare.

3

Rinormalizzazione e contributi a più loop


3.0.1 I controtermini

Torniamo alla lagrangiana della QED:

$$\mathcal{L}_{QED} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi - e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu \quad (3.1)$$

da quanti parametri dipende la teoria? Da due, ovvero la massa m della particella (e.g. elettrone), e la carica e .

Quando noi andiamo a vedere oltre al primo ordine in teoria delle perturbazioni, dobbiamo considerare anche i diagrammi di Feynman che includano dei loop: ad esempio, per il processo $e^-e^+ \rightarrow \mu^+\mu^-$, avremo



Questo può portare alcuni problemi. Alcuni sono di natura matematica: infatti molti dei contributi di questi diagrammi sono divergenti. D'altra parte, i parametri della nostra teoria risultano anche essere modificati. Consideriamo infatti il contributo al propagatore di un campo scalare:

Le regole di Feynman saranno, se il campo ha massa m_0 che compare nella lagrangiana, il propagatore scalare:

$$\frac{i}{p^2 - m_0^2 + i\epsilon} \quad (3.2)$$

e similmente possiamo assegnare una regola di Feynman al diagramma con loop amputato, cioè al cerchio senza i termini di propagatore che arrivano ai lati. La regola diremo essere

$$i\Sigma(p^2) \quad (3.3)$$

La somma su tutti gli ordini del propagatore è data da

$$\frac{i}{p^2 - m_0^2 + i\epsilon} \left[1 + \frac{(i)^2 \Sigma(p)^2}{p^2 - m_0^2 + i\epsilon} + \left(\frac{(i)^2 \Sigma(p)^2}{p^2 - m_0^2 + i\epsilon} \right)^2 + \dots \right] = \frac{i}{p^2 - m_0^2 + \Sigma(p^2) + i\epsilon} \quad (3.4)$$

dove nell'uguaglianza abbiamo riconosciuto la forma di una serie geometrica. Ora, nell'interpretazione del campo come collezione di operatori di creazione e distruzione, che agiscono su stati di *particelle*, è necessario che il propagatore risommato abbia un polo semplice nella massa della particella. Richiediamo allora questa come condizione, sostituendo

$$m_0^2 = m^2 + \delta m^2 \quad (3.5)$$

dove m è la massa *rinormalizzata*, e δm^2 è detto controtermine. Il propagatore risommato allora è dato da

$$\frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 + \Sigma(p^2) + i\epsilon} \quad (3.6)$$

A noi interessa il comportamento del propagatore per $p^2 \rightarrow m^2$, e quindi sviluppiamo in serie di Taylor Σ :

$$\frac{i}{(p^2 - m^2) - \delta m^2 + \Sigma(m^2) + \Sigma'(m^2)(p^2 - m^2) + \frac{1}{2}(p^2 - m^2)^2 \Sigma''(m^2) + \dots} \quad (3.7)$$

osserviamo che allora se identifichiamo $\delta m^2 = \Sigma(m^2)$, allora otteniamo

$$\frac{i}{(p^2 - m^2 + i\epsilon)(1 + \Sigma'(m^2))} = \frac{iZ_\phi}{p^2 - m^2 + i\epsilon}, \quad Z_\phi := \frac{1}{1 + \Sigma'(m^2)} \quad (3.8)$$

che è nella forma che volevamo! L'unico problema sorge nella costante moltiplicativa Z_ϕ (detta wave-function constant) che può dare dei problemi perchè l'interpretazione probabilistica di questa teoria, ha senso solo se il residuo del propagatore per $p^2 = m^2$ è 1. D'altra parte, noi possiamo riassorbire questa costante, se normalizziamo in modo diverso i nostri campi:

$$\phi_0 = Z_\phi^{-1/2} \phi \implies \mathcal{L} = Z_\phi^{-1} \mathcal{L}_0 \quad (3.9)$$

Adesso vediamo cosa succede nel caso di un fermione. Ricordiamo la forma del propagatore fermionico,

$$\frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon} = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \quad (3.10)$$

Come regola di un diagramma di un loop amputato, assumiamo $i\Sigma(\not{p})$

Ipostando allora il calcolo come per il campo scalare, abbiamo alla fine che il propagatore risommato è dato da

$$\frac{i}{(\not{p} - m + i\epsilon)(1 + \Sigma'(m))} \quad (3.11)$$

tipicamente, si ha che $\Sigma(\not{p}) = A(p^2, m)\mathbb{I} + B(p^2, m)\not{p}$. Per ottenere allora Σ' , scrivi

$$\frac{\partial}{\partial \not{p}} = \frac{\partial p^2}{\partial \not{p}} \frac{\partial}{\partial p^2} = 2\not{p} \frac{\partial}{\partial p^2} \quad (3.12)$$

che implica

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial \not{p}} = 2\not{p} \frac{\partial A(p^2)}{\partial p^2} + B(p^2) + 2p^2 \frac{\partial B(p^2)}{\partial p^2} \quad (3.13)$$

Veniamo a parlare ora del fotone. Questo è molto interessante, perchè al primo livello perturbativo il fotone è massless. Ci chiediamo se attraverso il processo di rinormalizzazione il fotone acquista massa. Il fotone è più complicato, in quanto teoria di gauge. In particolare, l'invarianza di gauge implica delle condizioni sulle funzioni di green, che sono dette Identità di Ward. Ad esempio, una identità di Ward è

$$M = M^\mu \epsilon_\mu \implies k_\mu M^\mu = 0 \quad (3.14)$$

Ora, immaginiamo che la regola di Feynman per il contributo a un loop amputato sia data da

$$i\Pi^{\mu\nu}(p^2) = A(p^2)p^2 g^{\mu\nu} + Bp^\mu p^\nu \quad (3.15)$$

dove abbiamo decomposto il tensore negli unici due tensori simmetrici disponibili. La WI mette un vincolo su A, B :

$$p_\mu \Pi^{\mu\nu} = 0 = A(p^2)p^2 p^\nu + Bp^2 p^\nu \implies A = -B \quad (3.16)$$

scriveremo dunque in forma generale, che

$$\Pi^{\mu\nu} = (p^2 g^{\mu\nu} - p^\mu p^\nu) \Pi(p^2) \quad (3.17)$$

Ora effettuiamo la correzione al propagatore a tutti gli ordini perturbativi (detta anche somma di Dyson): avremmo

$$-\frac{ig^{\mu\nu}}{p^2} - \frac{ig^{\mu\nu}}{p^2} (i(p^2 g_{\rho\sigma} - p_\rho p_\sigma)) \Pi(p^2) \frac{-ig^{\sigma\nu}}{p^2} + \dots \quad (3.18)$$

l'unica differenza col caso scalare è che ora dobbiamo prestare particolare attenzione agli indici. Se svolgiamo una per volta le contrazioni troviamo

$$-\frac{ig^{\mu\nu}}{p^2} - \frac{ig^{\mu\rho}}{p^2} \left(\delta_\rho^\nu - \frac{p_\rho p^\nu}{p^2} \right) (\Pi(p^2) + \Pi^2(p^2) + \dots) \quad (3.19)$$


$$= \frac{-i}{p^2(1 - \Pi(p^2))} \left(g^{\mu\nu} - \frac{p^\mu p^\nu}{p^2} \right) - \frac{i}{p^2} \left(\frac{p^\mu p^\nu}{p^2} \right) \quad (3.20)$$

dove abbiamo usato la somma geometrica. Ora, almeno in QED, il fotone si accoppia con una corrente conservata (i.e. la lagrangiana di interazione è data da $-iej^\mu A_\mu$, con $\partial_\mu j^\mu = 0$). L'ultimo termine dunque non compare mai nelle ampiezze fisiche, perché queste sono sempre trasverse. Concludiamo che in QED, il propagatore rinormalizzato del fotone è dato da

$$\frac{-ig^{\mu\nu} - \frac{p^\mu p^\nu}{p^2}}{p^2(1 - \Pi(p^2))} \quad (3.21)$$

Il risultato è di grande interesse: a meno di un fattore Z_A (costante della funzione d'onda), il propagatore ha la stessa forma che aveva al primo ordine in teoria delle perturbazioni. In particolare, non appaiono controtermini δm che permettano al fotone di acquistare massa. Un rapido calcolo mostra che questo avviene grazie all'identità di Ward. Concludiamo che grazie all'invarianza di gauge, il fotone rimane massless in tutti gli ordini in teoria delle perturbazioni.

Consideriamo ora il seguente processo, detto scattering di Thompson:



Mettiamoci nel caso di zero impulso trasferito, ovvero $q^\mu = 0$. Questo immediatamente ci dice che $q^2 = 0$, così che siamo sicuri che il fotone è on-shell.

Facciamo la seguente *condizione di rinormalizzazione*: voglio che questo vertice sia dato dalla regola $-ie\gamma^\mu$, con e la carica rinormalizzata, a tutti gli ordini in teoria delle perturbazioni, cioè

$$\lim_{q^2 \rightarrow 0} \Gamma_{A,f,f}^\mu(p, p - q) = -ieA_\mu \quad (3.22)$$


la condizione si può applicare in modo a sua volta perturbativo. Si sviluppano i controtermini e le costanti di funzione d'onda:

$$\frac{\delta e}{e} = \alpha \delta e^{(1)} + \alpha^2 \delta e^{(2)} + \dots, \quad \frac{\delta Z}{Z} = \alpha \delta Z^{(1)} + \dots \quad (3.23)$$

dove abbiamo scritto $Z^{1/2} = (1 + \delta Z)^{1/2}$. Si considerano poi i processi ordine per ordine, e si trova operativamente ordine per ordine una espressione per i controtermini.

3.1 Esempio di calcolo: self energia del fotone

Vediamo ora come possiamo effettuare il calcolo di un diagramma di Feynman che contiene un loop. Immediatamente ci rendiamo conto di un fatto singolare: le regole di Feynman ci dicono di imporre ad ogni vertice la conservazione del momento. D'altra parte, il diagramma dato da



conserva in ogni punto il momento, per *qualsunque* valore di $\vec{k}$. L'impulso sul loop è dunque sottodeterminato, e dobbiamo in qualche modo tenere conto di tutte le possibili possibilità. Da questa necessità nasce la nuova regola di Feynman:

$$\text{per ogni loop} \rightarrow \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \quad (3.24)$$

con l'aggiunta di un segno (-1) nel caso il loop sia un fermione. Qui nascono diverse difficoltà, che agli albori della QED fecero pensare che la teoria fosse in qualche modo incompleta. Il punto è che questi integrali sono molto spesso divergenti. Ad esempio, per il diagramma che abbiamo disegnato, avremmo:

$$i\Pi^{\mu\nu}(p) = (-1)e^2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \text{Tr} \left[\frac{(\not{k} + \not{p} - m_e)\gamma^\mu(\not{k} - m_e)\gamma^\nu}{[(k+p)^2 - m_e^2][k^2 - m_e^2]} \right] \quad (3.25)$$

Possiamo valutare la traccia usando le solite identità:

$$i\Pi^{\mu\nu}(p) = -4ie^2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{k^\mu(k+p)^\nu + k^\nu(k+p)^\mu - g^{\mu\nu}(k \cdot (k+p) - m_e^2)}{[(k+p)^2 - m_e^2][k^2 - m_e^2]} \quad (3.26)$$

Per combinare i denominatori introduciamo i parametri di Feynman:

$$\begin{aligned} i\Pi^{\mu\nu}(p^2) &= -4ie^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{k^\mu(k+p)^\nu + k^\nu(k+p)^\mu - g^{\mu\nu}(k \cdot (k+p) - m_e^2)}{(xp^2 + 2xp \cdot k + k^2 - m_e^2 + x^2p^2 - x^2p^2)^2} \\ &= -4ie^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{k^\mu(k+p)^\nu + k^\nu(k+p)^\mu - g^{\mu\nu}(k \cdot (k+p) - m_e^2)}{[(k+xp)^2 - \Delta(x)]^2} \end{aligned} \quad (3.27)$$

Dove abbiamo indicato $\Delta(x) = m_e^2 - x(1-x)p^2$. Conviene ora fare il cambio di variabile di integrazione $k \rightarrow \ell = k + xp$. Inanzitutto, vediamo come diventa il numeratore:

$$\begin{aligned} \text{Num} &= (\ell - xp)^\mu(\ell + (1-x)p)^\nu + (\ell - xp)^\nu(\ell + (1-x)p)^\mu - g^{\mu\nu}[(\ell - xp) \cdot (\ell + (1-x)p) - m_e^2] \\ &= 2\ell^\mu\ell^\nu - 2x(1-x)p^\mu p^\nu - \ell^2 g^{\mu\nu} + g^{\mu\nu}[x(1-x)p^2 + m_e^2] \end{aligned} \quad (3.28)$$

Nell'ultimo passaggio, abbiamo tenuto solamente i termini al secondo ordine o all'ordine zero in ℓ^μ , sapendo che chiaramente per parità vale

$$\int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^\mu}{f(\ell^2)} = 0 \quad (3.29)$$

Similmente, è facile vedere che deve valere

$$\int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^\mu\ell^\nu}{f(\ell^2)} = g^{\mu\nu} \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\alpha\ell^2}{f(\ell^2)} \quad (3.30)$$

Perché sempre per parità, l'integrale è diverso da zero s.se $\mu = \nu$. D'altra parter non è neanche difficile trovare la costante α : è sufficiente contrarre entrambi i lati con il tensore metrico:

$$\int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2}{f(\ell^2)} = 4\alpha \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2}{f(\ell^2)} \quad (3.31)$$

vediamo quindi che $\alpha = 1/4$, o più in generale $\alpha = 1/d$, con d la dimensione dello spaziotempo.

Di fatto, questa è una ricetta per calcolare gli integrali tensoriali che compaiono in questi calcoli: usare i parametri di feynman per combinare i denominatori, cambiare variabile di integrazione in modo tale che il denominatore dipenda solamente dal quadrato della variabile di integrazione: a questo punto, togliere gli elemento lineari nella variabile di integrazione, e trasformare in tensori metrici quelli quadratici. Successivamente si può procedere con rotazione di Wick e riduzione dimensionale. L'integrale in ℓ può sempre essere eseguito (anche se non potrebbe essere semplice), perché si tratta semplicemente di un integrale di una funzione razionale.

Figura 3.1: Diagrammi a "triangolo" che contribuisce alla funzione a 3 punti





Figura 3.2: Il vertice $ee\gamma$ considerando tutti i contributi



3.1.1 Fattori di forma elettromagnetici

Fino ad adesso, abbiamo considerato correzioni ai propagatori. Questi portavano ad un immediato effetto fisico: la necessità di controtermini infiniti per avere una massa finita della particelle. Consideriamo adesso (nel caso specifico della QED) le correzioni alla funzione a 3 termini, cioè al vertice. Un esempio di correzione ad un loop è quella data in figura 3.1: Gli altri diagrammi che contribuiscono a questo livello sono le self energie che si attaccano alle gambe esterne.

La somma di tutti i diagrammi in tutti gli ordini in teoria delle perturbazioni è chiaramente impossibile: possiamo però dare dei limiti al risultato, perché sappiamo che deve rispettare le simmetrie della teoria: in particolare, la simmetria di lorentz, di gauge, e la parità.

Scriviamo dunque, in generale

$$\langle e^- | J^\mu | e^- \rangle = \bar{u}_e \Gamma^\mu u_e \quad (3.32)$$

cioè $-ie\Gamma^\mu$ è il vertice contenendo tutti i contributi ad n loop, che indichiamo schematicamente come in figura 3.2. E ci chiediamo come può essere fatta Γ^μ . Inanzitutto osserva che deve essere una matrice 4×4 di Dirac, perché deve agire sullo spazio degli spinori. Una possibile base è quindi

$$\{\mathbb{I}, \gamma^5, \gamma^\mu, \gamma^5 \gamma^\mu, \sigma^{\mu\nu}, \gamma^5 \sigma^{\mu\nu}\} \quad (3.33)$$

Siccome la QED conserva la parità, possiamo gettare via le matrici che coinvolgono la γ^5 . D'altra parte, Γ^μ deve essere un vettore di lorentz: noi, oltre alle matrici γ^μ , abbiamo a disposizione due vettori indipendenti: $(p_1 + p_2)^\mu$, e l'impulso trasferito, $(p_1 - p_2)^\mu =: q^\mu$. Inoltre, l'unico scalare indipendente da cui possono dipendere i coefficienti è q^2 , la virtualità del fotone (che non deve essere necessariamente on-shell, perché il vertice può essere semplicemente un pezzo di diagramma).

Si trova quindi che la parità e la simmetria di lorentz riducono le possibilità ad

$$\langle e^- | J^\mu | e^- \rangle = A_1(q)^2 q^\mu + A_2(q)^2 (p_1 + p_2)^\mu + B(q^2) \gamma^\mu + C_1(q^2) \sigma^{\mu\nu} (p_1 + p_2)_\nu + C_2(q^2) \sigma^{\mu\nu} q_\nu \quad (3.34)$$

Infine, richiediamo che la corrente si conservi, cioè che valga l'identità di Ward: poiché $q_\mu J^\mu = 0$, deve valere che ogni pezzo contratto con il momento trasferito si annulli sempre. Esaminiamo pezzo per pezzo:

$$\begin{cases} A_1(q^2)q^2 \neq 0 \implies A_1(q^2) = 0 \\ A_2(q^2)(p_1 + p_2)^\mu(p_1 - p_2)_\mu = A_2(q^2)(p_1^2 - p_2^2) = 0 \\ B(q^2)\not{q} = 0, \quad \text{se valutato tra spinori} \\ C_1(q^2)\sigma^{\mu\nu}q_\mu(p_1 + p_2)_\nu \neq 0 \implies C_1(q^2) = 0 \\ C_2(q^2)\sigma^{\mu\nu}q_\mu q_\nu = 0 \end{cases} \quad (3.35)$$

Troviamo quindi

$$\Gamma^\mu = A(q^2)(p_1 + p_2)^\mu + B_1(q^2)\gamma^\mu + C_2(q^2)\sigma^{\mu\nu}q_\nu \quad (3.36)$$

Questi tre fattori possono essere ridotti a due usando l'identità di Gordon: tra due spinori, vale infatti

$$(p_1 + p_2)^\mu = (m_1 + m_2)\gamma^\mu - i\sigma^{\mu\nu}q_\nu \quad (3.37)$$

Nel nostro caso le masse sono uguali, e troviamo

$$\Gamma^\mu = f_1(q^2)\gamma^\mu + f_2(q^2)\sigma^{\mu\nu}q_\nu \quad (3.38)$$

Le due funzioni f_1, f_2 sono detti fattori di forma elettrico e magnetico. Chiaramente, a livello d'albero vale $f_1 = 1, f_2 = 0$.

4

Interazioni elettrodeboli

4.1 La teoria efficace di Fermi

Le prime osservazioni di processi mediati dalla forza debole sono stati il decadimento β e il decadimento del muone. La forza è detta debole per motivi storici: la vita media del muone è infatti dell'ordine dei minuti. Si consideri oppure i seguenti tempi di decadimento:

$$\begin{aligned}\Pi^\pm &\rightarrow \mu^\pm, \nu && \approx 10^8 s \\ \Pi^0 &\rightarrow \gamma\gamma && \approx 10^{-17} s\end{aligned}\tag{4.1}$$

Le cose peggiorano ancora se confrontate con decadimenti mediati dalla forza forte, dove la vita media è tipicamente 10^{-13} s. Esempi di decadimenti β sono

$$n \rightarrow p + e^- + \nu_e\tag{4.2}$$

$$\mu^- \rightarrow e^- + \nu_\mu + \bar{\nu}_e\tag{4.3}$$

$$\Pi^\pm \rightarrow \mu^\pm + \nu_\mu^{(-)}\tag{4.4}$$

• Osservazione: •

I processi sopra descritti *non* sono possibili in QED. Infatti, non esistono nella lagrangiana termini di accoppiamento del tipo $\bar{\psi}_\mu \gamma^\nu \psi_e$. Abbiamo bisogno di inventare una nuova lagrangiana per spiegare queste osservazioni.

Motivati da queste osservazioni, i fisici cominciarono a considerare lagrangiane del seguente tipo:

$$\mathcal{L} = -\frac{G_F}{\sqrt{2}} \underbrace{\bar{\psi}_\mu \gamma^\rho (1 - \gamma_5) \psi_{\nu_\mu}}_{J^\rho(\mu)} \underbrace{\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma_\rho (1 - \gamma_5) \psi_e}_{J_\rho(e)}\tag{4.5}$$

perché il termine $(1 - \gamma_5)$? Sperimentalmente (esperimento di Wu) si osservò che la parità non è conservata in un dai processi deboli, e successivamente venne mostrato che gli unici neutrini che si accoppiano con la forza debole, e sono quindi creati nei decadimenti β , sono left-handed.


Figura 4.1: Decadimento nella teoria efficace vs con bosone W^+



Per i decadimenti barionici, invece, si può prendere una lagrangiana del tipo

$$\mathcal{L} = -\frac{G_F}{\sqrt{2}} \bar{\psi}_\mu \gamma^\rho (1 - \gamma_5) \psi_d J_\rho(e) \quad (4.6)$$

che ad esempio rende possibile il seguente vertice:



Questo tipo di teoria, che permette l'interazione a 4 fermioni, è detta teoria di fermi. Si tratta di una buona approssimazione (per questo detta *teoria efficace*) della teoria elettrodebole, che si sviluppò storicamente solo decenni dopo. In effetti, ricordando che $[\psi] = m^{3/2}$, è immediato vedere che $[G_F] = m^{-2}$. Questo dà due problemi:

1. Una costante di accoppiamento con dimensione in massa negativa indica che la teoria è non rinormalizzabile.
2. L'unitarietà: consideriamo infatti $\langle f | S | i \rangle$. Se $S = \mathbb{I} + iT$, questo implica $TT^\dagger = i(T - T^\dagger)$. Questo vuol dire che T non può crescere troppo con l'energia, perché il lato sinistro scala come il quadrato mentre il lato destro scala linearmente. D'altra parte, sappiamo ad esempio che le ampiezze $2 \rightarrow 2$ devono essere adimensionali, e se la costante di accoppiamento ha dimensione in massa negativa, questo vuol dire che al numeratore devono sopravvivere fattori che sono illimitati al crescere dell'energia.

Il valore sperimentale della costante di Fermi è dato da $G_F = 1.16 \cdot 10^{-5} \text{GeV}^{-2}$. In particolare, $\Lambda = (G_F)^{-1/2} = 300 \text{ GeV}$, ovvero dell'ordine delle masse dei bosoni $W, Z^\pm$.

In particolare, la teoria di fermi è una teoria che approssima a bassa energia una teoria di gauge con bosoni *massivi*.¹

¹Il meccanismo che permette a dei bosoni di gauge di acquisire massa è noto come meccanismo di Higgs, e sarà descritto nel prossimo modulo. Si ricorda che non è possibile semplicemente aggiungere un termine $-m^2 A_\mu A^\mu$ alla lagrangiana perché inevitabilmente romperebbe l'invarianza di gauge.

Se pensiamo di calcolare le ampiezze per i diagrammi in figura 4.1, ci accorgiamo che sono abbastanza simili: le linee fermioniche sono le stesse, chiaramente nel secondo c'è un propagatore: questo contribuisce con un fattore a denominatore. Se k è l'impulso trasferito,

$$\frac{g^2}{m_W^2 - k^2} \approx \frac{g^2}{m_W^2} \quad (4.7)$$

con l'approssimazione valida per energie $< m_W$. La teoria di Fermi è il primo esempio di una teoria di campo efficace. Queste sono oggi usate per cercare della fisica oltre il modello standard.

4.2 Una teoria di gauge per le interazioni elettrodeboli

Vorremo costruire una teoria di gauge che includa elettromagnetismo e interazioni deboli. Questa sarebbe un'operazione elegante che ci permetterebbe di risolvere anche i problemi di rinormalizzabilità e di unitarietà. Quale gruppo di gauge però dovremmo prendere? Sicuramente deve valere $U(1) \subset G$, perché deve essere un'estensione dell'elettromagnetismo.

Un indizio ce lo dà direttamente la teoria di Fermi. Sappiamo che se le particelle si devono trasformare sotto trasformazioni di gauge, allora i campi che le descrivono devono appartenere ad una rappresentazione del gruppo. Un esempio di corrente che compare nella teoria di Fermi è

$$J^\rho(e) = \bar{\nu}_e \gamma^\rho (1 - \gamma_5) e \quad (4.8)$$

detta *corrente carica* (per ragioni che saranno più chiare tra poco). Questo stesso termine può essere scritto introducendo il doppietto di campi,


$$\psi_\ell = \begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix} \implies J^\rho(e) = \bar{\psi}_\ell \gamma^\rho (1 - \gamma_5) \tau^+ \psi_\ell, \quad \tau^+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.9)$$

Una cosa simile può anche essere fatta con i quark, introducendo $\psi_q = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}$. Questo è proprio il motivo dei nomi up e down. Questi doppietti di spinori sono detti *doppietti di isospin*.

La hermitiana coniugata è data dalla corrente $J^\rho(e)^\dagger = \bar{\psi}_\ell \gamma^\rho \tau^- \psi_\ell$ dove $\tau^- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. In termini delle matrici di Pauli τ_i , vale $\tau^\pm = (\tau^1 \pm i\tau^2)$. Siccome le matrici di Pauli sono i generatori di $\mathfrak{su}(2)$, immaginiamo che il gruppo di gauge per le interazioni deboli possa proprio essere $SU(2)$, con i doppietti di isospin che trasformano nella fondamentale. Se questa fosse la corretta teoria, possiamo fare subito una predizione²: oltre alle correnti già discusse, dovrebbe anche esserci una corrente conservata proporzionale a τ^3 (Teo. di Noether): questa sarebbe data da

²In effetti, questo passaggio non è del tutto scontato. Si potrebbe pensare che la corrente neutra conservata sia proprio la corrente elettromagnetica, e provare a modificare la struttura dei doppietti per far tornare proprio questa corrente. Storicamente però questo approccio si è rivelato errato, e quindi non lo discutiamo

Figura 4.2: Vertice a 4 di corrente neutra



$$\begin{aligned}
 J^\rho &= \bar{\psi}_\ell \gamma^\rho (1 - \gamma_5) \tau_3 \psi_\ell \\
 &= \frac{1}{2} (\bar{\nu}_e \gamma^\rho (1 - \gamma_5) \nu_e - \bar{e} \gamma^\rho (1 - \gamma_5) e)
 \end{aligned} \tag{4.10}$$

e permetterebbe il vertice rappresentato in figura 4.2.

In effetti, questo è un processo che si osserva, anche se è molto più complicato da vedere sperimentalmente rispetto ad esempio ai decadimenti β , e per questo motivo non era presente nella teoria di Fermi. Questa è una grande verifica che stiamo andando nella direzione giusta. Ora vorremmo unire questa teoria all'elettromagnetismo, in modo da descrivere in una teoria le 3 correnti conservate deboli + la corrente elettrica $U(1)$.

Questo vuol dire costruire una teoria di campo di gauge non abeliana, con gruppo $G = SU(2)_L \times U(1)$.

Similmente a quanto fatto nel caso abeliano, la derivata ordinaria diventa derivata covariante, per permettere alla lagrangiana di Dirac di essere invariante sotto trasformazioni locali. Nel nostro caso, avremmo quindi

$$\partial_\mu \rightarrow D_\mu = \partial_\mu - \frac{g}{2} W_\mu^i \tau_i - ie A_\mu \tag{4.11}$$

Tralasciando per il momento A_μ , vediamo come è fatta la lagrangiana di interazione di questa teoria. Vale, assumendo i fermioni massless³,

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}_\ell \not{D} \psi_\ell = i\bar{\psi}_\ell \not{\partial} \psi_\ell + \mathcal{L}_{int}, \quad \mathcal{L}_{int} = -i\frac{g}{2} \bar{\psi}_\ell \gamma^\mu W_\mu^i \tau^i \psi_\ell \tag{4.12}$$

che può essere riscritta in termini di τ^+, τ^-, τ^3 : basta usare

$$W_1 \tau_1 + W_2 \tau_2 = \frac{1}{2} \underbrace{(W_1 + iW_2)}_{:=W^+/\sqrt{2}} (\tau_1 - i\tau_2) + \frac{1}{2} \underbrace{(W_1 - iW_2)}_{:=W^-/\sqrt{2}} (\tau_1 + i\tau_2) \tag{4.13}$$

³In effetti, poiché le trasformazioni di $SU(2)$ agiscono solo sulle componenti left-handed, un termine di massa $-m(\bar{\psi}_L \psi_R + \bar{\psi}_R \psi_L)$ non sarebbe invariante. Conseguenza di ciò è che anche le masse dei fermioni devono essere recuperate tramite meccanismo di Higgs.

troviamo quindi, similmente a come ci aspettavamo,

$$\mathcal{L}_{int} = -i \frac{g}{\sqrt{2}} \underbrace{(\bar{\psi}_\ell W^+ \tau_+ \psi_\ell + \bar{\psi}_\ell W^- \tau_- \psi_\ell)}_{\text{correnti cariche}} + i \frac{g}{2} \underbrace{\bar{\psi}_\ell W^3 \tau_3 \psi_\ell}_{\text{corrente neutra}} \quad (4.14)$$

Sottoliniamo che il bosone vettore $W_\mu^i \tau_i$ di $SU(2)$ è più complicato rispetto al fotone $U(1)$: in particolare, prende valore nello spazio dei generatori di $\mathfrak{su}(2)$, cioè nell'aggiunta dell'algebra.

C'è però un punto importante, che segue da una semplice osservazione di teoria dei gruppi: poiché il gruppo di gauge è un prodotto *diretto* fra $SU(2)$ ed $U(1)$, i doppietti che si trasformano sotto $SU(2)$ (i doppietti di isospin come ψ_ℓ, ψ_q) devono essere autostati dell'operatore di carica di $U(1)$. Comprendiamo quindi che $U(1)$ non è direttamente l'elettromagnetismo, e la sua carica conservata non è la carica elettrica. La chiameremo invece *ipercarica*, indicheremo con Y e deve essere la stessa per ogni componente del doppietto di isospin. Inoltre chiameremo B_μ il campo di gauge per distinguerlo dal fotone.

Dove è finito allora il fotone? Facciamo l'ipotesi che i campi fisici *non* sono B_μ, W_μ^3 , ma una loro combinazione lineare:

$$B_\mu, W_\mu^3 \rightarrow \begin{cases} B^\mu = \cos \theta_W A^\mu - \sin \theta_W Z^\mu \\ W_\mu^3 = \sin \theta_W A_\mu + \cos \theta_W Z_\mu \end{cases} \quad (4.15)$$

l'angolo θ_W è detto angolo di Weinberg. Si possono sostituire queste espressioni all'interno della lagrangiana di interazione per leggere gli opportuni accoppiamenti. Ad esempio, l'accoppiamento con il fotone è dato da:

$$\nu_L = \frac{g}{2} \sin \theta_W + Y_L \frac{g'}{2} \cos \theta_W \quad (4.16)$$

$$e_L = -\frac{g}{2} \sin \theta_W + Y_L \frac{g'}{2} \cos \theta_W \quad (4.17)$$

$$\nu_R = Y_{\nu R} \frac{g'}{2} \cos \theta_W \quad (4.18)$$


$$e_R = Y_{eR} \frac{g'}{2} \cos \theta_W \quad (4.19)$$

Possiamo mettere dei vincoli a questi accoppiamenti, perché sappiamo la carica elettrica di queste particelle. In particolare, l'op. di carica è dato da

$$Q_e = \frac{\tau^3}{2} g \sin \theta_W + \frac{1}{2} Y g' \cos \theta_W \quad (4.20)$$

Poiché Y compare sempre in combinazione con g' , possiamo scegliere di porre $Y = -1$. Imponendo che i neutrini hanno carica nulla e che gli elettroni hanno carica $-e$, troviamo:

Figura 4.3: Esempi di possibili diagrammi di Feynman fra bosoni di gauge



$$\begin{cases} 0 = \frac{1}{2}g \sin \theta_W - \frac{1}{2}g' \cos \theta_W \implies g \sin \theta_W = g' \cos \theta_W \\ -e = -\frac{1}{2}g \sin \theta_W - \frac{1}{2}g' \cos \theta_W \implies e = g \sin \theta_W \end{cases} \quad (4.21)$$

Dalle misure sperimentali, si ha che $\sin^2 \theta_W \approx 0.23 \implies \sin \theta_W \approx 0.5 \implies e \approx g/2$. Dunque, l'accoppiamento della forza debole è in realtà più grande della forza elettromagnetica, ma i processi a bassa energia sono approssimati dalla teoria di Fermi, che ha una piccola costante di accoppiamento, perché le masse dei bosoni vettori sono più alte.

Infine, trattiamo brevemente della componente cinetica dei campi di gauge. Si può mostrare che la corretta generalizzazione della lagrangiana di Maxwell nel caso non abeliano è data da

$$\mathcal{L}_{\text{gauge}} = -\frac{1}{4}W_{\mu\nu}^a W_a^{\mu\nu} - \frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} \quad (4.22)$$

con $B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$, e $W_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a + f^{abc}W_\mu^b W_\nu^c$, dove f^{abc} sono le costanti di struttura dell'algebra, nel caso particolare di $SU(2)$ sono date da ϵ^{abc} . Questo termine aggiuntivo fa in modo che già nella lagrangiana di puro gauge siano presenti dei termini di interazione, che permettono vertici tra bosoni vettori, come quelli illustrati in figura 4.3.


Per completezza, riportiamo la forma dell'intera lagrangiana, scritta in termini dei campi fisici, ovvero $W^\pm, Z, A$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{YM}} = & -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{4}Z_{\mu\nu}Z^{\mu\nu} - \frac{1}{2}W_{\mu\nu}^+W_{\mu\nu}^- \\ & + ig \sin \theta_W (W_{\mu\nu}^+W_{\mu\nu}^-A^\nu - W_{\mu\nu}^-W_{\mu\nu}^+A^\nu + F_{\mu\nu}W_{\mu\nu}^+W_{\mu\nu}^-) \\ & + ig \cos \theta_W (W_{\mu\nu}^+W_{\mu\nu}^-Z^\nu - W_{\mu\nu}^-W_{\mu\nu}^+Z^\nu + Z_{\mu\nu}W_{\mu\nu}^+W_{\mu\nu}^-) \\ & + \frac{g^2}{2} (2g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} - g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}) \left[\frac{1}{2}W_\mu^+W_\nu^+W_\rho^-W_\sigma^- \right. \\ & \left. - W_\mu^+W_\nu^- (A_\rho A_\sigma \sin^2 \theta_W + Z_\rho Z_\sigma \cos^2 \theta_W + 2A_\rho Z_\sigma \sin \theta_W \cos \theta_W) \right]. \end{aligned} \quad (4.23)$$

4.3 Applicazione: il decadimento del muone

Consideriamo il seguente processo, di grande importanza fisica:

Figura 4.4: Unico diagramma ad albero per il processo $\mu^- \rightarrow e^- + \nu_\mu + \bar{\nu}_e$



$$\mu^-(p) \rightarrow e^-(p') + \nu_e(q) + \bar{\nu}_e(q') \quad (4.24)$$

L'unico diagramma di Feynman possibile è descritto in figura 4.4.

Calcoliamo l'ampiezza:

$$\mathcal{M} = \bar{\nu}_\mu(q) \left(-\frac{ig}{\sqrt{2}} \gamma^\rho \right) \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) \mu^-(p) (-i) \left(\frac{g_{\rho\sigma} - \frac{k_\rho k_\sigma}{m_W^2}}{k^2 - m_W^2} \right) e^-(p') \left(-\frac{ig}{\sqrt{2}} \gamma^\sigma \right) \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) \nu_e(q') \quad (4.25)$$

Le regole di Feynman sono le semplici derivate dall'eq. 4.14. Il momento trasferito $k = p - q$ è molto più piccolo della massa del bosone W^+ , perché al massimo può raggiungere la massa del muone. In questo caso l'ampiezza si può semplificare:

$$\mathcal{M} = \frac{-ig^2}{2m_W^2} \left[\bar{\nu}_\mu(q) \gamma^\rho \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) \mu^-(p) \right] \left[\bar{e}^-(p') \gamma_\rho \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) \nu_e(q') \right] \quad (4.26)$$

ed il calcolo del modulo quadro procede come al solito:

$$|\bar{\mathcal{M}}|^2 = \frac{g^4}{8m_W^4} \text{Tr} \left[\not{q} \gamma^\rho \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) (\not{p} + m_\mu) \gamma^\sigma \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) \right] \text{Tr} \left[\not{p}' \gamma_\rho \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) \not{q}' \gamma_\sigma \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) \right] \quad (4.27)$$

Dove abbiamo trascurato la massa dell'elettrone e dei neutrini. Per procedere ricorda le proprietà della γ^5 : vale $((1 - \gamma^5)/2)^2 = (1 - \gamma^5)/2$, ed inoltre $\{\gamma^\mu, \gamma^5\} = 0$. In questo modo otteniamo

$$|\bar{\mathcal{M}}|^2 = \frac{g^4}{8m_W^4} \text{Tr} \left[\not{q} \gamma^\rho \not{p} \gamma^\sigma \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) \right] \text{Tr} \left[\not{p}' \gamma_\rho \not{q}' \gamma_\sigma \left(\frac{1 - \gamma^5}{2} \right) \right] \quad (4.28)$$

cioè

$$|\bar{\mathcal{M}}|^2 = \frac{2g^4}{m_W^4} (q^\rho p^\sigma + q^\sigma p^\rho - (p \cdot q) g^{\sigma\rho} - i\epsilon^{\sigma\rho\alpha\beta} q_\alpha p_\beta) (q'_\rho p'_\sigma + q'_\sigma p'_\rho - (p' \cdot q') g_{\sigma\rho} - i\epsilon_{\sigma\rho\delta\lambda} q'^\delta p'^\lambda) \quad (4.29)$$

5

Esercizi del primo modulo

5.1 Scattering Bhabha

5.1.1 Calcolo dell'ampiezza

Si consideri il seguente processo in QED:

$$e^+(p_1) + e^-(p_2) \rightarrow e^+(k_1) + e^-(k_2) \quad (5.1)$$



Per prima cosa calcoliamo il modulo quadro non polarizzato, nel limite $m_e \rightarrow 0$. I diagrammi possibili sono due, il canale s ed il canale t. Calcoliamo le ampiezze:

$$\mathcal{M}_s = \bar{u}(k_2)(-ie\gamma^\mu)v(k_1) \left(\frac{-ig_{\mu\nu}}{s} \right) \bar{v}(p_1)(-ie\gamma^\nu)u(p_2) \quad (5.2)$$

$$= \frac{ie^2}{s} [\bar{u}(k_2)\gamma^\mu v(k_1)][\bar{v}(p_1)\gamma_\mu u(p_2)] \quad (5.3)$$

E similmente per il canale t,

Figura 5.1: I possibili diagrammi di feynman per lo scattering Bhabha (canale s e canale t)



$$\mathcal{M}_t = \bar{u}(k_2)(-ie\gamma^\mu)u(p_2) \left(\frac{-ig_{\mu\nu}}{t} \right) \bar{v}(p_1)(-ie\gamma^\nu)v(k_1) \quad (5.4)$$

$$= \frac{ie^2}{t} [\bar{u}(k_2)\gamma^\mu u(p_1)] [\bar{v}(p_1)\gamma_\mu v(k_1)] \quad (5.5)$$

Calcoliamo il modulo di ciascun diagramma, e successivamente l'interferenza:

$$|\bar{\mathcal{M}}_s|^2 = \frac{1}{4} \sum_{\text{pol}} \frac{e^4}{s^2} [\bar{u}(k_2)\gamma^\mu v(k_1)\bar{v}(k_1)\gamma^\nu u(k_2)] [\bar{v}(p_1)\gamma_\mu u(p_2)\bar{u}(p_2)\gamma_\nu v(p_1)] \quad (5.6)$$

$$= \frac{e^4}{4s^2} \text{Tr}(\not{k}_2\gamma^\mu\not{k}_1\gamma^\nu)\text{Tr}(\not{p}_1\gamma_\mu\not{p}_2\gamma_\nu) \quad (5.7)$$

$$= \frac{8e^4}{s^2} ((p_1 \cdot k_2)(k_1 \cdot p_2) + (p_1 \cdot k_1)(p_2 \cdot k_2)) \quad (5.8)$$

$$= \frac{2e^4}{s^2} (u^2 + t^2) \quad (5.9)$$

Usando simmetria di crossing,

$$|\mathcal{M}_t|^2 = \frac{2e^4}{t^2} (u^2 + s^2) \quad (5.10)$$

Il termine di interferenza è leggermente più complicato. Infatti,

$$\mathcal{M}_s \bar{\mathcal{M}}_t^* = \frac{e^4}{4st} \text{Tr}(\not{k}_2\gamma^\mu\not{k}_1\gamma^\nu\not{p}_1\gamma_\mu\not{p}_2\gamma_\nu) \quad (5.11)$$

Usando le proprietà delle matrici gamma di Dirac, possiamo semplificare la traccia:

$$\mathcal{M}_s \bar{\mathcal{M}}_t^* = -\frac{e^4}{2st} \text{Tr}(\not{k}_2\gamma^\mu\not{k}_1\not{p}_2\gamma_\mu\not{p}_1) \quad (5.12)$$

$$= -\frac{e^4}{2st} 4(P_2 \cdot k_1) \text{Tr}(\not{k}_2\not{p}_1) \quad (5.13)$$

$$= -\frac{8e^4}{st} (p_2 \cdot k_1)(k_2 \cdot p_1) = -\frac{2e^4 u^2}{st} \quad (5.14)$$

Troviamo quindi l'espressione per il modulo quadro non polarizzato,

$$|\bar{\mathcal{M}}|^2 = 2e^4 \left[\left(\frac{u^2 + t^2}{s^2} \right) + \left(\frac{u^2 + s^2}{t^2} \right) + \left(\frac{2u^2}{st} \right) \right] \quad (5.15)$$

dove l'interferenza è stata sottratta a causa della statistica di fermi.

5.1.2 Sezione d'urto

Possiamo ora calcolare i pezzi rimanenti della sezione d'urto. Inanzitutto la vogliamo scrivere in termini di E , l'energia di una delle particelle entranti, e di θ , l'angolo di scattering.

Ci mettiamo nel sistema di riferimento del centro di massa. Ricordando che le particelle sono tutte massless, i momenti possono essere presi nel modo seguente (si veda 5.2 per una rappresentazione grafica):

$$p_1 = (E, 0, 0, E), \quad p_2 = (E, 0, 0, -E) \quad (5.16)$$

$$k_1 = (E, E \sin \theta, 0, E \cos \theta), \quad k_2 = (E, -E \sin \theta, 0, -E \cos \theta) \quad (5.17)$$




Figura 5.2: Scattering $2 \rightarrow 2$ nel sistema del centro di massa.

Troviamo allora subito un'espressione di s, t, u in termini di E, θ :

$$s = 2p_1 \cdot p_2 = 4E^2 \quad (5.18)$$

$$t = -2p_1 \cdot k_1 = -2E^2(1 - \cos \theta) \quad (5.19)$$

$$u = -2p_1 \cdot k_2 = -2E^2(1 + \cos \theta) \quad (5.20)$$

Sostituiamo nel modulo quadro non polarizzato:

$$|\bar{\mathcal{M}}|^2 = 2e^4 \left[\frac{1 + \cos^2 \theta}{2} + \frac{4 + (1 + \cos \theta)^2}{(1 - \cos \theta)^2} - \frac{(1 + \cos \theta)^2}{1 - \cos \theta} \right] \quad (5.21)$$

Per assemblare la sezione d'urto, non restano che il fattore di flusso e lo spazio delle fasi. Il fattore di flusso è semplicemente

$$\Phi = \frac{1}{8E^2} \quad (5.22)$$

Mentre lo spazio delle fasi essendo le particelle finali massless è piuttosto semplice:

$$dPS^{(2)} = \frac{d^3 k_1 d^3 k_2}{(2\pi)^6 4E'_1 E'_2} (2\pi)^4 \delta(k_1 + k_2 - p_{in}) \quad (5.23)$$

Poiché siamo nel centro di massa, $\vec{p}_{in} = 0$, posso integrare immediatamente in d^3k_2 usando la delta e imponendo $\vec{k}_2 = -\vec{k}_1$, che impone il vincolo $E'_1 = E'_2 = E'$:

$$dPS^{(2)} = \frac{d^3k_1}{(2\pi)^2 4(E')^2} \delta(2E' - 2E) = \frac{|\vec{k}_1|^2 d|\vec{k}_1| d\Omega}{32\pi^2 (E')^2} \delta(E' - E) \quad (5.24)$$

Adesso posso usare l'ultima delta per eseguire l'integrazione in $d|\vec{k}_1|$,

$$dPS^{(2)} = \frac{d\varphi d\cos\theta}{32\pi^2} = \frac{d\cos\theta}{16\pi} \quad (5.25)$$

dove nell'ultimo passaggio ho direttamente integrato in $d\varphi$, siccome il modulo quadro dipende solo da $\cos\theta$. La sezione d'urto è quindi data da

$$\frac{d\sigma}{d\cos\theta} = \frac{1}{128\pi E^2} |\bar{\mathcal{M}}|^2 \quad (5.26)$$

$$= \frac{e^4}{64\pi E^2} \left[\frac{1 + \cos^2\theta}{2} + \frac{4 + (1 + \cos\theta)^2}{(1 - \cos\theta)^2} - \frac{(1 + \cos\theta)^2}{1 - \cos\theta} \right] \quad (5.27)$$

5.1.3 Analisi della singolarità per $\theta \rightarrow 0$

Chiaramente, la sezione d'urto 5.27 è singolare per $\theta \rightarrow 0$. Infatti, usando lo sviluppo del coseno, si vede chiaramente che il termine che deriva dal diagramma di canale t diverge come θ^4 :

$$\frac{4 + (1 + \cos\theta)^2}{(1 - \cos\theta)^2} \approx \frac{8}{(\theta^2/2)^2} = \frac{32}{\theta^4} \quad (5.28)$$

Possiamo chiederci se la divergenza rimane o viene curata nel caso in cui si recuperano le masse degli elettroni come finite. La divergenza rimane, perché anche considerando il contributo della massa dell'elettrone continua a valere $t(\theta = 0) = 0$. Infatti, sempre restando nel sistema di riferimento del centro di massa, gli impulsi possono essere presi nel modo seguente: (la cinematica resta sempre quella descritta in 5.2)

$$p_1 = (E, 0, 0, \sqrt{E^2 - m_e^2}), \quad p_2 = (E, 0, 0, -\sqrt{E^2 - m_e^2}) \quad (5.29)$$

$$k_1 = (E, \sqrt{E^2 - m_e^2} \sin\theta, 0, \sqrt{E^2 - m_e^2} \cos\theta), \quad k_2 = (E, -\sqrt{E^2 - m_e^2} \sin\theta, 0, -\sqrt{E^2 - m_e^2} \cos\theta) \quad (5.30)$$

possiamo allora calcolare

$$t = (p_1 - k_1)^2 = 2m_e^2 - 2E^2 + 2(E^2 - m_e^2) \cos\theta = (m_e^2 - E^2)(1 - \cos\theta) \quad (5.31)$$

Per essere sicuri che non ci siano cancellazioni dal numeratore, eseguiamo nuovamente il calcolo del diagramma di canale t, mantenendo le masse. L'ampiezza del diagramma non cambia:

$$\begin{aligned}
|\bar{\mathcal{M}}_t|^2 &= \frac{e^4}{4t^2} \sum_{\text{pol}} [\bar{u}(k_2) \gamma^\mu u(k_1) \bar{u}(k_1) \gamma^\nu u(k_2)] [\bar{v}(p_1) \gamma_\mu v(p_2) \bar{v}(p_2) \gamma_\nu v(p_1)] \\
&= \frac{e^4}{4t^2} \text{Tr}((\not{k}_2 + m_e) \gamma^\mu (\not{k}_1 + m_e) \gamma^\nu) \text{Tr}((\not{p}_1 - m_e) \gamma_\mu (\not{p}_2 - m_e) \gamma_\nu) \\
&= \frac{e^4}{4t^2} (m_e^2 \text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) + \text{Tr}(\not{k}_2 \gamma^\mu \not{k}_1 \gamma^\nu)) (m_e^2 \text{Tr}(\gamma_\mu \gamma_\nu) + \text{Tr}(\not{p}_1 \gamma_\mu \not{p}_2 \gamma_\nu))
\end{aligned} \tag{5.32}$$

In termini dei prodotti fra impulsi, si trova infine

$$\begin{aligned}
|\bar{\mathcal{M}}_t|^2 &= \frac{8e^4}{t^2} [(k_1 \cdot p_1)(k_2 \cdot p_2) + (k_1 \cdot p_2)(p_1 \cdot k_2) + (k_1 \cdot k_2)(m_e^2 - p_1 \cdot p_2) + \\
&\quad (p_1 \cdot p_2)(m_e^2 - k_1 \cdot k_2) + 2(m_e^2 - k_1 \cdot k_2)(m_e^2 - p_1 \cdot p_2)]
\end{aligned} \tag{5.33}$$

Otteniamo quindi le seguenti formule per gli invarianti:

$$p_1 \cdot p_2 = k_1 \cdot k_2 = 2E^2 - m_e^2 \tag{5.34}$$

$$p_1 \cdot k_1 = p_2 \cdot k_2 = E^2 - (E^2 - m_e^2) \cos \theta \tag{5.35}$$

$$p_1 \cdot k_2 = p_2 \cdot k_1 = E^2 + (E^2 - m_e^2) \cos \theta \tag{5.36}$$

$$\tag{5.37}$$

e possiamo sostituire nella formula del modulo quadro:

$$|\bar{\mathcal{M}}_t|^2 = \frac{8e^4}{4(E^2 - m_e^2)^2(1 - \cos \theta)^2} [(2E^2 - m_e^2)^2 + (E^2 + (E^2 - m_e^2) \cos \theta)^2 + 2m_e^4(1 + \cos \theta)] \tag{5.38}$$

E osserviamo che nessuna cancellazione cancella la divergenza per $\theta \rightarrow 0$.

5.1.4 Analisi del contributo di Z_0

Cosa succede se dalla QED passiamo alla teoria elettrodebole? La divergenza viene in qualche modo curata? La differenza è che in questo caso i diagrammi di Feynman diventano 4, perché oltre ai due canali s e t che scambiano un fotone, abbiamo anche i canali s e t che scambiano un bosone Z . Chiaramente, noi siamo interessati a cosa succede nei due diagrammi t , perché lì sta la divergenza. L'ampiezza del primo grafo non cambia, posso semplicemente sostituire $e = g \sin \theta_W$:

$$\mathcal{M}_t^\gamma = \frac{ig^2 \sin^2 \theta_W}{t} [\bar{u}(k_2) \gamma^\mu u(p_1)] [\bar{v}(p_1) \gamma_\mu v(k_1)] \tag{5.39}$$

Vorrei calcolare allora anche l'ampiezza $\mathcal{M}_t^Z$. Le regole di Feynman sono, per il vertice

$$\Gamma_{Zee} = \frac{-ig}{\cos \theta_W} \gamma^\mu \left[2 \sin^2 \theta_W - \left(\frac{1 - \gamma_5}{2} \right) \right] \quad (5.40)$$

e per il propagatore


$$D_{\mu\nu}(p) = -\frac{i}{t - m_Z^2} \left(g_{\mu\nu} + \frac{p_\mu p_\nu}{m_Z^2} \right) \approx \frac{ig_{\mu\nu}}{m_Z^2} \quad (5.41)$$

dove l'approssimazione vale perché siamo interessati al comportamento della sezione d'urto per $\theta \rightarrow 0$, dove anche $t \rightarrow 0$. Troviamo quindi che l'ampiezza è data da

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_t^Z &= \bar{v}(p_1) \frac{-ig}{\cos \theta_W} \gamma^\mu \left[2 \sin^2 \theta_W - \left(\frac{1 - \gamma_5}{2} \right) \right] v(k_1) \left(\frac{ig_{\mu\nu}}{m_Z^2} \right) \bar{u}(k_2) \frac{-ig}{\cos \theta_W} \gamma^\nu \left[2 \sin^2 \theta_W - \left(\frac{1 - \gamma_5}{2} \right) \right] u(p_2) \\ &= \frac{-ig^2}{\cos^2 \theta_W m_Z^2} \left[\bar{v}(p_1) \gamma^\mu \left(2 \sin^2 \theta_W - \left(\frac{1 - \gamma_5}{2} \right) \right) v(k_1) \right] \left[\bar{u}(k_2) \gamma_\mu \left(2 \sin^2 \theta_W - \left(\frac{1 - \gamma_5}{2} \right) \right) u(p_2) \right] \end{aligned} \quad (5.42)$$

Un diagramma di questo tipo è diverso da quello mediato dal fotone, perché la massa del bosone Z fa in modo che rimanga finito per $\theta \rightarrow 0$. Allo stesso tempo, rimanendo finito non può cancellare la divergenza discussa.

Figura 5.3: Funzione a 3 punti completa



5.2 Decadimento del muone

Il canale di decadimento $\mu^- \rightarrow e^- + \gamma$ è proibito nel modello standard. Consideriamo una ipotetica estensione, dove vi è una interazione mediata dalla lagrangiana $L = J^\mu A_\mu$, dove J^μ è una corrente conservata.

5.2.1 Scomposizione in termini di fattori di forma

Inanzitutto, la forma dell'elemento di matrice

$$\langle e^- | J^\mu | \mu^- \rangle \quad (5.43)$$

è vincolata dalle simmetrie della teoria. Queste sono la simmetria di lorentz, e la conservazione della corrente J^μ . Non è necessario richiedere che la teoria conserva la parità, perché il modello standard non lo fa per cominciare.

Procediamo quindi come abbiamo fatto per la QED. Sia $\langle e^- | J^\mu | \mu^- \rangle = \bar{u}_e(p_2) \Gamma^\mu u_\mu(p_1)$, così che la regola di feynman del vertice in figura 5.3 sia proprio $-i\Gamma^\mu$. La base di matrici 4x4 è data dalla solita

$$\{\mathbb{I}, \gamma^5, \gamma^\mu, \gamma^5 \gamma^\mu, \sigma^{\mu\nu}, \gamma^5 \sigma^{\mu\nu}\} \quad (5.44)$$

Come al solito, l'unico scalare da cui possono dipendere i coefficienti è q^2 ¹, e i vettori indipendenti sono $(p_1 + p_2)^\mu, q^\mu$. Tutte le strutture possibili permesse da lorentz sono:

$$\begin{aligned} \mathbb{I} &\rightarrow A_1(q^2)q^\mu, & A_2(q^2)(p_1 + p_2)^\mu \\ \gamma^5 &\rightarrow B_1(q^2)\gamma^5 q^\mu, & B_2(q^2)\gamma^5 (p_1 + p_2)^\mu \\ \gamma^\mu &\rightarrow C(q^2)\gamma^\mu \\ \gamma^5 \gamma^\mu &\rightarrow D(q^2)\gamma^5 \gamma^\mu \\ \sigma^{\mu\nu} &\rightarrow E_1(q^2)\sigma^{\mu\nu} q_\nu, & E_2(q^2)\sigma^{\mu\nu} (p_1 + p_2)_\nu \\ \gamma^5 \sigma^{\mu\nu} &\rightarrow G_1(q^2)\gamma^5 \sigma^{\mu\nu} q_\nu, & G_2(q^2)\gamma^5 \sigma^{\mu\nu} (p_1 + p_2)_\nu \end{aligned} \quad (5.45)$$

L'identità di Gordon permette di scrivere $(p_1 + p_2)^\mu$ in termini di $\gamma^5, \sigma^{\mu\nu}$, quindi possiamo già prendere $A_2(q^2) = B_2(q^2) = E_2(q^2) = G_2(q^2) = 0$.

¹Come in QED, gli scalari di Lorentz che possiamo costruire sono 3, $q^2, p^2, p \cdot q$. D'altra parte, $p \cdot q = (p_1^2 - p_2^2 = 0)$, e q^2 e p^2 sono dipendenti l'uno dall'altro, quindi possiamo scegliere q^2 come variabile indipendente.

La conservazione della corrente J^μ richiede che l'elemento di matrice rispetti l'identità di Ward, $q_\mu M^\mu = 0$. Vediamo quindi quali di queste si annullano automaticamente se contratte:

$$\begin{aligned}\mathbb{I} &\rightarrow q^\mu q_\mu \neq 0 \\ \gamma^\mu &\rightarrow \bar{u}_e(\not{p}_1 - \not{p}_2)u_\mu = (m_\mu - m_e)\bar{u}_e u_\mu \neq 0 \\ \sigma^{\mu\nu} &\rightarrow \sigma^{\mu\nu} q_\mu q_\nu = 0\end{aligned}\tag{5.46}$$

In particolare, quindi, la conservazione della corrente impone i seguenti legami tra i fattori di forma:

$$\begin{aligned}A_1(q^2) &= \frac{(m_e - m_\mu)C(q^2)}{q^2} \\ B_1(q^2) &= \frac{(m_e + m_\mu)D(q^2)}{q^2}\end{aligned}\tag{5.47}$$

Ora, se ci interessa che il fotone sia on-shell, l'unico modo per cui nessuna dei due fattori di forma sia singolare è che siano entrambi nulli. Concludiamo, che se il fotone è on-shell ($q^2 = 0$), allora la forma più generale del vertice è data da

$$\Gamma^\mu = i(f_1(0) + f_2(0)\gamma^5)\sigma^{\mu\nu}q_\nu\tag{5.48}$$

Il fattore i è stato estratto dai fattori di forma, in modo tale che le funzioni f_1, f_2 siano funzioni reali. Possiamo anche velocemente ricavare la dimensione in massa di questi fattori di forma. Poichè la corrente entra nella lagrangiana dal termine di interazione $J^\mu A_\mu$, troviamo che $[J^\mu] = m^3$. D'altra parte, sappiamo che $[u] = m^{3/2}$, da cui segue $[\Gamma^\mu] = m^0$, e quindi $[f] = m^{-1}$.

5.2.2 Larghezza di decadimento

Ora che abbiamo la forma del vertice, possiamo scrivere la larghezza di decadimento in termine dei fattori di forma. Inanzitutto, devo calcolare l'ampiezza del processo:

$$\mathcal{M}(\mu^- \rightarrow e^- \gamma) = \bar{u}_e^s(p_2)(-i\Gamma^\mu)u_\mu^{s'}(p_1)\epsilon_\mu^*(\lambda, q)\tag{5.49}$$

L'espressione per il modulo quadro non polarizzato è dunque

$$\begin{aligned}|\bar{\mathcal{M}}|^2 &= -\frac{1}{2}g_{\mu\nu} \sum_{s,s'} \left[\bar{u}_e^s(p_2)(f_1(0) + f_2(0)\gamma^5)\sigma^{\mu\rho}q_\rho u_\mu^{s'}(p_1) \right] \left[\bar{u}_\mu^{s'}(p_1)\sigma^{\nu\lambda}(f_1(0) - f_2(0)\gamma^5)q_\lambda u_e^s(p_2) \right] \\ &= -\frac{1}{2}\text{Tr} \left[\not{p}_2(f_1(0) + f_2(0)\gamma^5)\sigma^{\mu\rho}q_\rho(\not{p}_1 + m_\mu)\sigma_{\mu\lambda}(f_1(0) - f_2(0)\gamma^5)\not{q}^\lambda \right]\end{aligned}\tag{5.50}$$

Prima di calcolare la traccia, devo mostrare come ho calcolato il complesso coniugato della linea fermionica: così come vale $(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0$, non è difficile convincersi che vale $(\sigma^{\mu\nu})^\dagger = \gamma^0\sigma^{\mu\nu}\gamma^0$. A questo punto la parte $\propto f_1$ funziona come una linea fermionica standard:

$$\begin{aligned}
[\bar{u}_e(p_2)\sigma^{\mu\rho}u_\mu(p_1)]^* &= [(u_\mu(p_1))^\dagger\gamma^0\sigma^{\mu\rho}\gamma^0(\bar{u}_e(p_2)^\dagger)] \\
&= [\bar{u}_\mu(p_2)\sigma^{\mu\rho}u_e(p_1)]
\end{aligned} \tag{5.51}$$

Invece, per la parte $\propto f_2$ si ottiene, ricordando che $(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5$,

$$u_\mu^\dagger(p_1)\gamma^0\sigma^{\mu\nu}\gamma^0\gamma^5\gamma^0u_e(p_1) = -\bar{u}_\mu(p_1)\sigma^{\mu\nu}\gamma^5u_e(p_2) = -\bar{u}_\mu(p_1)\gamma^5\sigma^{\mu\nu}u_e(p_2) \tag{5.52}$$

Dove abbiamo prima anticommutato γ^5, γ^0 , e poi commutato $\gamma^5, \sigma^{\mu\nu}$.

Torniamo quindi al calcolo della traccia. Inanzitutto, la parte $\propto m_\mu$ si annulla. Infatti:

1. I termini $\propto f_1^2, f_2^2$ sono proporzionali alla traccia di 5 matrici di Dirac.
2. Il termine $\propto f_1f_2$ sono proporzionali alla traccia di 5 matrici di Dirac volte una γ^5 .

Dobbiamo quindi calcolare

$$|\bar{\mathcal{M}}|^2 = -\frac{q_\rho q^\lambda}{2} \text{Tr}[\not{p}_2(f_1 + f_2\gamma^5)\sigma^{\mu\rho}\not{p}_1\sigma_{\mu\lambda}(f_1 - f_2\gamma^5)] \tag{5.53}$$

Espando le matrici $\sigma^{\mu\nu}$:

$$\begin{aligned}
|\bar{\mathcal{M}}|^2 &= \frac{q_\rho q^\lambda}{8} [\text{Tr}(\not{p}_2(f_1 + f_2\gamma^5)\gamma^\mu\gamma^\rho\not{p}_1\gamma_\mu\gamma_\lambda(f_1 - f_2\gamma^5)) \\
&\quad - \text{Tr}(\not{p}_2(f_1 + f_2\gamma^5)\gamma^\rho\gamma^\mu\not{p}_1\gamma_\mu\gamma_\lambda(f_1 - f_2\gamma^5)) \\
&\quad - \text{Tr}(\not{p}_2(f_1 + f_2\gamma^5)\gamma^\mu\gamma^\rho\not{p}_1\gamma_\lambda\gamma_\mu(f_1 - f_2\gamma^5)) \\
&\quad + \text{Tr}(\not{p}_2(f_1 + f_2\gamma^5)\gamma^\rho\gamma^\mu\not{p}_1\gamma_\lambda\gamma_\mu(f_1 - f_2\gamma^5))]
\end{aligned} \tag{5.54}$$

Possiamo usare ora le formule

$$\begin{aligned}
\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma_\mu &= -2\gamma^\sigma\gamma^\rho\gamma^\nu \\
\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma_\mu &= 4g^{\nu\rho} \implies \gamma^\mu\gamma^\nu\not{k}\gamma_\mu = 4k^\nu
\end{aligned} \tag{5.55}$$

E otteniamo

$$\begin{aligned}
|\bar{\mathcal{M}}|^2 &= \frac{q_\rho q^\lambda}{8} [4\text{Tr}(P_1^\rho\not{p}_2(f_1 + f_2\gamma^5)\gamma_\lambda(f_1 - f_2\gamma^5)) \\
&\quad + 2\text{Tr}(\not{p}_2(f_1 + f_2\gamma^5)\gamma^\rho\not{p}_1\gamma_\lambda(f_1 - f_2\gamma^5)) \\
&\quad + 2\text{Tr}(\not{p}_2(f_1 + f_2\gamma^5)\gamma_\lambda\not{p}_1\gamma^\rho(f_1 - f_2\gamma^5))
\end{aligned}$$

Figura 5.4: Cinematica del decadimento

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{p}_1 = (m_\mu, 0, 0, 0) & & \mathbf{q} = (m_\mu/2, 0, 0, -m_\mu/2) \quad \bullet \quad \mathbf{p}_2 = (m_\mu/2, 0, 0, m_\mu/2) \\ \bullet & & \xleftarrow{\hspace{1.5cm}} \hspace{0.5cm} \hspace{0.5cm} \xrightarrow{\hspace{1.5cm}} \end{array}$$

$$+ 4\text{Tr}(P_{1\lambda}\not{p}_2(f_1 + f_2\gamma^5)\gamma^\rho(f_1 - f_2\gamma^5)) \quad (5.56)$$

I termini $\propto f_1 f_2$ si cancellano perché la traccia di due matrici di Dirac volte una γ^5 è sempre zero. Usando invece che le γ^5 anticommutano con le altre matrici di Dirac, si possono facilmente eliminare:

$$|\bar{\mathcal{M}}|^2 = \frac{q_\rho q^\lambda}{4} (f_1^2 + f_2^2) \text{Tr}[2p_1^\rho \not{p}_2 \gamma_\lambda + \not{p}_2 \gamma^\rho \not{p}_1 \gamma_\lambda + \not{p}_2 \gamma_\lambda \not{p}_1 \gamma^\rho] \quad (5.57)$$

Valutando le tracce con le solite formule si trova

$$|\bar{\mathcal{M}}|^2 = 4q_\rho q^\lambda (f_1^2 + f_2^2) [p_1^\rho p_{2\lambda} + p_1 \lambda p_2^\rho] = 8(f_1^2 + f_2^2) (m_\mu^2 - p_1 \cdot p_2) (p_1 \cdot p_2) \quad (5.58)$$

Usando $q^2 = m_\mu^2 - 2p_1 \cdot p_2 = 0$, si trova subito $p_1 \cdot p_2 = m_\mu^2/2$, da cui ricaviamo infine

$$|\bar{\mathcal{M}}|^2 = 2(f_1^2 + f_2^2) m_\mu^4 \quad (5.59)$$

La stessa relazione può essere ottenuta anche con considerazioni cinematiche (figura 5.4). Mettendoci nel SR del CM, possiamo prendere i momenti come (essendo sia q sia p_2 quadri-vettrici nulli)

$$p_1 = (m_\mu, 0, 0, 0), \quad q = (m_\mu/2, 0, 0, -m_\mu/2), \quad p_2 = (m_\mu/2, 0, 0, m_\mu/2) \quad (5.60)$$

Allora è chiaro che $p_1 \cdot p_2 = \frac{m_\mu^2}{2}$.

Avendo il modulo quadro, possiamo assemblare la larghezza di decadimento differenziale. Questa è data da

$$d\Gamma = \frac{1}{2m_\mu} |\bar{\mathcal{M}}|^2 dPS^{(2)} \quad (5.61)$$

L'elemento differenziale di spazio delle fasi $dPS^{(2)}$ è lo stesso calcolato per lo scattering Bhabha, perché anche in questo caso abbiamo due particelle massless nello stato finale.

$$dPS^{(2)} = \frac{d\Omega}{32\pi^2} \quad (5.62)$$

Segue quindi

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{2(f_1^2 + f_2^2)m_\mu^4}{(2m_\mu)(32\pi^2)} \implies \Gamma = \int \frac{d\Gamma}{d\Omega} d\Omega = \frac{m_\mu^3(f_1^2 + f_2^2)}{8\pi} \quad (5.63)$$

5.2.3 Limiti sui fattori di forma

Durante l'anno abbiamo calcolato la larghezza di decadimento β del muone, che ricordiamo:

$$\Gamma(\mu^- \rightarrow e^- \nu_\mu \bar{\nu}_e) = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^2} \quad (5.64)$$


Da cui otteniamo una formula per il branching ratio:

$$\text{BR}(\mu^- \rightarrow e^- \gamma) = \frac{\Gamma(\mu^- \rightarrow e^- \gamma)}{\Gamma(\mu^- \rightarrow e^- \nu_\mu \bar{\nu}_e)} = \left(\frac{(f_1^2 + f_2^2)m_\mu^3}{8\pi} \right) \left(\frac{192\pi^2}{G_F^2 m_\mu^5} \right) = \frac{24\pi(f_1^2 + f_2^2)}{G_F^2 m_\mu^2} < 2.2 \cdot 10^{-13} \quad (5.65)$$

Possiamo definire $F = \sqrt{f_1^2 + f_2^2}$, e applicare dei limiti a questo fattore di forma, conoscendo $G_F = 1.112 \cdot 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}$ e $m_\mu = 106 \text{ MeV} = 0.106 \text{ GeV}$. Si ottiene così

$$F = \frac{G_F m_\mu}{\pi} \sqrt{\frac{\text{BR}}{24}} < 3.59 \cdot 10^{-14} \text{ GeV} \quad (5.66)$$

Figura 5.5: Contributo ad 1 loop della funzione a due punti del campo spinoriale



5.3 Rinormalizzazione nella teoria di Yukawa

Si consideri una teoria di un campo fermionico e un campo scalare che interagiscono tramite Yukawa:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{D} - m_{f,0})\psi + \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)(\partial^\mu\phi) - \frac{1}{2}M_0^2\phi^2 - \lambda_0\bar{\psi}\psi\phi \quad (5.67)$$

5.3.1 Campo fermionico

Vogliamo determinare i controtermini di massa e di funzione d'onda per il campo fermionico. Per fare questo, consideriamo la correzione ad 1 loop al propagatore fermionico (figura 5.5), di cui indicheremo il diagramma amputato con $-i\Sigma(p)$.

Infatti, l'espressione del propagatore risommato è

$$\frac{D(p)}{1 - i\Sigma(p)D(p)} = \frac{i}{\not{p} - m_{f,0} + i\epsilon + \Sigma(p)} \quad (5.68)$$

Vediamo quindi che è necessario shiftare la massa bare nella massa rinormalizzata $m_f = m_{f,0} - \Sigma(p)$.

Veniamo quindi al calcolo del controtermine: usando la semplice regola di feynman per il vertice a 3 che deriva dalla lagrangiana, troviamo che l'espressione è data da

$$i\Sigma(p) = \frac{\lambda^2}{2} \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \left[\frac{(\not{p} + \not{q} + m_f)}{(p+q)^2 - m_f^2} \right] \left(\frac{1}{q^2 - M^2} \right) \quad (5.69)$$

Separiamo il contributo scalare e tensoriale:

$$\begin{aligned} i\Sigma(p) &= i\Sigma_1(p) + i\Sigma_2(p), \quad i\Sigma_1(p) = \frac{\lambda^2 m_{0,f}}{2} \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{1}{[(p+q)^2 - m_{f,0}^2][q^2 - M^2]} = m_{0,f} I_1 \\ i\Sigma_2(p) &= i\Sigma_2^\mu(p) \gamma_\mu = \frac{\lambda^2 \gamma_\mu}{2} \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{p^\mu + q^\mu}{[(p+q)^2 - m_{f,0}^2][q^2 - M^2]} \end{aligned} \quad (5.70)$$

Il termine più complicato è certamente Σ_2^μ , che si può ulteriormente spezzare in due pezzi:

$$\begin{aligned}\Sigma_2^\mu(p) &= \Sigma_{2,1}^\mu(p) + \Sigma_{2,2}^\mu(p), \quad \Sigma_{2,1}^\mu = p^\mu I_1 \\ \Sigma_{2,2}^\mu(p) &= \frac{\lambda^2}{2} \int \frac{d^4 q}{(2\pi^4)} \frac{q^\mu}{[(p+q)^2 - m_{f,0}^2][q^2 - M^2]} = p^\mu \Sigma(p)_{2,2}\end{aligned}\quad (5.71)$$

dove l'ultima uguaglianza segue da considerazioni tensoriali. Lavoriamo ancora su $\Sigma^\mu(p)_{2,2}$, introducendo i parametri di Feynman:

$$\begin{aligned}\Sigma^\mu(p)_{2,2} &= \frac{\lambda^2}{2} \int_0^1 dx \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{q^\mu}{[x((p+q)^2 - m_{0,f}^2) + (1-x)(q^2 - M^2)]^2} \\ &= \frac{\lambda^2}{2} \int_0^1 dx \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{q^\mu}{(q+xp)^2 + \underbrace{x(1-x)p^2 + x(M^2 - m_{0,f}^2 - M^2)}_{=:-\Delta(x)}}\end{aligned}\quad (5.72)$$

Cambiamo allora la variabile di integrazione, $q \rightarrow \ell = q + xp$. L'integrale diventa semplicemente

$$\Sigma^\mu(p)_{2,2} = \int_0^1 dx \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^\mu - xp^\mu}{[\ell^2 + \Delta(x)]^2} = -\frac{p^\mu \lambda^2}{2} \int x dx \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\ell^2 - \Delta(x)]^2} \quad (5.73)$$

Dove abbiamo usato che per parità le parti dell'integrali $\propto \ell^\mu$ sono nulle, perché il resto dell'espressione dipende solamente da ℓ^2 . Possiamo quindi fare la rotazione di Wick e passare a d dimensioni:

$$\Sigma^\mu(p)_{2,2} = -\frac{p^\mu \lambda^2}{2} \int_0^1 x dx \int d\Omega_{d-1} \int \frac{d\ell_E \ell_E^{d-1}}{(2\pi)^d (\ell_E^2 + \Delta(x))^2} \quad (5.74)$$

A parte l'integrale rispetto ad x , tutti gli altri pezzi sono dei risultati ben noti. In particolare vale:

$$\int d\Omega_{d-1} = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}, \quad \int \frac{d\ell_E \ell_E^{d-1}}{(2\pi)^d (\ell_E^2 + \Delta(x))^2} = \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \Delta(x)^{(d/2-2)} \frac{\Gamma(2-d/2)}{\Gamma(2)} \quad (5.75)$$

Quindi, troviamo

$$\Sigma_{2,2}^\mu(p) = -\frac{p^\mu \lambda^2}{\Gamma(d/2)\Gamma(2)} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4^{d/2})} \int_0^1 x \Delta(x)^{(d/2-2)} \quad (5.76)$$

5.3.2 Campo scalare

Come nel caso del fermione, per prima cosa dobbiamo calcolare la self-energia dello scalare. Il diagramma rilevante è quello in figura 5.8. Le regole di Feynman sono quelle già citate, ricordando che in presenza di un loop fermionico, dobbiamo moltiplicare per -1 . Si trova allora l'ampiezza del diagramma:

$$i\Sigma(p) = (-i\lambda)^2 \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \text{Tr} \left[\frac{(\not{p} + \not{q} + m_e)}{(p+q)^2 - m_e^2} \frac{(\not{q} + m_e)}{q^2 - m_e^2} \right] \quad (5.77)$$

Ricordando che $\text{Tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) = (1/2)\text{Tr}(\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}) = 4g^{\mu\nu}$, troviamo quindi

$$i\Sigma(p) = -4\lambda^2 \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{m_e^2 + (p+q) \cdot q}{[(p+q)^2 - m_e^2][q^2 - m_e^2]} \quad (5.78)$$

Come al solito, introduciamo i parametri di Feynman:

$$\begin{aligned} i\Sigma(p) &= -4\lambda^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{m_e^2 + (p+q) \cdot q}{[xp^2 + 2xp \cdot q + q^2 - m_e^2 + x^2 p^2 - x^2 p^2]^2} \\ &= -4\lambda^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{m_e^2 + (p+q) \cdot q}{[(q+xp)^2 - \Delta(x)]^2}, \quad \Delta(x) = m_e^2 - x(1-x)p^2 \end{aligned} \quad (5.79)$$

Faccio il solito cambio della variabile di integrazione $q \rightarrow \ell = q + xp$:

$$i\Sigma(p) = -4\lambda^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{m_e^2 + (\ell - xp) \cdot (\ell + (1-x)p)}{[\ell^2 - \Delta(x)]^2} \quad (5.80)$$

Per parità, contribuiscono all'integrale solo le potenze pari di ℓ ,

$$\begin{aligned} i\Sigma(p) &= -4\lambda^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{m_e^2 + \ell^2 - x(1-x)p^2}{[\ell^2 - \Delta(x)]^2} \\ &= -4\lambda^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2 + \Delta(x)}{[\ell^2 - \Delta(x)]^2} \end{aligned} \quad (5.81)$$

Per terminare il calcolo devo dunque calcolare due integrali,

$$\begin{aligned} i\Sigma(p) &= -4\lambda^2 \left[\int_0^1 dx \Delta(x) I_1(x) + \int_0^1 dx I_2(x) \right], \\ I_1(x) &= \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4 [\ell^2 - \Delta(x)]^2}, \quad I_2(x) = \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4 [\ell^2 - \Delta(x)]^2} \ell^2 \end{aligned} \quad (5.82)$$

Ci occupiamo ora del calcolo di questi integrali. Innanzitutto eseguiamo la rotazione di Wick:

$$I_1(x) = -i \int \frac{d^4 \ell_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\ell^2 + \Delta(x)]^2} \quad (5.83)$$

Passando ad uno spaziotempo di dimensione generica d ,

$$I_1 = -i \int \left(\int d\Omega_d \right) \frac{d\ell_E}{(2\pi)^4} \frac{\ell_E^{d-1}}{[\ell_E^2 + \Delta(x)]^2}, \quad I_2 = i \int \left(\int d\Omega_d \right) \frac{d\ell_E}{(2\pi)^4} \frac{\ell_E^{d+1}}{[\ell_E^2 + \Delta(x)]^2} \quad (5.84)$$

Questi sono integrali di funzioni razionali, e la loro soluzione è ben nota. Basta effettuare la sostituzione

$$\ell \rightarrow y = \frac{\Delta}{\Delta + \ell_E^2}, \quad \ell_E^2 = \frac{\Delta}{y} - \Delta, \quad d(\ell_E^2) = -\frac{\Delta}{y^2} dy \quad (5.85)$$

Sostituendo, troviamo

$$\begin{aligned} I_1 &= -\frac{i}{2} \int d\Omega_{d-1} \int_0^1 \frac{\Delta}{y^2} dy \left(\frac{y}{\Delta} \right)^2 \Delta^{\frac{d-2}{2}} \left(\frac{1-y}{y} \right)^{\frac{d-2}{2}} \\ &= -\frac{i\Delta^{\frac{d-4}{2}}}{2} \int d\Omega_{d-1} \int_0^1 dy y^{-\frac{d-2}{2}} (1-y)^{\frac{d-2}{2}} \end{aligned} \quad (5.86)$$

Ricorda la formula integrale per la funzione β di Eulero, e la sua relazione con la Γ di Eulero,

$$\beta(\alpha, \gamma) = \int_0^1 dx x^{\alpha-1} (1-x)^{\gamma-1} = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha+\gamma)} \quad (5.87)$$

Otteniamo quindi

$$I_1 = -\frac{i\Delta^{\frac{d-4}{2}}}{2} \int d\Omega_{d-1} \Gamma(-d/2) \Gamma(d/2) \quad (5.88)$$

Ricordando la formula dell'area della sfera,

$$\int d\Omega_{d-1} = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \quad (5.89)$$

Si trova infine

$$I_1 = -i \frac{\Delta^{\frac{d-4}{2}}}{2\pi^{d/2}} \Gamma(-d/2) \quad (5.90)$$

Usando infine $d = 4 - 2\epsilon$, troviamo

$$I_1 = -\frac{i}{2^4\pi^2\Delta^\epsilon}\Gamma(\epsilon) \quad (5.91)$$

Come ci aspettavamo, questo ha una parte finita e una parte divergente, un polo semplice in ϵ , che è evidente se sviluppiamo la Gamma di eulero: $\Gamma(\epsilon) = 1/\epsilon + \gamma_E + o(\epsilon)$.

Similmente si calcola I_2 :

$$\begin{aligned} I_2(x) &= -\frac{i}{2} \frac{\Delta^{\frac{d-2}{2}}}{(2\pi)^d} \int d\Omega_{d-1} \int dy y^{-d/2} (1-y)^{d/2} \\ &= -i \frac{\Delta^{\frac{d-2}{2}}}{2(2\pi)^d} \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \frac{\Gamma(1-d/2)\Gamma(1+d/2)}{\Gamma(2)} \end{aligned} \quad (5.92)$$

Usando $\Gamma(n) = (n-1)!$, si trova infine

$$I_2(x) = -\frac{i\Delta}{2^3\pi^2\Delta^\epsilon}\Gamma(-1+\epsilon) \quad (5.93)$$

La self energia completa è quindi data da

$$\begin{aligned} -i\Sigma(p) &= 4i\lambda^2(4\pi)^\epsilon \mu^{2\epsilon} \int_0^1 dx \left(\frac{\Delta\Gamma(-1+\epsilon)}{8\pi^2\Delta^\epsilon} + \frac{\Delta\Gamma(\epsilon)}{16\pi^2\Delta^\epsilon} \right) \\ &= \frac{i\lambda^2}{2\pi^2} \int_0^1 dx \left(\frac{(4\pi)\mu^2}{\Delta} \right)^\epsilon \Delta(\Gamma(-1+\epsilon) + \Gamma(\epsilon)) \end{aligned} \quad (5.94)$$

Sviluppiamo l'argomento dell'integrale per $\epsilon \rightarrow 0$: abbiamo

$$\left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right)^\epsilon = 1 + \epsilon \ln(4\pi\mu^2/\Delta) + o(\epsilon^2), \quad \Gamma(-1+\epsilon) = -1/\epsilon + \gamma_E - 1, \quad \Gamma(\epsilon) = 1/\epsilon + \gamma_E \quad (5.95)$$

Così da ottenere

$$-i\Sigma(p) = -\frac{i\lambda^2}{2\pi^2} \int_0^1 dx \Delta \left[\frac{1}{2\epsilon} + 1 - \frac{\gamma_E}{2} + \frac{1}{2} \log(4\pi\mu^2/\Delta) \right] \quad (5.96)$$

La parte divergente è quindi data da

$$\Sigma(p) = \frac{\lambda^2}{4\pi^2\epsilon} \int_0^1 dx \Delta = \frac{\lambda^2}{4\pi^2\epsilon} \int_0^1 dx m_{0,f}^2 - x(1-x)p^2$$

$$= \frac{m_{f,0}^2 \lambda^2}{4\pi^2 \epsilon} - \frac{p^2 \lambda^2}{24\pi^2 \epsilon} \quad (5.97)$$

Avendo l'espressione per la self energia, il calcolo dei controtermini per la massa e la funzione d'onda è immediato. Infatti, considera l'espressione per il propagatore risommato: (se si è scritto $M_0^2 \phi^2 = (M^2 + \delta M^2) \phi^2$)

$$\begin{aligned} & D(p) + D(p)(i\Sigma(p))D(p) + D(p)(i\Sigma(p))D(p)(-i\Sigma(p))D(p) + \dots \\ &= D(p)[(i\Sigma(p)D(p)) + (i\Sigma(p)D(p))^2 + \dots] \\ &= \frac{D(p)}{1 - i\Sigma(p)D(p)} = \frac{i}{(p^2 - M^2 - \delta M^2 + i\epsilon)(1 + \frac{\Sigma(p)}{p^2 - M^2 - \delta M^2 + i\epsilon})} \\ &= \frac{i}{p^2 - M^2 - \delta M^2 + \Sigma(p)} \end{aligned} \quad (5.98)$$

Ora, ci interessa che il propagatore vicino a $p^2 = M^2$ abbia un polo, con il residuo della teoria libera. Cioè richiediamo che

$$\frac{i}{p^2 - M^2 - \delta M^2 + \Sigma(p)} \rightarrow \frac{i}{p^2 - M^2 + i\epsilon}, \quad p^2 \rightarrow M^2 \quad (5.99)$$

Per farlo sviluppa in serie Σ vicino ad M^2 : $\Sigma(p^2) = \Sigma(M^2) + (p^2 - M^2)\Sigma'(p^2) + \frac{1}{2}(p^2 - M^2)^2\Sigma''(p^2) + \dots$. Il propagatore diventa

$$\frac{i}{p^2 - M^2 - \delta M^2 + \Sigma(M^2) + (p^2 - M^2)\Sigma'(p) + \frac{1}{2}(p^2 - M^2)^2\Sigma''(p^2) + \dots} \quad (5.100)$$

Scegli $\delta M^2 = \Sigma(p^2)$, e ottieni

$$\frac{i}{(p^2 - M^2)(1 + \Sigma'(p^2) + \frac{1}{2}(p^2 - M^2)\Sigma''(p^2))} \rightarrow \frac{iZ_\varphi}{p^2 - M^2 + i\epsilon}, \quad p^2 \rightarrow m^2, \quad Z_\varphi = \frac{1}{1 + \Sigma'(p^2)} \quad (5.101)$$


Dai nostri calcoli segue dunque

$$\Sigma(M^2) = \frac{\lambda_0^2}{4\pi^2 \epsilon} (M^2/6 - m_{0,f}^2), \quad \Sigma'(p^2) = \frac{\lambda_0^2}{24\pi^2 \epsilon} \quad (5.102)$$

5.3.3 Costante di accoppiamento

Considera le quattro correzioni ad un loop della funzione a 3 punti della teoria (figura 5.6). Scriviamo la costante di accoppiamento "nuda" in termini di quella fisica e di un controtermine: $\lambda_0 = \lambda + \delta\lambda$.

Figura 5.6: I contributi al secondo ordine perturbativo al vertice $\bar{\psi}\psi\phi$



Vogliamo ora calcolare il controtermine, usando la richiesta che in una particolare cinematica (dove tutte le particelle esterne sono on-shell) l'accoppiamento coincida con quello misurato.

In formule, la nostra *condizione di rinormalizzazione* sarà

$$\lim_{p_1^2, p_2^2, q^2 \rightarrow 0} \Gamma_{\bar{\psi}(p_1), \psi(p_2), \phi(q)} = -i\lambda \quad (5.103)$$

Non dobbiamo però tenere conto di tutti i diagrammi: i diagrammi che contengono la self energia non sono 1PI. Chiamiamo quindi $iA(p_1^2, q_1^2, p_2^2)$ l'ampiezza del diagramma ad un loop da calcolare. La condizione di rinormalizzazione si legge ora

$$-i\lambda - i\delta\lambda + iA(p_1^2 = m^2, p_2^2 = m^2, q^2 = M^2) = -i\lambda \implies \delta\lambda = A(m^2, m^2, M^2) \quad (5.104)$$

Concentriamoci allora sulla determinazione di A . Vale ².

$$\begin{aligned} iA(p_1^2, p_2^2, q^2) &= (-i\lambda)^3 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[\frac{i(\not{k} + \not{p}_1 + m)}{(k + p_1)^2 - m^2} \right] \left[\frac{i(\not{k} - \not{p}_2 + m)}{(k - p_2)^2 - m^2} \right] \left[\frac{i}{k^2 - M^2} \right] \\ &= -\lambda^3 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{(\not{k} + \not{p}_1 + m)(\not{k} - \not{p}_2 + m)}{[k^2 + 2k \cdot p_1][k^2 - 2k \cdot p_2][k^2 - M^2]} \end{aligned} \quad (5.105)$$

Notiamo che ho tre denominatori, quindi è necessario usare due parametri di Feynman. In particolare usiamo la formula

$$\frac{1}{ABC} = 2 \int_0^1 dx \int_0^1 dy \frac{1}{[xA + yB + (1 - x - y)C]^3} \quad (5.106)$$

²Abbiamo scelto i momenti nel loop in modo tale che si semplificassero meglio i denominatori

Scegli $C = k^2 - M^2$, $A = k^2 + 2k \cdot p_1$, $B = k^2 - 2k \cdot p_2$. Il denominatore diventa:

$$\begin{aligned} \text{Den} &= 2xk \cdot p_1 - 2yk \cdot p_2 + k^2 - M^2 - xM^2 - yM^2 \\ &= (k + xp_1 - yp_2)^2 - \underbrace{[(xp_1 - yp_2)^2 + (1 - x - y)M^2]}_{=\Delta} \end{aligned} \quad (5.107)$$

L'ampiezza è quindi data da

$$iA = -\lambda^3 \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{(\not{k} + \not{p}_1 + m)(\not{k} - \not{p}_2 + m)}{[(k + xp_1 - yp_2)^2 - \Delta]^3} \quad (5.108)$$

Facciamo quindi la sostituzione $k \rightarrow \ell = k + xp_1 - yp_2$, e otteniamo così

$$iA = -\lambda^3 \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{(\ell + (x+1)p_1 - yp_2 + m)(\ell + xp_1 - (y+1)p_2 + m)}{[\ell^2 - \Delta]^3} \quad (5.109)$$

Teniamo solo i contributi di ordine 0 e 2 in ℓ , che non si cancellano per parità:

$$\begin{aligned} iA &= -\lambda^3 \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2 + x(x+1)m^2 - (x+1)(y+1)p_1p_2 + m(x+1)p_1}{[\ell^2 - \Delta]^3} \\ &\quad + \frac{-xyp_2p_1 + y(y+1)m^2 - ym p_2 + xmp_1 - (y+1)m p_2 + m^2}{[\ell^2 - \Delta]^3} \end{aligned} \quad (5.110)$$

Che prende la forma

$$\begin{aligned} iA &= -\lambda^3 \int_0^1 dx \int_0^1 dy (I_1 + (m^2(1 + x(x+1) + y(y+1)) + \\ &\quad m((2x+1)p_1 - (2y+1)p_2 - ((x+1)(y+1)p_1p_2 + xyp_2p_1))I_2) \end{aligned} \quad (5.111)$$

Se abbiamo definito

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2}{[\ell^2 - \Delta]^3} \\ &= -i \int \frac{d^4\ell_E}{(2\pi)^4} \frac{\ell_E^2}{[\ell_E^2 + \Delta]^3} = -\frac{i\Gamma(\epsilon)}{(4\pi)^2} \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right)^\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} -\frac{i}{16\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} + \gamma_E + \log \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right) \right] \end{aligned} \quad (5.112)$$

e similmente

$$I_2 = \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\ell^2 - \Delta]^3} = i \int \frac{d^4\ell_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\ell_E^2 + \Delta]^3}$$

$$= \frac{i}{2\Delta(4\pi)^2} \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right)^\epsilon \Gamma(1+\epsilon) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \frac{i}{32\pi^2\Delta} \quad (5.113)$$

Come ci si aspetta anche dal grado superficiale di divergenza, vediamo che I_1 diverge logaritmicamente mentre I_2 è UV finito.

Fortunatamente dobbiamo calcolare esplicitamente solamente la parte divergente dell'integrale, mentre possiamo lasciare indicata simbolicamente le parti finite. La parte divergente è quindi data da

$$iA = \frac{i\lambda^3}{16\pi^2\epsilon} + o(1), \quad \epsilon \rightarrow 0 \quad (5.114)$$

5.4 Rinormalizzazione teoria di Yukawa - seconda versione


Considera la seguente lagrangiana:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}_0(i\not{\partial} - m_{f0})\psi_0 + \frac{1}{2}(\partial\phi_0)^2 - \frac{1}{2}M_0^2\phi_0^2 - \lambda_0\bar{\psi}_0\psi_0\phi_0 \quad (5.115)$$


Come evidenziato dai pedici 0, la lagrangiana è scritta in termini di parametri "bare", non fisici. Risulta allora conveniente scriverla in termini di parametri fisici + dei controtermini, nel modo seguente:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \bar{\psi}(i\not{\partial} - m_f)\psi + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{M^2}{2}\phi^2 - \lambda\bar{\psi}\psi\phi \\ & + i\delta Z_\psi\bar{\psi}\not{\partial}\psi - i\delta m_f\bar{\psi}\psi + \frac{1}{2}\delta Z_\phi(\partial\phi)^2 - \frac{\delta M^2\phi^2}{2} - \delta\lambda\bar{\psi}\psi\phi \end{aligned} \quad (5.116)$$


Le regole di Feynman che risultano da questa lagrangiana sono le seguenti:



$$D_\psi(p) = \frac{i}{\not{p} - m_f + i\epsilon} \quad (5.117)$$



$$D_\phi(p) = \frac{i}{p^2 - M^2 + i\epsilon} \quad (5.118)$$



$$-i\lambda \quad (5.119)$$


Usando queste, si calcolano i controtermini ordine per ordine in teoria delle perturbazioni, in modo tale che si verifichino le cosiddette *condizioni di rinormalizzazione*. Nel nostro caso, vogliamo che valga:

1. La funzione a due punti della teoria deve sempre essere della forma

$$\frac{i}{p^2 - M^2 + i\epsilon}, \quad \frac{i}{\not{p} - m_f + i\epsilon} \quad (5.120)$$

A tutti gli ordini in teoria delle perturbazioni.

Figura 5.7: Contributo ad 1 loop della funzione a due punti del campo spinoriale



2. Nel limite in cui le tre particelle esterne sono on-shell, voglio che il vertice sia della forma

$$\Gamma_{\bar{\psi}\psi\phi} = -i\lambda \quad (5.121)$$

Al primo ordine in teoria delle perturbazioni, vediamo che le condizioni sono soddisfatte se i controtermini sono nulli. Il primo ordine non banale è quindi quello ad un loop. Indaghiamo nel dettaglio.

5.4.1 Campo spinoriale

Considero i diagrammi di Feynman che contribuiscono alla funzione a due punti dello spinore, al livello di un loop. Un punto fondamentale è la determinazione della self energia, che corrisponde al diagramma in figura 5.7. Dalla condizione di rinormalizzazione già citata, oltre al propagatore standard, questa deve cancellare il contributo dei controtermini. Comincio allora il calcolo:

$$\begin{aligned} -i\Sigma(p) &= (-i\lambda)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{k} + m_f)}{k^2 - m_f^2} \frac{i}{(k-p)^2 - M^2} \\ &= \lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{\not{k} + m_f}{(k^2 - m_f^2)[(k-p)^2 - M^2]} \end{aligned} \quad (5.122)$$

Usiamo i parametri di Feynman per combinare i denominatori:

$$\begin{aligned} -i\Sigma(p) &= \int_0^1 dx \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{\not{k} + m_f}{[-2xk \cdot p + xp^2 - xM^2 + k^2 - m_f^2 + xm^2f]^2} \\ &= \lambda^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{(\not{k} + m_f)}{[(k-xp)^2 - \Delta]^2} \end{aligned} \quad (5.123)$$

Cambio la variabile di integrazione, $k \rightarrow \ell = k - xp$,

$$\begin{aligned} -i\Sigma(p) &= \lambda^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{x\not{p} + m_f}{[\ell^2 - \Delta]^2} \\ &= -i\lambda^2 \int_0^1 dx (x\not{p} + m_f) \int \frac{d^4\ell_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\ell_E^2 + \Delta]^2} \end{aligned} \quad (5.124)$$

Nell'ultimo passaggio abbiamo eseguito la rotazione di Wick. Per continuare con il conto usiamo la seguente formula:

$$\int \frac{d^d \ell_E}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\ell_E^2 + \Delta)^n} = \frac{\Delta^{d/2-n}}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(n - d/2)}{\Gamma(d/2)} \quad (5.125)$$

La formula si prova in modo diretto, calcolando l'integrale usando un paio di sostituzioni.

$$\int \frac{d\Omega_{d-1}}{(2\pi)^d} \int \frac{d\ell_E \ell_E^{d-1}}{[\ell_E^2 + \Delta]^n} = \frac{1}{2} \int \frac{d\Omega_{d-1}}{(2\pi)^d} \int \frac{d(\ell_E^2) (\ell_E^2)^{\frac{d-2}{2}}}{[\ell_E^2 + \Delta]^n} \quad (5.126)$$

Ora cambia la variabile $\ell_E^2 \rightarrow y = \frac{\Delta}{\ell_E^2 + \Delta}$, così che $\ell_E^2 = \frac{\Delta}{y} - \Delta$, $d(\ell_E^2) = -\frac{\Delta}{y^2} dy$, e si ottiene

$$\begin{aligned} \int \frac{d\Omega_{d-1}}{(2\pi)^d} \int \frac{\Delta}{y^2} dy \left(\frac{y}{\Delta}\right)^n \Delta^{\frac{d-2}{2}} \left(\frac{1-y}{y}\right)^{\frac{d-2}{2}} = \\ \frac{\Delta^{\frac{d}{2}-n}}{2} \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \int dy y^{n-1-d/2} (1-y)^{d/2-1} \end{aligned} \quad (5.127)$$

L'ultimo integrale in dy ricorda la definizione integrale della funzione β di Eulero:

$$\beta(\alpha, \gamma) = \int_0^1 dx x^{\alpha-1} (1-x)^{\gamma-1} = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha+\gamma)} \quad (5.128)$$

Sostituendo, troviamo la formula citata. Usando gli stessi passaggi si può anche dimostrare un'altra formula che ci tornerà utile,

$$\int \frac{d^d \ell_E}{(2\pi)^d} \frac{\ell_E^2}{(\ell_E^2 + \Delta)^n} = \frac{d}{2} \frac{\Delta^{d/2+1-n}}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(n - d/2 - 1)}{\Gamma(n)} \quad (5.129)$$


Tornando a noi, il diagramma $-i\Sigma(p)$ è (logaritmicamente) divergente per $d = 4$. Adottiamo allora il sistema di regolarizzazione di riduzione dimensionale, e prendiamo $d = 4 - 2\epsilon$ nel limite $\epsilon \rightarrow 0$. La self energia dello spinore diventa quindi

$$-i\Sigma(p) = -i \frac{\lambda^2}{(4\pi)^2} \int_0^1 dx [x\not{p} + m_f] \left(\frac{4\pi i \mu^2}{\Delta}\right)^\epsilon \Gamma(\epsilon) \quad (5.130)$$

Dove abbiamo riscalato $\lambda \rightarrow \lambda \mu^\epsilon$ per tenerla adimensionale. Nel limite $\epsilon \rightarrow 0$, otteniamo

$$\left(\frac{4\pi \mu^2}{\Delta}\right)^\epsilon \Gamma(\epsilon) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \left(1 + \epsilon \log\left(\frac{4\pi \mu^2}{\Delta}\right)\right) \left(\frac{1}{\epsilon} + \gamma_E\right) = \frac{1}{\epsilon} + \gamma_E + \log\left(\frac{4\pi \mu^2}{\Delta}\right) + o(\epsilon) \quad (5.131)$$

Figura 5.8: Self energia del campo scalare



Ovvero

$$-i\Sigma(p) = -i\frac{\lambda^2}{(4\pi^2)} \int_0^1 (x\not{p} + m_f) \left(\frac{1}{\epsilon} + \gamma_E + \log\left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta}\right) \right) \quad (5.132)$$

Se ci interessa solo la parte divergente, calcoliamo immediatamente

$$-i\Sigma(p) = -i\frac{\lambda^2}{16\pi^2\epsilon} \left(\frac{\not{p}}{2} + m_f \right) \quad (5.133)$$

La condizione di rinormalizzazione chiede che questo contributo sia cancellato dai controtermini, cioè deve valere

$$-i\Sigma(p) = -i(\delta Z_\psi^2 \not{p} - \delta m_f) \quad (5.134)$$

Possiamo calcolare quindi le parti infinite dei contotermini, uguagliando al lato destro e sinistro le potenze di $\not{p}$: si ottiene

$$\begin{cases} \delta Z_\psi = \frac{\lambda^2}{32\pi^2\epsilon} \\ \delta m_f = -\frac{\lambda^2 m_f}{16\pi^2\epsilon} \end{cases} \quad (5.135)$$

5.4.2 Campo scalare

La stessa logica si applica al campo scalare. Richiediamo che valga

$$-i\Sigma(p^2) = -i(\delta Z_\phi p^2 - \delta M) \quad (5.136)$$

dove con $-i\Sigma(p^2)$ indichiamo la self energia dello scalare, corrispondente al diagramma di Feynman in figura 5.8. Calcoliamo l'ampiezza:

$$-i\Sigma(p^2) = (-i\lambda)^2 \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \text{Tr} \left[\frac{i(\not{q} - \not{p} + m_f)}{[(q-p)^2 - m_f^2]} \frac{i(\not{q} + m_f)}{q^2 - m_f^2} \right]$$

$$= 4\lambda^2 \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{m_f^2 + (q-p) \cdot p}{[(q-p)^2 - m_f^2][q^2 - m_f^2]} \quad (5.137)$$

Come al solito, uso i parametri du Feynman e cambio variabile di integrazione:

$$\begin{aligned} -i\Sigma(p^2) &= 4\lambda^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{m_f^2 + (q-p) \cdot q}{[xp^2 - 2xp \cdot q + q^2 - m_f^2]^2} \\ &= 4\lambda^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{m_f^2 + (q-p) \cdot q}{[(q-xp)^2 - \Delta]^2}, \quad \Delta = m_f^2 - (1-x)xp^2 \\ &= 4\lambda^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2 + \Delta}{[\ell^2 - \Delta]^2}, \quad \ell = q - xp \\ &= 4\lambda^2 \int_0^1 dx (I_1 + \Delta I_2) \end{aligned} \quad (5.138)$$

Se definiamo

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2}{[\ell^2 - \Delta]^2} = \frac{2i\Delta}{(4\pi)^2} \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right)^\epsilon \Gamma(-1 + \epsilon) \\ I_2 &= \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\ell^2 - \Delta]^2} = \frac{-i}{(4\pi)^2} \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right)^\epsilon \Gamma(\epsilon) \end{aligned} \quad (5.139)$$

Dove abbiamo usato le formule precedentemente usate. Quindi, troviamo

$$\begin{aligned} -i\Sigma(p^2) &= 4i\lambda^2 \int_0^1 dx \left[\frac{2\Delta}{(4\pi)^2} \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right)^\epsilon \Gamma(-1 + \epsilon) - \frac{\Delta}{(4\pi)^2} \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right)^\epsilon \Gamma(\epsilon) \right] \\ &= \frac{i\lambda^2}{4\pi^2} \int_0^1 dx \Delta \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right)^\epsilon (2\Gamma(-1 + \epsilon) - \Gamma(\epsilon)) \end{aligned} \quad (5.140)$$


Se ci fermiamo allo sviluppo di Laurent in ϵ fino all'ordine zero, troviamo

$$\begin{aligned} -i\Sigma(p^2) &= \frac{i\lambda^2}{4\pi^2} \int_0^1 dx \Delta \left(1 + \epsilon \log \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right) \right) \left(-\frac{2}{\epsilon} + 2\gamma_E - 2 - \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E \right) \\ &= \frac{i\lambda^2}{4\pi^2} \int_0^1 dx \Delta \left[-\frac{3}{\epsilon} - 2 + \gamma_E - 2 \log \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right) \right] \end{aligned} \quad (5.141)$$

Se ci interessa solo la parte infinita dei controtermini, possiamo prendere

$$-i\Sigma(p^2) = -i \frac{\lambda^2}{4\pi^2} \frac{3}{\epsilon} \int_0^1 dx \Delta + 0(1)$$

Figura 5.9: Diagramma a triangolo che contribuisce a $\Gamma_{\bar{\psi}\psi\phi}$ al secondo ordine perturbativo



$$= -i \frac{3\lambda^2}{4\pi^2\epsilon} \left(m_f^2 - \frac{p^2}{6} \right) + o(1) \quad (5.142)$$

Applicando quindi la condizione di rinormalizzazione 5.136, otteniamo

$$\begin{cases} \delta Z_\phi = -\frac{\lambda^2}{8\pi^2\epsilon} \\ \delta m = -\frac{3\lambda^2}{4\pi^2\epsilon} \end{cases} \quad (5.143)$$

5.4.3 Costante di accoppiamento

L'ultimo passaggio del calcolo dei controtermini al primo ordine perturbativo è il calcolo del controtermine di carica $\delta\lambda$. La condizione di rinormalizzazione che scegliamo è la seguente: il vertice deve essere quello misurato $-i\lambda$ nel limite in cui tutte le particelle esterne sono on-shell. Chiramente a livello d'albero la condizione è soddisfatta se $\delta\lambda^{(0)} = 0$. Invece, a livello di 1 loop, le correzioni al vertice sono molteplici: ci sono i contributi di self energia, che vengono però perfettamente cancellati dai controtermini di massa e di funzione d'onda. I 3 contributi che rimangono sono dunque vertice ad albero, vertice del controtermine e vertice "triangolo", dato dal diagramma di Feynman in figura 5.9. Se indichiamo con iA l'ampiezza di quest'ultimo, si ottiene che la condizione di rinormalizzazione è data da

$$-i\lambda - i\delta\lambda^{(1)} + iA(m_f^2, m_f^2, M^2) = -i\lambda \implies \delta\lambda^{(1)} = A(m_f^2, m_f^2, M^2) \quad (5.144)$$

Calcolo dunque l'ampiezza iA del diagramma a triangolo: ³

$$\begin{aligned} iA(m^2, m^2, M^2) &= (-i\lambda)^3 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[\frac{i(\not{k} + \not{p}_1 + m)}{(k + p_1)^2 - m^2} \right] \left[\frac{i(\not{k} - \not{p}_2 + m)}{(k - p_2)^2 - m^2} \right] \left[\frac{i}{k^2 - M^2} \right] \\ &= -\lambda^3 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{(\not{k} + \not{p}_1 + m)(\not{k} - \not{p}_2 + m)}{[k^2 + 2k \cdot p_1][k^2 - 2k \cdot p_2][k^2 - M^2]} \end{aligned} \quad (5.145)$$

Notiamo che ho tre denominatori, quindi è necessario usare due parametri di Feynman. In particolare usiamo la formula

$$\frac{1}{ABC} = 2 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \frac{1}{[xA + yB + (1-x-y)C]^3} \quad (5.146)$$

³Abbiamo scelto i momenti in modo tale che semplificassero il più possibile le masse nel calcolare l'ampiezza on-shell

Scegli $C = k^2 - M^2$, $A = k^2 + 2k \cdot p_1$, $B = k^2 - 2k \cdot p_2$. Il denominatore diventa:

$$\begin{aligned} \text{Den} &= 2xk \cdot p_1 - 2yk \cdot p_2 + k^2 - M^2 - xM^2 - yM^2 \\ &= (k + xp_1 - yp_2)^2 - \underbrace{[(xp_1 - yp_2)^2 + (1 - x - y)M^2]}_{=\Delta} \end{aligned} \quad (5.147)$$

L'ampiezza è quindi data da

$$iA = -2\lambda^3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{(\not{k} + \not{p}_1 + m)(\not{k} - \not{p}_2 + m)}{[(k + xp_1 - yp_2)^2 - \Delta]^3} \quad (5.148)$$

Facciamo quindi la sostituzione $k \rightarrow \ell = k + xp_1 - yp_2$, e otteniamo così

$$iA = -2\lambda^3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{(\ell + (x+1)p_1 - yp_2 + m)(\ell + xp_1 - (y+1)p_2 + m)}{[\ell^2 - \Delta]^3} \quad (5.149)$$

Teniamo solo i contributi di ordine 0 e 2 in ℓ , che non si cancellano per parità:

$$\begin{aligned} iA &= -2\lambda^3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2 + x(x+1)m^2 - (x+1)(y+1)p_1 p_2 + m(x+1)p_1}{[\ell^2 - \Delta]^3} \\ &\quad + \frac{-xy p_2 p_1 + y(y+1)m^2 - ym p_2 + xm p_1 - (y+1)m p_2 + m^2}{[\ell^2 - \Delta]^3} \end{aligned} \quad (5.150)$$

Che prende la forma

$$\begin{aligned} iA &= -2\lambda^3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy (I_1 + (m^2(1 + x(x+1) + y(y+1)) + \\ &\quad m((2x+1)p_1 - (2y+1)p_2) - ((x+1)(y+1)p_1 p_2 + xyp_2 p_1))I_2) \end{aligned} \quad (5.151)$$

Se abbiamo definito

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2}{[\ell^2 - \Delta]^3} = -i \int \frac{d^4 \ell_E}{(2\pi)^4} \frac{\ell_E^2}{[\ell_E^2 + \Delta]^3} \\ &= -\frac{i\Gamma(\epsilon)}{(4\pi)^2} \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right)^\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} -\frac{i}{16\pi^2} \left[\frac{1}{\epsilon} + \gamma_E + \log \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right) \right] \end{aligned} \quad (5.152)$$

e similmente

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\ell^2 - \Delta]^3} = i \int \frac{d^4\ell_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\ell_E^2 + \Delta]^3} \\
&= \frac{i}{2\Delta(4\pi)^2} \left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta} \right)^\epsilon \Gamma(1 + \epsilon) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \frac{i}{32\pi^2\Delta}
\end{aligned} \tag{5.153}$$

Come ci si aspetta anche dal grado superficiale di divergenza, vediamo che I_1 diverge logaritmicamente mentre I_2 è UV finito.

Fortunatamente dobbiamo calcolare esplicitamente solamente la parte divergente dell'integrale, mentre possiamo lasciare indicata simbolicamente le parti finite. La parte divergente è quindi data da

$$iA = 2 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \frac{i\lambda^3}{16\pi^2\epsilon} + o(1) = \frac{i\lambda^3}{16\pi^2\epsilon} + o(1) \quad \epsilon \rightarrow 0 \tag{5.154}$$

Concludiamo quindi che

$$\delta\lambda^{(1)} = A = \frac{\lambda^3}{16\pi^2\epsilon} \tag{5.155}$$

5.4.4 Controtermini in diversi schemi di rinormalizzazione

Nel caso in cui volessi usare diverse schemi di rinormalizzazione, i controtermini sono leggermente diversi. Ad esempio mettiamo io voglia calcolare i controtermini usando lo schema on-shell: è facile vedere che con le nostre convenzioni, deve valere

$$\begin{aligned}
\delta M^2 &= -\Sigma_\phi(M^2) \\
Z_\phi &= \frac{1}{1 - \Sigma'_\phi(p^2 = M^2)} \simeq \Sigma'(p^2 = M^2) \\
\delta m_f &= \Sigma_\psi(m_f) \\
Z_\psi &= \frac{1}{1 - \Sigma'_\psi(p = m_f)} \simeq \Sigma'(p = m_f)
\end{aligned} \tag{5.156}$$

Date le espressioni già calcolate, è facile vedere che

$$\begin{aligned}
\Sigma_\phi(M^2) &= \frac{3\lambda^2}{4\pi^2\epsilon} \left[m_{f,0}^2 - \frac{M^2}{6} \right] \\
\Sigma'_\phi(p^2 = M^2) &= \frac{\lambda^2}{8\pi^2\epsilon} \\
\Sigma_\psi(p = m_f) &= \frac{3m_f\lambda^2}{32\pi^2\epsilon}
\end{aligned} \tag{5.157}$$


Per la self energia del fermione, ricorda che vale

$$\Sigma_\psi(\not{p}) = A(p^2, m)\mathbb{I} + B(p^2, m)\not{p} \implies \frac{\partial \Sigma_\psi}{\partial \not{p}} = 2\not{p} \frac{\partial A}{\partial p^2} + B + 2p^2 \frac{\partial B}{\partial p^2} \quad (5.158)$$

Nel nostro caso, $B = A/2 = \frac{\lambda^2}{32\pi^2\epsilon}$. Si trova quindi

$$\Sigma'_\psi = \frac{\lambda^2}{32\pi^2\epsilon} \quad (5.159)$$

Figura 5.10: Nuovi vertici aggiunti dall'estensione



5.5 Nuova fisica nel decadimento del muone

Consideriamo adesso un'estensione del Modello Standard, in cui è possibile il decadimento del muone

$$\mu^- \rightarrow e^- \gamma \quad (5.160)$$

Consiste nell'aggiunta di un campo scalare carico ϕ^+ , e di un fermione Ψ , con massa rispettivamente M_ϕ, M_Ψ . La lagrangiana di interazione con il campo del fotone, elettrone e muone è data da

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = (D_\nu \phi^+)(D^\nu \phi^+)^* + y_e(\bar{\Psi}\psi_e\phi^+ + \text{h.c.}) + y_\mu(\bar{\Psi}\psi_\mu\phi^+ + \text{h.c.}) \quad (5.161)$$

se $D_\nu = \partial_\nu + ieA_\nu$, cioè la derivata covariante rispetto alle trasformazioni di gauge $U(1)$ dell'elettromagnetismo.

5.5.1 Regole di Feynman della teoria

Questa lagrangiana di interazione permette l'aggiunta di 4 vertici al modello standard. I diagrammi di Feynman corrispondenti sono in figura 5.10.

Sempre dalla lagrangiana leggiamo le regole di Feynman: in particolare, troviamo:


$$\Gamma_{\bar{\psi}\psi_e\phi^+} = -iy_e, \quad \Gamma_{\bar{\psi}\psi_\mu\phi^+} = -iy_\mu \quad (5.162)$$

Per ricavare quelle per l'interazione fra il campo scalare e il campo elettromagnetico, sviluppo la derivata covariante:

$$\begin{aligned} (D_\nu \phi^+)(D^\nu \phi^+)^* &= (\partial_\nu \phi^+ + ieA_\nu \phi^+)(\partial^\nu \phi^{+*} - ieA^\nu \phi^{+*}) \\ &= (\partial_\nu \phi^+)(\partial^\nu \phi^+)^* + ieA_\nu(\phi^+(\partial_\nu \phi^+)^* - \phi^{+*}(\partial_\nu \phi^+)) + e^2 A_\nu A^\nu |\phi^+|^2 \end{aligned} \quad (5.163)$$

Ricordando quindi che siamo nello spazio dei momenti e possiamo sostituire $\partial_\mu \rightarrow ip_\mu$, e che nel vertice a 4 dobbiamo moltiplicare per un fattore 2, data la simmetria dei bosoni vettori esterni, si trova

Figura 5.11: Diagrammi di Feynman per il decadimento $\mu^- \rightarrow e^- \gamma$



$$\Gamma_{\phi^+\phi^{+*}A_\mu} = ie(p_2 - p_1)^\mu, \quad \Gamma_{\phi^+\phi^{+*}A_\mu A_\nu} = 2ie^2 g^{\mu\nu} \quad (5.164)$$

5.5.2 Contributo al fattore di forma

Consideriamo ancora il decadimento $\mu^- \rightarrow e^- \gamma$. Esistono 3 diagrammi ad un loop nella nostra teoria che rendono possibile il processo, illustrati in figura 5.11. Poichè la teoria conserva la parità, è chiaro, dalle considerazioni dell'esercizio sul decadimento del muone, che la struttura totale della ampiezza dovrà essere della forma $\mathcal{M}^\mu = \bar{u}_e(p_2)[i f_1 \sigma^{\mu\nu} q_\nu] u_\mu(p_1)$. Tra questi, i due diagrammi di self energia sono $\propto \gamma^\mu$, e divergenti. Non contribuiscono dunque ad f_1 , ma solo il diagramma "a triangolo" lo fa. Vediamo dunque di esprimere il fattore di forma f_1 proprio in termini di integrali di loop.

Chiamiamo la ampiezza totale $\mathcal{M}^\mu = \mathcal{M}_1^\mu + \mathcal{M}_2^\mu + \mathcal{M}_3^\mu$. Usando le regole di Feynman troviamo (supponendo che valga $M = M_\Psi = M_\phi$)

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_1^\mu &= \bar{u}_e(p_2)(y_e y_\mu e) \left(\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{(-2k + p_1 + p_2)^\mu (\not{k} + M)}{[(k - p_1)^2 - M^2][(k - p_2)^2 - M^2][k^2 - M^2]} \right) u_\mu(p_1) \\ \mathcal{M}_2^\mu &= \bar{u}_e(p_2)(y_e y_\mu e) \gamma^\mu \frac{\not{p}_1}{m_\mu^2} \left(\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{\not{k} + M}{[k^2 - M^2][(k - p_1)^2 - M^2]} \right) u_\mu(p_1) \\ \mathcal{M}_3^\mu &= -\bar{u}_e(p_2)(e y_e y_\mu) \left(\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{\not{k} + M}{[k^2 - M^2][(k - p_2)^2 - M^2]} \right) \frac{\not{p}_2 + m_\mu}{m_\mu^2} \gamma^\mu u_\mu(p_1) \end{aligned} \quad (5.165)$$

Cominciamo il calcolo manipolando la ampiezza del diagramma a triangolo, cioè $\mathcal{M}_1^\mu$. In particolare, vogliamo scriverlo nella base che abbiamo indicato di matrici di Dirac (cioè $\gamma^\mu, q^\mu, \sigma^{\mu\nu} q_\nu$). Dopodiché, le parti $\propto q^\mu$ si cancellano perché si contraggono con il vettore di polarizzazione del fotone esterno, $\epsilon^*(q)$. La parte invece $\propto \gamma^\mu$ deve cancellare il contributo delle self energie, in modo che rimanga solamente la struttura $\propto \sigma^{\mu\nu} q_\nu$, che è proprio il fattore di forma f_1 da noi cercato.

Per prima cosa, mostrerò come scrivere $\mathcal{M}_1^\mu$ in termini di $\gamma^\mu, \sigma^{\mu\nu} q_\nu$. Poi per completezza mostrerò che le parti *UV divergenti* dell'ampiezza si cancellano, così che la ampiezza sia finita. Questo è un test non banale sulla scrittura corretta della ampiezza. Per le parti finite invece ci fideremo dell'identità di Ward. Successivamente, potremo isolare il fattore di forma f_1 , in termini di integrali sui parametri di Feynman su funzioni razionali.

Chiamiamo I l'integrale di loop in $\mathcal{M}_1$. Introduciamo i parametri di Feynman:

$$\begin{aligned}
I &= 2 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{(-2k + p_1 + p_2)^\mu (\not{k} + M)}{[-2xk \cdot p_1 + xm_\mu^2 - 2k \cdot p_2 + k^2 - M^2]^3} \\
&= 2 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{(-2k + p_1 + p_2)^\mu (\not{k} + M)}{(k - xp_1 - yp_2)^2 - M^2 - xym_\mu^2 - x(1-x)m_\mu^2} \\
&= 2 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{(-2k + (1-2x)p_1 + (1-2y)p_2)^\mu (\not{\ell} + xm_\mu + M)}{[\ell^2 - \Delta]^3}
\end{aligned} \tag{5.166}$$

Nell'ultimo passaggio abbiamo cambiato variabile di integrazione $k \rightarrow \ell = k - xp_1 - yp_2$, definito $\Delta = M^2 + xym_\mu^2 + x(1-x)m_\mu^2$, ed usato l'eq. di Dirac, $\bar{u}_\mu(p_1)\not{p}_1 = \bar{u}_\mu(p_1)m_\mu$, ed $\not{p}_1 u_e(p_1) = 0$. Per parità sopravvivono nell'integrale solo le componenti $\propto \ell^2, \ell^0$:

$$I = 2 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{-2\ell^\mu \not{\ell} + ((1-2x)p_1 + (1-2y)p_2)^\mu (xm_\mu + M)}{[\ell^2 - \Delta]^3} \tag{5.167}$$

Immediatamente vediamo che il diagramma ha una parte logaritmicamente divergente, ed una parte convergente. La parte divergente è $\propto \gamma^\mu$, e serve per cancellare le divergenze dei diagrammi con le self-energie. Vediamolo esplicitamente:

$$\begin{aligned}
I' &= -4\gamma_\nu \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^\mu \ell^\nu}{[\ell^2 - \Delta]^3} = -\frac{4}{d} \gamma^\mu \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2}{[\ell^2 - \Delta]^3} \\
&= \frac{4i}{d} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell_E^2}{[\ell_E^2 + \Delta]^3} = \frac{2i}{d} \gamma^\mu \frac{d}{2} \frac{\Gamma(\epsilon)}{(4\pi)^2} = \frac{i\gamma^\mu}{32\pi^2\epsilon} + o(1)
\end{aligned} \tag{5.168}$$

Per calcolare le ampiezze degli altri due diagrammi, comincio con il sottodiagramma della self energia:

$$\begin{aligned}
-i\Sigma(p) &= (y_e y_\mu) \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{\not{k} + M}{(k^2 - M^2)((k-p)^2 - M^2)} \\
&= (y_e y_\mu) \int_0^1 dx \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{\not{k} + M}{[xp^2 - 2xp \cdot k + k^2 - M^2]^2} \\
&= (y_e y_\mu) \int_0^1 dx \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{x\not{p} + M}{[\ell^2 - \Delta]^2}
\end{aligned} \tag{5.169}$$

Dove abbiamo cambiato variabile di integrazione $k \rightarrow \ell = k - xp$, chiamato $\Delta = M^2 - x(1-x)p^2$. Proseguendo con il calcolo, otteniamo

$$\begin{aligned}
-i\Sigma(p) &= (y_e y_\mu) \int_0^1 dx (x \not{p} + M) \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\ell^2 - \Delta]^2} = -i(y_e y_\mu) \int_0^1 dx (x \not{p} + M) \int \frac{d^4 \ell_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\ell_E^2 + \Delta]^2} \\
&= \frac{-i y_e y_\mu}{(4\pi)^2 \epsilon} \left(\frac{\not{p}}{2} + M \right) + o(1)
\end{aligned} \tag{5.170}$$

Possiamo allora facilmente calcolare la parte infinita dell'ampiezza dei diagrammi di self energia:

$$\mathcal{M}_2^\mu = \bar{u}_e(-ie\gamma^\mu) \frac{i \not{p}_1}{m_\mu^2} (-i\Sigma(p_1)) u_\mu(p_1) \tag{5.171}$$

Usando l'eq. di Dirac e semplificando, si ottiene facilmente

$$\mathcal{M}_2^\mu = -i \frac{e y_e y_\mu}{(4\pi)^2 \epsilon} \left(\frac{1}{2} + \frac{M}{m_\mu} \right) \bar{u}_e(p_2) \tag{5.172}$$

Svolgiamo gli stessi passaggi per il terzo diagramma:

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}_3^\mu &= \bar{u}_e(p_2) (-i\Sigma(p_2)) \frac{i(\not{p}_2 + m_\mu)}{-m_\mu^2} (-ie\gamma^\mu) u_\mu(p_1) \\
&= i \frac{e y_e y_\mu}{(4\pi)^2 \epsilon} \left(\frac{\not{p}_2}{2} + M \right) \left(\frac{\not{p}_2 + m_\mu}{m_\mu^2} \right) \gamma^\mu u_\mu(p_1) \\
&= i \frac{e y_e y_\mu}{(4\pi)^2 \epsilon} \left(\frac{M}{m_\mu} \right) \bar{u}_e(p_2) \gamma^\mu u_\mu(p_1)
\end{aligned} \tag{5.173}$$

Troviamo quindi

$$\mathcal{M}_2^\mu + \mathcal{M}_3^\mu = -i \frac{e y_e y_\mu}{32\pi^2 \epsilon} \bar{u}_e(p_2) \gamma^\mu u_\mu(p_1) + o(1) \tag{5.174}$$

che è esattamente l'opposto del termine infinito calcolato da $\mathcal{M}_1^\mu$ (eq. 5.168).

Avendo verificato che l'identità di Ward funziona per i termini $\propto \epsilon^{-1}$, ci fidiamo che cancelli anche i termini finiti, proporzionali a γ^μ . Torniamo quindi a considerare la parte convergente rimasta dell'integrale:

$$I'' = 2 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{(x m_\mu + M)((1-2x)p_1^\mu + (1-2y)p_2^\mu)}{[\ell^2 - \Delta]^3} \tag{5.175}$$

Si calcola subito l'integrale in ℓ :

$$I'' = \frac{i}{(4\pi)^2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \frac{(M + xm_\mu)((1-2x)p_1^\mu + (1-2y)p_2^\mu)}{\Delta} \quad (5.176)$$

Scrivo p_1, p_2 in termini di $p = p_1 + p_2$, $q = p_1 - p_2$ (cioè usando $p_1 = (p+q)/2$ ed $p_2 = (p-q)/2$). Questo è conveniente perchè i pezzi $\propto q^\mu$ si contraggono e si cancellano con il vettore di polarizzazione del fotone esterno, $\epsilon_\mu(q)$. Si ottiene così

$$I'' = i \frac{p_1^\mu + p_2^\mu}{16\pi^2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \frac{(M + xm_\mu)(1-x-y)}{\Delta} \quad (5.177)$$

Posso ora usare l'identità di Gordon, e scartare il termine $\propto \gamma^\mu$. Si ottiene allora una espressione per la ampiezza totale:

$$i\mathcal{M}^\mu = i\bar{u}_e(p_2) \left[\frac{-i(ey_e y_\mu)\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{16\pi^2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \frac{(M + xm_\mu)(1-x-y)}{\Delta} \right] u_\mu(p_1) \quad (5.178)$$

Confrontando l'espressione con $\mathcal{M}^\mu = i\bar{u}_e(p_2)f_1\sigma^{\mu\nu}q_\nu u_\mu(p_1)$, si legge immediatamente

$$f_1 = -\frac{(ey_e y_\mu)}{16\pi^2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \frac{(M + xm_\mu)(1-x-y)}{\Delta} \quad (5.179)$$

5.5.3 Calcolo esplicito degli integrali di loop

Per determinare f_1 , devo calcolare il doppio integrale in x, y . L'integranda è una funzione razionale, del primo grado in y e del secondo grado in x . L'integrazione è certamente possibile quindi ma anche poco gradevole. Esplicitando Δ , l'integrale da risolvere è dato da

$$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \frac{(M + xm_\mu)(1-x-y)}{M^2 + xym_\mu^2 - x(1-x)m_\mu^2} \quad (5.180)$$

L'integrale in y è la somma di due integrali elementari:

$$\int_0^{1-x} dy \left(\frac{a}{b+cy} \right) = \frac{a}{c} \log \left(\frac{b+c(1-x)}{b} \right), \quad \int_0^{1-x} dy \left(\frac{ay}{b+cy} \right) = \frac{a}{c} \left[1-x - \frac{b}{c} \log \left(\frac{b+c(1-x)}{b} \right) \right] \quad (5.181)$$

Usando queste formule, otteniamo

$$\int_0^1 dx \left(\frac{M + xm_\mu}{x^2 m_\mu^4} \right) \left[xm_\mu^2(x-1) + M^2 \log \left(\frac{M^2 - x(1-x)m_\mu^2}{M^2} \right) \right] \quad (5.182)$$