

Appunti di Gravità e Superstringhe 2

Giacomo Galliani, corso del prof. A. Amariti, A. Santambriogio

Anno accademico 2025-2026

CAPITOLO 1**LA STRINGA CLASSICA****PAGE 2**

1.1	Extra dimensioni - in meccanica quantistica	2
1.2	Stringa non relativistica	3
1.3	Particella relativistica: lagrangiana ed equazioni del moto	4
1.4	La stringa relativistica	5
	L'azione di Nambu-Goto — 5 • Parametrizzazione e velocità della stringa — 9 • Studio delle equazioni del moto — 12 • Correnti conservate sul WS — 14 • Simmetrie di Lorentz e correnti — 16	

CAPITOLO 2**LE SUPERALGEBRE DI LIE****PAGE 18**

2.1	Motivazione allo studio della supersimmetria e teorema di Coleman-Mandula	18
2.2	Definizione di superalgebra di Lie e primi esempi	21
2.3	L'algebra di supersimmetria	23

1

La stringa classica

1.1 Extra dimensioni - in meccanica quantistica

Con un semplice esempio si può apprezzare rapidamente come si modifica lo spettro di una Hamiltoniana, se in meccanica quantistica aggiungiamo una dimensione compatta, dalle piccole dimensioni. Consideriamo innanzitutto il problema della buca uno-dimensionale, cioè

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \in [-a, a] \\ +\infty & \text{altrimenti} \end{cases} \implies \psi_k = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{k\pi x}{a}\right), E_k = \frac{\hbar^2}{2\pi} \left(\frac{k\pi}{a}\right)^2 \quad (1.1)$$

Se invece aggiungo una dimensione, ad esempio un cerchio di raggio $R \ll a$, e prendo sempre $V(x, y) = V(x)$, allora l'eq. di Schroedinger è data da

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \right) = E \psi(x, y) \quad (1.2)$$

Per risolverla, posso separare le variabili se faccio l'ansatz $\psi(x, y) = X(x)Y(y)$. All'ora l'eq. diventa: (dividendo per ψ)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} \right) = E \quad (1.3)$$

Si trova risolvendo questa che

$$X_k = a_k \sin\left(\frac{k\pi x}{a}\right) \quad (1.4)$$

$$Y_\ell = b_\ell \sin\left(\frac{\ell y}{R}\right) + c_\ell \cos\left(\frac{\ell y}{R}\right) \quad (1.5)$$

e lo spettro è dato da

$$E_{k,\ell} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\left(\frac{k\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\ell}{R}\right)^2 \right) \quad (1.6)$$

Se $R \ll a$, è chiaro in che senso si può parlare di *dimensione invisibile*: per eccitare un modo $\ell : 0 \rightarrow 1$ ci vorrebbe un'energia enorme, rispetto al gap $E_{1,0} - E_{0,0}$.

1.2 Stringa non relativistica

Vogliamo considerare le e.o.m. per le oscillazioni trasversali con 1 direzione trasversa, e una direzione longitudinale, per una stringa con lunghezza a riposo a , tensione T_0 , massa per unità di lunghezza μ_0 . Penseremo dunque ad una stringa nel piano $(x - y)$, con posizione a riposo da $(0, 0) \rightarrow (0, a)$.

Le equazioni del moto per la coordinata $y(x, t)$ della stringa, che seguono dalla meccanica sono

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\mu_0}{T_0} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad (1.7)$$

La natura delle soluzioni dipende dal tipo di condizioni al contorno. Vi sono in particolare due tipi:

1. Condizioni di Dirichlet, imponiamo gli estremi fissi nel tempo, dunque $y(t, x = 0) = y(t, x = a) = 0$
2. Condizioni di Neumann, dove gli estremi possono muoversi, ma la stringa deve arrivare agli estremi con derivata nulla, ovvero $\partial_x(y(t, x = 0)) = \partial_x(y(t, x = a)) = 0$.

Una buona quantità di soluzioni delle equazione è catturata dall'ansatz $y(t, x) = y(x) \sin(\omega t + \phi)$. In questo modo, l'eq. diventa una ODE per $y(x)$:

$$y''(x) + \omega^2 \frac{\mu_0}{T_0} y(x) = 0 \quad (1.8)$$

Le cui soluzioni sono date da:

1. condizioni di Dirichlet: $y_n(x) = A_n \sin(n\pi x/a)$, $n = 1, 2, \dots$. Dunque le frequenze possibili sono $\omega_n = \sqrt{\frac{\mu_0}{T_0}} \frac{n\pi}{a}$
2. condizioni di Neumann: $y_n(x) = A_n \cos(n\pi x/a)$ $n = 0, 1, \dots$, con le stesse frequenze di prima.

Un esempio di soluzione non catturata dall'ansatz è $y(t, x) = At + b$, ovvero una traslazione rigida della stringa con velocità costante, che soddisfa le condizioni di Neumann.

Vediamo come possiamo scrivere un formalismo lagrangiano di questa teoria: prendiamo come lagrangiana

$$L(t) = \int_0^a \left(\frac{1}{2} \mu_0 \dot{y}^2 - \frac{1}{2} T_0 (y')^2 \right) dx = \int_0^a \mathcal{L} dx \quad (1.9)$$

Da questa definiamo il funzionale d'azione:

$$S = \int_{t_1}^{t_f} L(t) dt \quad (1.10)$$

i cui argomenti sono i cammini $y(t, x)$ nel rettangolo $[0, a] \times [t_1, t_f]$. Le equazioni del moto si ottengono variando i cammini $y(t, x) \rightarrow y(t, x) + \delta y(t, x)$. Nota che la lagrangiana dipende solamente dalle derivate di y , e che possiamo scrivere

$$\mu_0 \dot{y} \delta \dot{y} = \partial_t (\mu_0 \dot{y} \delta y) - \mu_0 \ddot{y} \delta y \quad (1.11)$$

$$T_0 y' \delta y' = \partial_x (T_0 y' \delta y) - T_0 y'' \delta y \quad (1.12)$$

La variazione allora è

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_f} \int_0^a dt dx (\mu_0 \dot{y} \delta \dot{y} - T_0 y' \delta y') \quad (1.13)$$

e integrando per parti,

$$\delta S = \int_0^a (\mu_0 \dot{y} \delta y)|_{t_i}^{t_f} + \int_{t_i}^{t_f} dt (T_0 y' \delta y)|_0^a - \int_{t_i}^{t_f} dt \int_0^a dx (\mu_0 \ddot{y} + T_0 y'') \quad (1.14)$$

ognuna di queste, secondo il principio di minima azione, deve annullarsi singolarmente. Vediamo dunque che ritroviamo in ordine le condizioni iniziali (sia N o D), le condizioni al bordo, e infine le equazioni del moto.

1.3 Particella relativistica: lagrangiana ed equazioni del moto

Consideriamo una particella libera, relativistica con $m > 0$. Il nostro obbiettivo è scrivere la sua azione. Per piccole velocità, deve tendere al caso classico, ma deve essere diversa ad alte velocità, perché le equazioni del moto $\dot{v} = 0$ sono valide ovunque, anche per $v > c$. Procediamo allora nel modo seguente:

Dato il moto spaziotemporale, si può definire la linea di mondo $\mathcal{P}$. Si richiede che l'azione sia lorentz-invariante, un funzionale dei cammini $\mathcal{P}$ che partono da un origine $(0, \vec{0})$ e arrivano al tempo t_f nel punto finale, cioè $(ct_f, \vec{x}_f)$. Deve inoltre valere che, fissato una linea di mondo $\mathcal{P}_i$, l'azione deve essere la stessa per tutti gli osservatori inerziali. Questo ci suggerisce che dovrà valere

$$S \propto \int \frac{ds}{c} \quad (1.15)$$

dimensionalmente, ci serve una energia come costante, che sia un'invariante di lorentz: possiamo prendere la massa a riposo. Si trova allora che

$$S = -mc \int ds \quad (1.16)$$

Dato che $\frac{ds}{dt} = c\sqrt{1 - (v/c)^2}$, la lagrangiana è data da

$$S = -mc \int_{t_i}^{t_f} dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (1.17)$$

che è manifestamente valida solo se $v < c$. Un'aspetto importante è l'invarianza sotto riparametrizzazioni: Considero due parametrizzazioni della stessa curva,

$$x^\mu = x^\mu(\tau) : \tau \in [\tau_i, \tau_f], x_i = x^\mu(\tau_i), x_f = x^\mu(\tau_f) \quad (1.18)$$

$$x^\mu = x^\mu(\tau') : \tau' \in [\tau'_i, \tau'_f], x_i = x^\mu(\tau'_i), x_f = x^\mu(\tau'_f) \quad (1.19)$$

In termini della parametrizzazione, l'intervallo ds si scrive

$$ds^2 = -\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} d\tau^2 \quad (1.20)$$

Dunque l'azione è esplicitamente

$$S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}} d\tau \quad (1.21)$$

se nell'integrale faccio il cambio esplicito di coordinate $\tau \rightarrow \tau'$, trovo

$$S = \int_{\tau'_i}^{\tau'_f} d\tau' \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau'} \frac{dx^\nu}{d\tau'}} \quad (1.22)$$

che è esattamente l'azione che avrei calcolato se fossi partito prima da τ' . Dunque l'azione è invariante per riparametrizzazioni. Le equazioni del moto si trovano variando la linea di mondo, e imponendo che l'azione sia stazionaria:

$$\delta S = -mc \int \delta(ds) \quad (1.23)$$

Per valutare questo, ricorda che

$$\delta(ds^2) = 2ds\delta(ds) = -2\eta_{\mu\nu} \delta\left(\frac{dx^\mu}{d\tau}\right) \frac{dx^\nu}{d\tau} d\tau^2 \implies \delta(ds) = -\eta_{\mu\nu} \frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{d\tau}{c} \quad (1.24)$$

Dunque troviamo che

$$\delta S = m \int \eta_{\mu\nu} \frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} d\tau = m \int \frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau} \frac{dx_\mu}{d\tau} d\tau \quad (1.25)$$

Si definisce il momento come $P_\mu = m \frac{dx_\mu}{d\tau}$, e si scrive

$$\delta S = \int \frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau} P_\mu = 0 \xrightarrow{\text{Int. per parti}} \delta S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \frac{d}{d\tau} (\delta(x^\mu)) P_\mu - \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \delta(x^\mu) \frac{dP_\mu}{d\tau} = 0, \forall \delta(x^\mu) \quad (1.26)$$

Dunque le equazioni del moto sono

$$\frac{dP_\mu}{d\tau} = 0 \quad (1.27)$$

e sono manifestamente invarianti rispetto a trasformazioni di lorentz. (sotto queste, $x^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu x^\nu$).

1.4 La stringa relativistica

1.4.1 L'azione di Nambu-Goto

Ora vogliamo passare da una particella, ad un oggetto esteso in una direzione, la stringa. Anche per questa vogliamo scrivere un'azione. La differenza principale rispetto ad una particella puntiforme è che la stringa non traccia una linea di mondo, ma traccia una World-Sheet (WS). Questa superficie può essere una superficie chiusa nel caso di stringa chiusa, oppure una superficie aperta nel caso di stringa aperta. Su queste superfici, le linee con x^0 costante sono proprio le stringhe.

Per prendere confidenza con l'argomento, consideriamo innanzitutto una superficie puramente spaziale, che sia descritta da due parametri, ξ^1, ξ^2 . Se lo spazio in cui la superficie è immersa è lo spazio euclideo 3-dimensionale, la superficie è descritta da

$$\vec{x}(\xi^1, \xi^2) = (x^1(\xi^1, \xi^2), x^2(\xi^1, \xi^2), x^3(\xi^1, \xi^2)) \quad (1.28)$$

Cioè la superficie fisica è l'immagine dello spazio dei parametri, sotto la mappa $\vec{x}(\xi^1, \xi^2)$.

Equivalentemente, posso pensare che le ξ^i sono coord. locali sulla superficie. Questo vuol dire che la mappa inversa di $\vec{x}$ manda punti sulla superficie nello spazio dei parametri. Localmente, la mappa è 1:1, e associa dunque ad ogni punto sulla superficie due coordinate, (ξ^1, ξ^2) .

Sulla superficie si introduce il concetto di area nel modo seguente: dato un "quadrato" nello spazio dei parametri $d\xi^1 d\xi^2$, voglio determinare dA cioè l'area (infinitesima) dell'immagine del quadrato, sulla superficie. In generale questo è un parallelogramma, con lati

$$\begin{cases} d\vec{v}_1 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^1} d\xi^1 \\ d\vec{v}_2 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^2} d\xi^2 \end{cases} \quad (1.29)$$

L'area allora è l'area del parallelogramma, cioè

$$dA = |d\vec{v}_1| |d\vec{v}_2| \sin \theta = \sqrt{(d\vec{v}_1)^2 (d\vec{v}_2)^2 (1 - \cos^2 \theta)} \quad (1.30)$$

cioè, integrando nello spazio dei parametri,

$$A = \int d\xi^1 d\xi^2 \sqrt{\left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^1} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^1} \right) \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^2} \right) - \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^1} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^2} \right)^2} \quad (1.31)$$

Ora, vogliamo far vedere che questo funzionale della superficie è invariante per riparametrizzazioni. Prima di farlo, la riscriviamo in un modo più elegante:

Se S è una superficie descritta da $\vec{x}(\xi^1, \xi^2)$, allora un vettore tangente ad S , lungo ds è dato da $d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^i} d\xi^i$. Possiamo allora scrivere la metrica euclidea indotta sulla superficie come

$$ds^2 = d\vec{x} \cdot d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^i} \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^j} d\xi^i d\xi^j = g_{ij}(\xi) d\xi^i d\xi^j \quad (1.32)$$

Ci accorgiamo allora che, elegantemente, l'area si scrive più compattamente come

$$A = \int d\xi^1 d\xi^2 \sqrt{\det g(\xi)} \quad (1.33)$$

Ora, sotto una riparametrizzazione, vale sempre $ds^2 = d\tilde{s}^2$. In termini delle metriche indotte, questo vuol dire

$$g(\xi)_{ij} d\xi^i d\xi^j = \tilde{g}(\tilde{\xi})_{pq} d\tilde{\xi}^q d\tilde{\xi}^p \quad (1.34)$$

$$= \tilde{g}(\tilde{\xi})_{pq} \frac{d\tilde{\xi}^q}{d\xi^i} \frac{d\tilde{\xi}^p}{d\xi^j} d\xi^i d\xi^j \quad (1.35)$$

concludiamo che

$$g(\xi)_{ij} = \tilde{g}(\tilde{\xi})_{pq} \frac{d\tilde{\xi}^q}{d\xi^i} \frac{d\tilde{\xi}^p}{d\xi^j} \quad (1.36)$$

da cui

$$\sqrt{\det g} = \sqrt{\det \tilde{g}} |\det \tilde{M}| \quad (1.37)$$

se chiamo con $\tilde{M}$ la matrice jacobiana del cambio di coordinate, cioè $\tilde{M}_{ij} = \frac{\partial \tilde{\xi}^i}{\partial \xi^j}$. Chiamiamo invece M la matrice inversa. Troviamo allora

$$\int d\xi^1 d\xi^2 \sqrt{\det g} \xrightarrow{\text{cambio coordinate}} \int d\tilde{\xi}^1 d\tilde{\xi}^2 |\det M| \sqrt{\det g} |\det \tilde{M}| = \int d\tilde{\xi}^1 d\tilde{\xi}^2 \sqrt{\det g} \quad (1.38)$$

Se abbiamo una superficie spaziotemporale, cosa cambia? In particolare, noi siamo interessati al WS di una stringa. Parametizziamo la superficie con parametri σ, τ , cioè la superficie è l'immagine della mappa

$$x^\mu(\tau, \sigma), \quad \sigma \in [0, \sigma_1], \tau \in \mathbb{R} \quad (1.39)$$

Si assume anche che valga

$$\left. \frac{\partial x^0}{\partial \tau} \right|_{\sigma=0} \neq 0, \left. \frac{\partial x^0}{\partial \tau} \right|_{\sigma=\sigma_1} \neq 0 \quad (1.40)$$

così che se τ fluisce, anche il tempo x^0 fluisce. Il funzionale dell'area allora è dato da

$$A = \int d\sigma d\tau \sqrt{\left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \tau} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \sigma} \right)^2 - \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \tau} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \tau} \right) \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \sigma} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \sigma} \right)} \quad (1.41)$$

Nota che rispetto alla nostra definizione dell'area per una superficie spaziale, questa differisce per un segno meno nella radice. Intuitivamente, è possibile che passando dalla geometria euclidea a quella di Minkowski cambino dei segni. Dobbiamo però verificare se l'argomento della radice è positivo.

Per farlo, considera il vettore tangente alla superficie. Eccetto per un punto finito di punti, il vettore tangente è definito da un vettore di tipo tempo, e un vettore di tipo spazio. Ma poiché la WS è tracciata dal moto fisico di una stringa, il vettore tangente ad ogni punto deve essere di tipo tempo. La famiglia dei vettori tangenti è data da (a meno di fattori scala globali)

$$V^\mu(\lambda) = \frac{\partial X^\mu}{\partial \tau} + \lambda \frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma} \quad (1.42)$$

Imponiamo che questo sia di tipo tempo. Deve dunque valere

$$V^2 = \lambda^2 (\partial_\sigma X)^2 + 2\lambda (\partial_\sigma X)(\partial_\tau X) + (\partial_\tau X)^2 > 0 \quad (1.43)$$

affinché valga per ogni λ , il discriminante deve essere negativo. Ma il discriminante è meno l'argomento della nostra radice! dunque la nostra scelta era corretta.

Assumiamo quindi che l'azione per la stringa sia proporzionale al funzionale d'area. Dimensionalmente, cosa ci manca? Qualunque siano le dimensioni di σ, τ (anche se da ora in poi le fissiamo a L, T), l'area ha le dimensioni L^2 , mentre un'azione ML^2/T . Ci serve un fattore M/T . Possiamo prendere T_0/c , se T_0 è la *tensione* della stringa. Scriviamo dunque,

$$S = -\frac{T_0}{c} \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \sqrt{(\dot{X} \cdot X')^2 - (\dot{X})^2 (X')^2} \quad (1.44)$$

che è la famosa azione di *Nambu-Goto*. Per costruzione, è invariante sotto riparametrizzazioni.

Claim 1.4.1

Le equazioni del moto che seguono dall'azione di Nambu-Goto sono date da

$$\frac{\partial P_\mu^\tau}{\partial \tau} + \frac{\partial P_\mu^\sigma}{\partial \sigma} = 0 \quad (1.45)$$

Dove P_μ^τ , P_μ^σ sono i momenti coniugati, dati da

$$P_\mu^\tau = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{X}} = -\frac{T_0}{c} \frac{(\dot{X} \cdot X') X'_\mu - (X')^2 \dot{X}_\mu}{\sqrt{(\dot{X} \cdot X')^2 - (\dot{X})^2 (X')^2}} \quad (1.46)$$

$$P_\mu^\sigma = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X'} = -\frac{T_0}{c} \frac{(\dot{X} \cdot X') \dot{X}_\mu - (\dot{X})^2 X'_\mu}{\sqrt{(\dot{X} \cdot X')^2 - (\dot{X})^2 (X')^2}} \quad (1.47)$$

Per vedere questo, come al solito variamo l'azione:

$$\delta S(\dot{X}, X') = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{X}^\mu} \frac{\partial(\delta x^\mu)}{\partial \tau} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X'^\nu} \frac{\partial(\delta x^\nu)}{\partial \sigma} \right) \quad (1.48)$$

come al solito si integra per parti,

$$\delta S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \left(\partial_\tau (\delta x^\mu P_\mu^\tau) + \partial_\sigma (\delta x^\mu P_\mu^\sigma) - \delta x^\mu (\partial_\tau P_\mu^\tau + \partial_\sigma P_\mu^\sigma) \right) \quad (1.49)$$

Per condizioni iniziali fisse, cioè imponendo $\delta x^\mu(\tau_i, \sigma) = \delta x^\mu(\tau_f, \sigma) = 0$, la prima parte è sempre nulla. L'ultima invece, corrisponde alle equazioni del moto. Il termine in mezzo invece dà le condizioni al bordo:

$$\int_{\tau_i}^{\tau_f} (\delta x^\mu P_\mu^\sigma)|_0^{\sigma_1} = 0 \quad (1.50)$$

che possono essere di due tipi:

1. Dirichlet: estremi fissi, quindi $\frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}(\tau, \sigma^*) = 0$, se $\mu \neq 0$ e $\sigma^* = 0, \sigma^1$
2. Neumann, estremi liberi (solo per stringhe aperte) cioè $P_\mu^\sigma(\tau, \sigma^*) = 0$

chiaramente, le condizioni al bordo di Dirichlet implicano che vi siano degli oggetti (membrane) dove le stringhe si attaccano.

Ora, le equazioni del moto che derivano direttamente dall'azione sono orribili. Possiamo però sfruttare la libertà per riparametrizzazioni, per scriverle in una forma più accettabile. Una soluzione (parziale) è la *gauge statica*: questa consiste nel legare $x^0 = ct$, ovvero la coordinata temporale nel target space, a τ , uno dei due parametri della WS. Dunque, per ogni punto q nel WS, imponiamo $\tau(q) = t$. Nel sistema di riferimento scelto, le linee a τ costante sono quindi le linee a t costante, cioè le *stringhe statiche*. Con questa scelta, vale che

$$\frac{\partial X^\mu}{\partial \tau} = \left(\frac{\partial X^0}{\partial \tau}, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \tau} \right) = \left(c, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \tau} \right) \quad (1.51)$$

$$\frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma} = \left(\frac{\partial X^0}{\partial \sigma}, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \right) = \left(0, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \right) \quad (1.52)$$

Esempio 1.4.1 (L'azione per stringa statica tesa)

Consideriamo la seguente situazione: abbiamo una stringa con estremi fissi, in $x^1 = 0$ ed $x^1 = a > 0$. Tutte le sue altre coordinate sono zero. Fissiamo allora la gauge statica, $X^0 = c\tau$. Per le altre coordinate, se la stringa è statica, troviamo

$$\begin{cases} X^1(\tau, \sigma) = f(\sigma) : f(0) = 0, f(\sigma_1) = 0, f' > 0 \\ X^2, \dots, d = 0 \end{cases} \quad (1.53)$$

Le derivate delle coordinate di stringa si trovano allora facilmente:

$$\begin{cases} \dot{X}^\mu = (c, 0, \dots, 0) \\ X'^\nu = (0, f', 0, \dots, 0) \end{cases} \implies \begin{cases} (\dot{X})^2 = -c^2 \\ (X')^2 = f'^2 \\ \dot{X} \cdot X' = 0 \end{cases} \quad (1.54)$$

Avendo tutti gli ingredienti, calcoliamo facilmente l'azione di Nambu-Goto:

$$S = -\frac{T_0}{c} \int_{t_i}^{t_f} dt \int_0^{\sigma_1} d\sigma \sqrt{(cf')^2} = -T_0 \int_{t_i}^{t_f} dt f|_0^{\sigma_1} = -T_0 \int_{t_1}^{t_f} a dt \quad (1.55)$$

L'integranda rispetto al tempo dell'azione è la lagrangiana, $L = T - V$. Poiché stiamo trattando la stringa statica, il termine cinetico è nullo, troviamo che per la stringa statica

$$V = T_0 a \quad (1.56)$$

In particolare, questa è la quantità di energia che serve a creare una stringa di lunghezza a . La massa a riposo per unità di lunghezza è allora data da

$$\mu_0 c^2 = V/a \implies \mu_0 = \frac{T_0}{c^2} \quad (1.57)$$

dunque la massa della stringa è dovuta *tutta e sola* alla tensione della stringa. Poiché la stringa è statica, l'eq. del moto sono date da

$$\partial_\sigma P_\sigma^\mu = 0 \quad (1.58)$$

Calcoliamo il momento:

$$P_\sigma^\mu = -\frac{T_0}{c} \frac{c^2 X'^\mu}{cf'} = -T_0 \frac{X'^\mu}{f'} = -T_0(0, 1, 0, \dots, 0) \quad (1.59)$$

ed è dunque automaticamente soddisfatta.

1.4.2 Parametrizzazione e velocità della stringa

Veniamo ora a parlare di velocità sulla stringa. Un candidato ingenuo è dato da

$$\partial_t X \quad (1.60)$$

d'altra parte, c'è un problema: questa definizione dipende manifestamente dalla parametrizzazione in σ . Il risultato sarà che dovremo considerare solo il moto trasverso della stringa.

Infatti, la stringa non ha sottostrutture: non posso dire che un punto sulla stringa è andato su un punto dell'altra stringa, senza fissare una parametrizzazione. Questo mostra che il moto longitudinale sia non fisico.

Poiché la velocità abbiamo richiesto che sia invariante per riparametrizzazioni, viene naturale chiedersi come sarebbe possibile scrivere la lagrangiana in termini della velocità trasversa. Diamo allora un'espressione esplicita per la velocità trasversa:

Sia s un parametro a piacimento, che misuri la lunghezza lungo la stringa. Si prende allora una stringa, ad un istante fissato nel tempo e si definisce la lunghezza $s(\sigma)$. Prendiamo poi $ds = |d\vec{X}| = |\partial_\sigma \vec{X}| d\sigma$ ovvero la lunghezza del vettore infinitesimo $d\vec{X}$, rispetto ad un intervallo $d\sigma$. Dunque, $\frac{ds}{d\sigma} = |\partial_\sigma \vec{X}|$.

Consideriamo allora il vettore $\partial_s \vec{X}$. Ha alcune proprietà interessanti, ad esempio vale

$$\partial_s \vec{X} \cdot \partial_s \vec{X} = (\partial_\sigma \vec{X} \cdot \partial_\sigma \vec{X}) \left(\frac{d\sigma}{ds} \right)^2 = 1 \quad (1.61)$$

Inoltre, $\partial_s \vec{X} \parallel \partial_\sigma \vec{X}$, che è tangente alla stringa, perché è calcolato a t fissato. (ricorda che la stringa è una linea sul WS con t fissato). Dunque, $\partial_s \vec{X}$ è un vettore tangente ed unitario alla stringa. Possiamo allora usarlo per definire la velocità trasversa:

$$\vec{v}_\perp = \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} - \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial s} \right) \frac{\partial \vec{X}}{\partial s} \quad (1.62)$$

Ora possiamo provare a scrivere la lagrangiana in termini di questa, mettendoci nella gauge statica.

Notiamo che il quadrato di questa velocità è dato da

$$v_\perp^2 = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \right)^2 - \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial s} \right)^2 \quad (1.63)$$

dove abbiamo usato che $\partial_s \vec{X}$ ha norma 1. Per calcolare l'azione ho bisogno di calcolare

$$\dot{X}^2 = c^2 + \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \right)^2, \quad X'^2 = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \right)^2, \quad (\dot{X} \cdot X') = \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \quad (1.64)$$

così che l'azione di Nambu-Goto assume una forma familiare in termine della velocità trasversa:

$$S_{NG} = -T_0 \int_{t_i}^{t_f} \int_0^{\sigma_1} dt d\sigma \frac{ds}{d\sigma} \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \quad (1.65)$$

cioè la lagrangiana è data da $L = -T_0 \int ds \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}}$. Questa ha la forma di energia a riposo volte un fattore relativistico, proprio come la particella.

Diamo allora una parametrizzazione esplicita. Al tempo $t = 0$, si assegni una parametrizzazione σ della stringa. Si prenda poi la stringa al tempo $t = \epsilon$: sulla superficie della stringa, si considerano i vettori tangenti alla stringa, e si interseca questi con la stringa al tempo ϵ . Se σ_0 era la parametrizzazione sulla stringa al tempo 0, assegno σ_0 al tempo ϵ al punto che viene intersecato dalla perpendicolare. Poi estendo a tutti i tempi la procedura, ed ho trovato una particolare parametrizzazione, che ha la comoda proprietà che le linee a σ costante sono ortogonali alle linee con t costante, cioè le stringhe. In formule,

$$\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} = 0 \implies \vec{v}_\perp = \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \quad (1.66)$$

con questa scelta, si dimostra che i momenti sono dati da

$$P^{\mu\tau} = \frac{T_0}{c^2} \frac{\frac{ds}{d\sigma}}{\sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}}} \frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}, \quad P^{\mu\sigma} = -T_0 \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma} \quad (1.67)$$

E le equazioni del moto sono sempre date da

$$\frac{\partial P^{\tau\mu}}{\partial \tau} = -\frac{\partial P^{\sigma\mu}}{\partial \sigma} \quad (1.68)$$

Nella gauge statica, $X^0 = c\tau$, cioè $P^{\sigma 0} = 0$, $P^{\tau 0} = -\frac{T_0}{c} \frac{ds}{d\sigma} \left(1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}\right)^{-1/2}$. Dunque la seconda è una costante nel tempo.

Nelle direzioni spaziali, invece, se si definisce

$$T_{eff} = T_0 \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}}, \quad \mu_{eff} = \frac{T_0}{c^2} \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \quad (1.69)$$

Le equazioni del moto diventano

$$\mu_{eff} \frac{\partial \vec{v}_\perp}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(T_{eff} \frac{\partial \vec{X}}{\partial s} \right) \quad (1.70)$$

Una parametrizzazione esplicita possibile, si ottiene richiedendo che ogni segmento di lunghezza σ abbia la stessa energia. Per farlo, definiamo

$$A(\sigma) = \frac{ds}{d\sigma} \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \quad (1.71)$$

nota che se scelgo $A(\sigma) = 1$, allora l'eq. si riduce a

$$\ddot{\vec{X}} = c \vec{X}'' \quad (1.72)$$

Nota che la condizione di parametrizzazione può essere vista come un vincolo differenziale, in quanto posso scriverla come

$$\left(\frac{ds}{d\sigma} \right)^2 + \frac{v_\perp^2}{c^2} = 1 \quad (1.73)$$

oppure, (moltiplicando per $\partial_s \vec{X}^2 = 1$ il primo fattore, e ricordando che $v_\perp = \partial_t \vec{X}$ in questa parametrizzazione)

$$\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right)^2 + \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 = 1 \quad (1.74)$$

Gli altri vincoli vengono dalle condizioni al contorno. In particolare, se abbiamo estremi liberi, alla contorno vale $\vec{P}^\sigma = 0$, ma poiché

$$\vec{P}^\sigma = -T_0 \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \frac{d\sigma}{ds} \frac{d\vec{X}}{d\sigma} = -T_0 \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \quad (1.75)$$

Dunque le condizioni al contorno dicono

$$\left. \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \right|_{\sigma=0} = \left. \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \right|_{\sigma=\sigma_1} = 0 \quad (1.76)$$

1.4.3 Studio delle equazioni del moto

Molto bene: adesso abbiamo tutti gli ingredienti per risolvere le equazioni. La più generale soluzione dell'equazione delle onde si scrive

$$\vec{X}(t, \sigma) = \frac{1}{2} (\vec{F}(ct + \sigma) + \vec{G}(ct - \sigma)) \quad (1.77)$$

Imponiamo le condizioni al bordo: per $\sigma = 0$, otteniamo $\vec{F}'(u) = \vec{G}'(u)$ dove u indica un generico argomento della funzione. Dunque, $\vec{F}(u) = \vec{G}(u) + \text{cost.}$ Possiamo riassorbire la costante nella definizione di $\vec{F}$ e scrivere quindi che

$$\vec{X}(\sigma, t) = \frac{1}{2} (\vec{F}(ct + \sigma) + \vec{F}(ct - \sigma)) \quad (1.78)$$

Invece, per $\sigma = \sigma_1$, avremo che $\vec{F}'(u) = \vec{F}'(u + 2\sigma)$, cioè $\vec{F}$ è quasi-periodica. Scriviamo allora

$$\vec{F}(u + 2\sigma_1) = \vec{F}(u) + \frac{2\sigma_1}{c} \vec{v}_0 \quad (1.79)$$

Ci resta da imporre la condizione di parametrizzazione. La scriviamo nel modo seguente:

$$\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right)^2 + \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right)^2 + \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 \pm \underbrace{\frac{2}{c} \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial t}}_{=0} = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \pm \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 = 1 \quad (1.80)$$

Per imporle, calcoliamo

$$\begin{cases} \partial_\sigma \vec{X} = \frac{1}{2} (\vec{F}'(ct + \sigma) - \vec{F}'(ct - \sigma)) \\ \frac{1}{c} \partial_t \vec{X} = \frac{1}{2} (\vec{F}'(ct + \sigma) + \vec{F}'(ct - \sigma)) \end{cases} \implies \partial_\sigma \vec{X} \pm \partial_t \vec{X}/c = \pm \vec{F}'(ct \pm \sigma) \quad (1.81)$$

Dunque, per qualsiasi argomento u , abbiamo che

$$\left| \frac{dF(u)}{du} \right|^2 = 1 \implies |dF| = |du| \quad (1.82)$$

Per capire cosa descrive $F(u)$, ricorda che il moto dell'estremo $\sigma = 0$ è descritto da $\vec{X}(t, 0) = \vec{F}(ct)$, dunque $\vec{F}(u)$ è la posizione del p.to $\sigma = 0$ al tempo u/c .

Torniamo adesso alla costante $\vec{v}_0$ che abbiamo introdotto, e indaghiamo il suo significato fisico. Poiché vale

$$\vec{F}(2\sigma_1) = \vec{F}(0) + \frac{2\sigma_1}{c} \vec{v}_0 \implies \vec{X}\left(\frac{2c_1}{t}, 0\right) = \vec{X}(0, 0) + \frac{2\sigma_1}{c} \vec{v}_0 \quad (1.83)$$

cioè $\vec{v}_0$ è la velocità media del punto $\sigma = 0$ nell'intervallo di tempo $[0, 2\sigma_1/c]$. Si mostra che è questo vale anche per tutti gli altri punti.

Esempio 1.4.2 (Stringa in rotazione uniforme)

Consideriamo ora come esempio una particolare configurazione di stringa. Prendiamo una rotazione rigida della stringa nel piano x, y intorno al suo centro, che supponiamo essere in $0, 0$.

Assumiamo che la stringa abbia lunghezza ℓ , e pulsazione ω . Vogliamo determinare $F(u)$ in questo caso. Il punto $\vec{x}(t, 0)$ si muove secondo

$$\vec{x}(t, 0) = \frac{\ell}{2} (\cos(\omega t), \sin(\omega t)) \quad (1.84)$$

Questo ci dice che $F(u) = 1/2(\cos(\omega u/c), \sin(\omega u/c))$, e si ottiene inoltre $\vec{v}_0 = 0$. Imponiamo allora la periodicità, cioè

$$F(u + 2\sigma_1) = F(u) \implies \frac{\omega}{c} 2\sigma_1 = 2\pi m \implies \frac{\omega}{c} = \frac{\pi}{\sigma_1} m \quad (1.85)$$

Quale m devo prendere? Guardiamo $\vec{X}(0, \sigma)$:

$$\vec{X}(0, \sigma) = \frac{1}{2} (\vec{F}(\sigma) + \vec{F}(-\sigma)) = \frac{\ell}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi m \sigma}{\sigma_1}\right), 0 \right) \quad (1.86)$$

Dunque se $m = 1$, in $\sigma \in [0, \sigma_1]$ ho la stringa, invece se $m > 1$ la sto avvolgendo più volte. Scegliamo allora $m = 1$:

$$\frac{\omega}{c} = \frac{\pi}{\sigma_1} = \pi \frac{T_0}{E} \quad (1.87)$$

Poiché sappiamo che $|F'|^2 = 1$, allora

$$\frac{dF}{du} = \frac{\omega \ell}{2c} \left(-\sin\left(\frac{\omega u}{c}\right), \cos\left(\frac{\omega u}{c}\right) \right) \implies \left(\frac{\omega \ell}{2c} \right)^2 = 1 \quad (1.88)$$

Dunque scopriamo come sono legate ℓ e l'energia della stringa:

$$\ell = \frac{2c}{\omega} = \frac{2\sigma_1}{\pi} = \frac{2}{\pi} \frac{E}{T_0} \quad (1.89)$$

cioè la stringa è di un fattore $2/\pi$ più corta rispetto alla stringa statica.

In particolare, osserviamo che la relazione

$$\frac{\omega \ell}{2} = c \quad (1.90)$$

implica, dove $v = c$ cioè agli estremi, che $\omega \propto 1/E$.

Possiamo tornare allo studio delle soluzioni delle equazioni del moto, e chiederci ora cosa succede per la stringa chiusa: ancora una volta, la soluzione più generale è data da

$$\vec{X}(u, v) = \frac{1}{2}(\vec{F}(u, v) + \vec{G}(u, v)) \quad (1.91)$$

con $u = ct + \sigma$, $v = ct - \sigma$. Similmente al caso della stringa aperta, si trova

$$\begin{cases} F'(u) = \partial_\sigma X + (1/c)\partial_t X \\ G'(v) = \partial_\sigma X - (1/c)\partial_t X \end{cases} \implies |F'|^2 = |G'|^2 = 1 \quad (1.92)$$

Le condizioni al contorno ora invece diventano condizioni di periodicità, ovvero

$$\vec{X}(t, \sigma + \sigma_1) = \vec{X}(t, \sigma) \implies F(u + \sigma_1) - F(u) = G(v + \sigma_1) - G(v) \quad (1.93)$$

Potrebbe esistere un punto u_0, v_0 t.c.

$$\vec{F}'(u_0) = \vec{G}'(v_0) \quad (1.94)$$

Allora, se indichiamo σ_0, t_0 i parametri che otteniamo invertendo u_0, v_0 , vale

$$\frac{1}{c}\partial_t \vec{X}(t_0, \sigma_0) = \vec{F}'(u_0) \quad (1.95)$$

poiché $\vec{F}'$ è un vettore unitario, allora si ottiene che in quel punto la velocità della stringa è pari a c . Poiché vale anche $\partial_\sigma \vec{X} = 0$, la stringa ha una *cuspid*e in quel punto.

1.4.4 Correnti conservate sul WS

In generale, sappiamo dal teorema di Noether che una simmetria di una lagrangiana implica una carica conservata, e una simmetria nella densità lagrangiana implica una corrente conservata. In particolare, data un'azione

$$S = \int \prod_{\alpha=0}^k d\xi^\alpha \mathcal{L}(\phi^a, \partial_\alpha \phi^a) \quad (1.96)$$

dove a è un indice che corre sui campi, e α è un'indice che corre sulle dimensioni dello spaziotempo. Se facciamo una trasformazione infinitesima,

$$\phi^a(\xi) \rightarrow \phi^a(\xi) + \delta\phi^a(\xi) = \phi^a(\xi) + \epsilon^i k_i^a(\phi) \quad (1.97)$$

In particolare, se questa trasformazione lascia invariata $\mathcal{L}$, allora si ha che, dato

$$\epsilon^i J_i^a = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha \phi)} \delta \phi^a \quad (1.98)$$

vale allora $\partial_\alpha J_i^\alpha = 0$. Dove qui l'indice i corre sulle simmetrie.

Cosa succede nel caso io abbia un WS? L'indice α in questo caso correrà sulle coordinate del WS. In questo senso, si parla di WS correnti. I campi ϕ^a sono sostituiti dalle coordinate di stringa X^μ .

Un esempio notevole è quello del momento. Considera la variazione *costante*

$$\delta X^\mu(\tau, \sigma) = \epsilon^\mu \quad (1.99)$$

questa lascia invariata la lagrangiana di Nambu-Goto, perché ricorda che questa dipende solamente dalle derivate di X^μ . Le correnti sono allora del tipo

$$\epsilon^\mu J_\mu^\alpha = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha X^\mu)} \delta X^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha X^\mu)} \epsilon^\mu \quad (1.100)$$

Troviamo allora che le componenti della corrente trasformata per traslazioni rigide sono

$$(J_\mu^0, J_\mu^1) = (P_\mu^\tau, P_\mu^\sigma) \quad (1.101)$$

e l'eq. di conservazione è $\partial_\alpha J_\mu^\alpha = 0$, i.e. le equazioni del moto.

Quali sono le cariche conservate? nella gauge statica,

$$P_\mu(\tau) = Q_\mu(\tau) = \int_0^{\sigma_1} P_\mu^\tau(\tau, \sigma) d\sigma \quad (1.102)$$

Ora, queste sono effettivamente conservate date tutte le condizioni al contorno? Calcoliamo

$$\frac{dP_\mu}{d\tau} = \int_0^{\sigma_1} \frac{\partial P_\mu^\tau}{\partial \tau} d\sigma = - \int_0^{\sigma_1} \frac{\partial P_\mu^\sigma}{\partial \sigma} d\sigma = -P_\mu^\sigma|_0^{\sigma_1} \quad (1.103)$$

Ora, ci sono tre possibili casi:

1. stringa chiusa: devo identificare $\sigma_1, 0$ e quindi il momento totale si conserva
2. stringa aperta, con condizioni di Neumann (estremi liberi): agli estremi il momento si annulla, e quindi si conserva.
3. stringa aperta, con condizioni di Dirichlet: $\frac{dP_\mu}{d\tau} \neq 0$.

osserva che queste correnti sono correnti sul WS, non nello spaziotempo, nel senso che sono nulle ovunque se non sul WS.

Come ottengo le leggi di conservazione sullo spaziotempo? posso sfruttare l'invarianza per riparametizzazioni. Fissiamo ad esempio la gauge-statica, $t = \tau$.

Claim 1.4.2

Ogni curva sul WS può essere usata per calcolare il momento conservato p_μ .

: Per il momento, abbiamo solo calcolato il momento, integrando p_μ^τ su una linea con τ costante.

Un modo di pensare a questa operazione è che abbiamo preso il flusso della densità di momento, vista come una corrente due-dimensionale. In effetti, data una curva chiusa Γ che rinchiude una regione R del WS, il flusso uscente è dato da

$$P_\mu(\Gamma) = \oint_\Gamma (P_\mu^\tau d\sigma - P_\mu^\sigma d\tau) \quad (1.104)$$

usando il teorema della divergenza, troviamo

$$P_\mu(\Gamma) = \int_R \left(\frac{dp_\mu^\tau}{d\tau} + \frac{dp_\mu^\sigma}{d\sigma} \right) = 0 \quad (1.105)$$

grazie alle equazioni del moto. L'integranda è nulla allora per ogni curva chiusa. Supponiamo di costruire la nostra curva chiusa nel modo seguente: una curva γ che ha come inizio $\sigma = 0$, come fine $\sigma = \sigma_1$, una curva β su σ_1 costante, una curva $\bar{\gamma}$ che inizia in σ_1 e finisce in $\sigma = 0$, e infine una curva α con $\sigma = 0$ costante che chiude il cerchio. Sappiamo che $P(\Gamma) = 0$, e anche le curve su σ costanti, perché lì $d\sigma = 0$ e contribuisce solo il termine P_μ^σ che però per le condizioni al contorno è nullo. Dunque abbiamo trovato che

$$\int_\gamma (P_\mu^\tau d\sigma - P_\mu^\sigma d\tau) = \int_{\bar{\gamma}} (P_\mu^\tau d\sigma - P_\mu^\sigma d\tau) \quad (1.106)$$

Dunque ottengo la stessa quantità integrando su qualunque curva. Se prendiamo una curva a τ costante, ritroviamo il punto di partenza. ⊕

1.4.5 Simmetrie di lorentz e correnti

Siccome S_{NG} è uno scalare di lorentz, le trasformazioni di lorentz delle coordinate x^μ sono simmetrie. Vogliamo allora determinare le cariche conservate.

Ricorda che una trasformazione di lorentz, è una trasformazione (se la prendiamo infinitesima)

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon^{\mu\nu} x_\nu \quad | \quad \delta(\eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu) = 0 \quad (1.107)$$

con ϵ costante e opportunamente piccolo. Questo impone delle condizioni su $\epsilon^{\mu\nu}$:

$$2\eta_{\mu\nu} \delta(x^\mu) x^\nu = 2\eta_{\mu\nu} \epsilon^{\mu\rho} x_\rho x_\nu = 2\epsilon^{\mu\rho} x_\rho x_\mu = 0 \quad (1.108)$$

ciò impone quindi che la parte simmetrica di $\epsilon^{\mu\nu}$ sia zero, ovvero ϵ è un tensore antisimmetrico.

Studiamo allora l'invarianza di $\mathcal{L}$ sotto queste trasformazioni. Usando nuovamente la notazione $\xi = (\tau, \sigma)$, la lagrangiana è costruita a partire da pezzi del tipo

$$\eta_{\mu\nu} \frac{\partial x^\mu}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial \xi^\beta} \quad (1.109)$$

e ognuno di questi è lorentz-invariante. Infatti, prendiamo

$$\delta \left(\eta_{\mu\nu} \frac{\partial x^\mu}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial \xi^\beta} \right) = \eta_{\mu\nu} \left(\frac{d\delta(x^\mu)}{d\xi^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial \xi^\beta} + \frac{\partial x^\mu}{\partial \xi^\alpha} \frac{d\delta(x^\nu)}{d\xi^\beta} \right) \quad (1.110)$$

$$= \eta_{\mu\nu} \left(\epsilon^{\mu\rho} \frac{dx_\rho}{d\xi^\alpha} \frac{dx^\nu}{d\xi^\beta} + \epsilon^{\nu\rho} \frac{dx^\mu}{d\xi^\alpha} \frac{dx_\rho}{d\xi^\beta} \right) \quad (1.111)$$

$$= \epsilon_{\nu\rho} \frac{dx^\rho}{d\xi^\alpha} \frac{dx^\nu}{d\xi^\beta} + \epsilon_{\mu\rho} \frac{dx^\mu}{d\xi^\alpha} \frac{dx^\rho}{d\xi^\beta} = 0 \quad (1.112)$$

Poiché $\epsilon_{\nu\rho}$ è antisimmetrico.

Veniamo allora a determinare quali sono le correnti conservate. Avremmo, dal teorema di Noether,

$$\epsilon^{\mu\nu} J_{\mu\nu}^\alpha = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha X^\mu)} \delta(X^\mu) \quad (1.113)$$

$$= P_\mu^\alpha \epsilon^{\mu\nu} X_\nu = -\frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu} (X_\mu P_\nu^\alpha - X_\nu P_\mu^\alpha) \quad (1.114)$$

è naturale allora definire

$$M_{\mu\nu}^\alpha = X_\mu P_\nu^\alpha - X_\nu P_\mu^\alpha \quad (1.115)$$

Per costruzione è antisimmetrico, e obbedisce all'equazione di conservazione

$$\frac{\partial M_{\mu\nu}^\tau}{\partial \tau} + \frac{\partial M_{\mu\nu}^\sigma}{\partial \sigma} = 0 \quad (1.116)$$

Le cariche si ottengono lungo una curva qualsiasi γ del WS secondo

$$M_{\mu\nu} = \int_\gamma (M_{\mu\nu}^\tau d\sigma - M_{\mu\nu}^\sigma d\tau) \quad (1.117)$$

ad esempio, se sono in 4 dimensioni, allora ho 6 cariche conservate, che sono dovute all'invarianza dalle tre rotazioni spaziali, e dai tre boost. Dunque, $M_{\mu\nu}^\tau$ è la densità di momento angolare sulla stringa, si definisce

$$L_i = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} M^{jk} \quad (1.118)$$

Ad esempio, se ho un boost, la carica è data da

$$M^{0i} = \int d\sigma (c\tau P^{\tau i} - X^i P^{\tau 0}) = ct P^i - \int d\sigma X^i P^{\tau 0} \quad (1.119)$$

2.1 Motivazione allo studio della supersimmetria e teorema di Coleman-Mandula

Perché i fisici nello scorso secolo si sono interessati così tanto alla supersimmetria? Vi sono molte ragioni teoriche, anche di carattere molto pratico. Cominciamo con una di carattere più filosofico: il modello standard delle particelle elementari (SM) ha due simmetrie: una di spaziotempo, cioè la simmetria sotto il gruppo di Poincaré, ed un'altra invece detta interna, cioè la simmetria di gauge sotto il gruppo $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Possiamo indicare l'algebra globale come $\mathcal{P} + g$. Vorremmo unificare queste simmetrie, all'interno di una algebra $\mathcal{A}$ più grande, che le contiene ($\mathcal{P} \oplus g \subset \mathcal{A}$), in modo non banale.

Inoltre, lo SM ha due tipi di particelle: fermioni e bosoni. Se si trovasse una simmetria che connettesse questi due tipi di particelle così diverse, sarebbe un grande progresso teorico. Un'ultima motivazione sono le divergenze quadratiche del SM. Ad esempio, se uno calcola i controtermini alla massa di Higgs, δM_H , diciamo introducendo come tecnica di regolazione un cut-off, allora si trova che $\delta M_H \propto \Lambda^2$. In teoria dei campi si dice che la teoria ha delle divergenze quadratiche. Per lo SM, $\Lambda \approx 10^{14/15}$ GeV. Si ha quindi che la sottrazione di due termini enormi, dà luogo ad una massa $M_H \approx 100$ GeV. Questo non è impossibile, ma poco probabile: si tratta del cosiddetto *problema della gerarchia*. Il problema non si pone in SUSY perché le divergenze sono al massimo logaritmiche. Infine, nello SM si pensa che le tre costanti e, g_W, g_s tendano, con l'aumento dell'energia, allo stesso valore g' . Sembra che la convergenza sia più semplice se si assume che la teoria è supersimmetrica.

Come possiamo allargare la simmetria di una teoria, nel modo non banale descritto all'inizio? Cominciamo a studiare una teoria di uno scalare autointeragente, con la seguente azione:

$$S = \int d^4x (\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi)^\dagger - m^2 \phi \phi^\dagger - \lambda^2 (\phi \phi^\dagger)^2 \quad (2.1)$$

Quali sono le simmetrie della teoria? Certamente abbiamo la simmetria di Poincaré, $\mathcal{P}$. Inoltre, considera la trasformazione $\phi \rightarrow e^{i\alpha} \phi$. Si tratta di una trasformazione globale di fase, cioè del gruppo $U(1)$, ed è immediato vedere che realizza una simmetria della lagrangiana.

Queste simmetrie portano (teo. di Noether) delle cariche conservate. Osserviamole:

1. Simmetrie di spaziotempo $\mathcal{P}$: Abbiamo invarianza sotto traslazioni spaziotemporali, che porta il tensore di energia momento ad avere divergenza nulla, $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$. Definendo poi $P^\nu = \int d^3x T^{0\nu}$, si ottiene che $\frac{d}{dt} P^\nu = 0$. Invece, la simmetria rispetto alle trasformazioni di Lorentz porta alla conservazione del momento angolare: vale $\partial_\mu J^{\mu, \nu\rho} = 0$, definendo $J^{\nu\rho} = \int d^3x J^{0, \nu\rho}$, si ottiene allora $\frac{d}{dt} J^{\nu\rho} = 0$.
2. Dalla simmetria interna, la corrente conservata è data da $j^\mu = i(\phi(\partial^\mu \phi^\dagger) - (\partial^\mu \phi)\phi^\dagger)$. Infatti, si calcola immediatamente la sua divergenza,

$$\partial_\mu j^\mu = i(\phi \square \phi^\dagger - (\square \phi) \phi^\dagger) \quad (2.2)$$

Per sapere come è fatto $\square \phi$, calcola le equazioni del moto:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \implies -m^2 \phi^\dagger - 2\lambda \phi (\phi \phi^\dagger) = \square \phi^\dagger \implies \begin{cases} \phi \square \phi^\dagger = -m^2 \phi \phi^\dagger - 2\lambda (\phi \phi)^\dagger \\ \phi^\dagger \square \phi = -m^2 \phi \phi^\dagger - 2\lambda (\phi \phi)^\dagger \end{cases} \quad (2.3)$$

Immediatamente vediamo che la corrente è conservata. Come solito definiamo allora $Q = \int d^3x j^0$, così che $\frac{d}{dt}Q = 0$. Come è fatta quindi l'algebra di simmetria? L'algebra di Poincaré è la solita,

$$\begin{aligned} [P_\mu, P_\nu] &= 0 \\ [P_\mu, J_{\nu\rho}] &= \eta_{\mu\nu}P_\rho - \eta_{\mu\rho}P_\nu \\ [J_{\mu\nu}, J_{\rho\sigma}] &= \eta_{\mu\nu}J_{\rho\sigma} + \eta_{\nu\rho}J_{\mu\sigma} - \eta_{\mu\rho}J_{\nu\sigma} - \eta_{\nu\sigma}J_{\mu\rho} \end{aligned} \quad (2.4)$$

Invece la carica Q realizza l'algebra di $\mathfrak{u}(1)$, poiché semplicemente $[Q, Q] = 0$. Inoltre, poiché vale

$$\begin{aligned} [Q, P_\mu] &= 0 \\ [Q, J_{\mu\nu}] &= 0 \end{aligned} \quad (2.5)$$

L'algebra totale è la somma diretta, $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{u}(1)$. Vorremmo allargare questa algebra di simmetria. Come facciamo? Osserviamo che è molto semplice allargare la simmetria interna, ad esempio ampliando $\mathfrak{u}(1) \rightarrow \mathfrak{u}(N)$. Basta scrivere la lagrangiana in termini di un multipletto di N campi:

$$S = \int d^4x (\partial_\mu \phi) \partial^\mu \phi^\dagger - m^2 \phi \phi^\dagger - \lambda (\phi \phi^\dagger), \quad \phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_N \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^N, \quad \phi^\dagger = (\phi_1^*, \dots, \phi_N^*) \quad (2.6)$$

La azione è allora simmetrica sotto la trasformazione dei campi $\phi \rightarrow U\phi$, $\phi^\dagger \rightarrow \phi^\dagger U^\dagger$, a patto che valga $UU^\dagger = 1$, cioè $U \in U(N)$. Quali sono adesso le cariche conservate? Se si definisce

$$Q_a = i \int d^3x \phi^\dagger T_a \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi \quad (2.7)$$

Se T_a è una base hermitiana dell'algebra (dunque una matrice $N \times N$). Si hanno quindi N^2 cariche conservate. Le cariche soddisfano l'algebra di $\mathfrak{u}(N)$, cioè vale $[Q_a, Q_b] = f_{abc} Q_c$. Ancora una volta come prima, vale

$$\begin{aligned} [Q_a, P^\mu] &= 0 \\ [Q_a, J^{\mu\nu}] &= 0 \end{aligned} \quad (2.8)$$

Cioè l'algebra globale è sempre $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{u}(N)$. Se allargare il gruppo di simmetria interno è apparentemente semplice, vediamo che è più complicato introdurre una algebra di simmetria che sia diversa da un gruppo interno in somma diretta con Poincaré. Immaginare una teoria dove la carica non commuti con le traslazioni è abbastanza difficile. Invece potremmo pensare ad una teoria dove vale $[Q_a, J^{\mu\nu} \neq 0]$. Questo vuol dire che la carica non è più uno scalare di spaziotempo. D'altra parte, questo vuol dire avere una carica vettoriale, o tensoriale, oltre a $P^\mu, J^{\mu\nu}$. Questa simmetria dovrebbe anche collegare stati di spin diverso, perchè

$$Q_\mu |0\rangle = |1\rangle \quad (2.9)$$

Se $|0\rangle$ ha spin 0 e $|1\rangle$ ha spin 1.

Coleman e Mandula, nel 1967, hanno dimostrato che, con eccezione di casi particolari e poco importanti, la risposta a questa domanda è no.

La dimostrazione del teorema è complicata. Facciamo comunque qualche commento: inanzitutto l'idea è che se esistessero cariche conservate di tipo tensoriale o vettoriale, queste vincolerebbero troppo la dinamica, e per forza di cose si andrebbe a cadere nella teoria libera, non interagente. Per vederlo facciamo un esempio:

Esempio 2.1.1 (Conseguenze alla dinamica di una carica conservata tensoriale)

Supponiamo che in una data teoria $Q_{\mu\nu}$, un tensore simmetrico e a traccia nulla, sia conservato. Considera anche uno stato ad una particella, con momento p^μ , che indichiamo con $|p\rangle$. Considera il suo valore di aspettazione: deve avere una forma quadratica nei momenti, ed essere senza traccia, perciò varrà

$$\langle p | Q_{\mu\nu} | p \rangle \propto (p_\mu p_\nu - \frac{1}{4} \eta_{\mu\nu} p^2) \quad (2.10)$$

Chiaramente $p^2 = m^2$ è una quantità conservata. Segue quindi che si deve conservare anche $p_\mu p_\nu$. Vediamo che conseguenze ha questo ad esempio in uno scattering $2 \rightarrow 2$. Se indichiamo con P_i i momenti entranti e P'_i i momenti esterni, questi devono soddisfare sia la conservazione del momento, sia la nuova legge:

$$\begin{cases} p_1^\mu + p_2^\mu = p_1'^\mu + p_2'^\mu \\ p_1^\mu p_1^\nu + p_2^\mu p_2^\nu = p_1'^\mu p_1'^\nu + p_2'^\mu p_2'^\nu \end{cases} \implies \begin{cases} p_1^\mu = p_1'^\mu \\ p_2^\mu = p_2'^\mu \end{cases}, \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} p_1^\mu = -p_1'^\mu \\ p_2^\mu = -p_2'^\mu \end{cases} \quad (2.11)$$

Chiaramente, entrambi i casi sono troppo banali. Per questo motivo, il teorema di Coleman Mandula richiede nelle ipotesi che le soluzioni della teoria siano smooth (cioè lisce) nei parametri come gli angoli di scattering.

Quali sono le eccezioni del teorema di Coleman Mandula? Ne citiamo alcune:

1. La teoria *libera*: in questo caso, è semplice costruire teorie con cariche vettoriali o tensoriali conservate. Consideriamo ad esempio la seguente azione:

$$S = S_0 + S_1, \quad S_0 = \int d^4x \frac{1}{2} [\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2], \quad \phi \in \mathbb{R}, \quad S_1 = \int d^4x \left[-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu \right] \quad (2.12)$$

Dove, come al solito, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. La teoria è una teoria libera di campo scalare + una teoria libera di un campo vettoriale massivo. Le equazioni del moto che seguono dall'azione sono

$$(\square + m^2)\phi = 0, \quad (\square + m^2)A_\mu = 0 \quad (2.13)$$

Da queste è immediato verificare che la corrente $j_{\mu\nu} = \phi \overleftrightarrow{\partial}_\mu A_\nu$ è conservata. Segue che esiste una carica vettoriale conservata, data da

$$Q_\nu = \int d^3x j_{0\nu} \implies \frac{d}{dt} Q_\nu = 0 \quad (2.14)$$

In effetti è facile mostrare che esistono *infinite* correnti conservate, date da $\phi \overleftrightarrow{\partial}_{\mu_1} \dots \overleftrightarrow{\partial}_{\mu_N} A_\nu$. Nel caso della teoria interagente però le e.o.m. diventano più complicate, e il trucco non funziona più.

2. Una teoria in sole $d = 2$ dimensioni (una temporale e una spaziale). Il ragionamento per il quale le soluzioni devono essere smooth nei parametri non funziona più se la dimensione spaziale è solo una. Un esempio importante è il World-sheet in teoria delle stringhe: lì ci sono infinite cariche vettoriali/tensoriali conservate.
3. La teoria non relativistica: ad esempio nel Weimberg si mostra come valga

$$SU(3) \otimes SU(2) \subset SU(6) \quad (2.15)$$

Dove $SU(3)$ è il gruppo interno di simmetria di sapore di Gell-Mann, mentre $SU(2)$ è il gruppo di spin, cioè la simmetria spaziotemporale non relativistica.

Un'altra osservazione riguarda le teorie *conformi*: queste hanno una simmetria interna più grande di quella di Poincaré, cioè una invarianza di scala. Queste hanno una carica conservata vettoriale in più, solitamente denotata con k^μ . Anche in questo caso, vale il teorema di Coleman-Mandula, a patto di sostituire Poincaré con il gruppo Conforme.

Il teorema sembrerebbe spezzare le nostre speranze. D'altra parte, possiamo cercare una via d'uscita, una ipotesi del teorema alla quale possiamo rinunciare oppure modificare. In particolare ci poniamo la seguente domanda: se non esistono cariche vettoriali conservate, possiamo invece considerare cariche con indici *spinoriali*? Questo significherebbe avere delle simmetrie che connettono stati di spin che differisce di $1/2$, cioè tra bosoni e fermioni. Questo porta a modificare anche il concetto stesso di algebra: dovremmo considerare dei generatori fermionici anticommutanti. In effetti, si possono costruire queste teorie, e le algebre modificate in questo modo sono dette *superalgebre di Lie*. Se queste contengono al loro interno l'algebra di Poincaré, si dicono algebre di *supersimmetria* (oppure di superalgebre).

2.2 Definizione di superalgebra di Lie e primi esempi

Cominciamo ricordando la definizione di algebra di Lie, $\mathfrak{g}$:

1. $\mathfrak{g}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$
2. Su questo spazio esiste una legge di composizione interna, bilineare e anticommutativa $[\cdot, \cdot]$ cioè

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}, \quad [\alpha A + \beta B, C] = \alpha[A, C] + \beta[B, C], \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}/\mathbb{C}, \quad [A, B] = -[B, A] \quad (2.16)$$

3. La legge soddisfa l'identità di Jacobi, cioè

$$[[A, B], C] + [[B, C], A] + [[C, A], B] = 0 \quad (2.17)$$

In particolare, se prendiamo $[A, B] = A \cdot B - B \cdot A$, le ultime due condizioni sono automaticamente verificate.

Vogliamo ora generalizzare questa definizione. Siccome l'algebra al suo interno dovrà contenere sia bosoni sia fermioni, stabiliamo che i bosoni hanno grado 0 (mod. 2), e i fermioni hanno grado 1 (mod. 2). In questo modo possiamo richiedere che una superalgebra $\mathfrak{S}$ sarà uno spazio vettoriale *graduato*. In particolare uno spazio vettoriale V si dice graduato se $V = V^0 \cup V^1$, e allo stesso tempo $V = V^0 \cap V^1 = \{0\}$. Diamo quindi la definizione completa:

Definizione 2.2.1: Superalgebra di Lie

$\mathfrak{S}$ si dice superalgebra di Lie se

1. $\mathfrak{S}$ è uno spazio vettoriale graduato, su $\mathbb{R}/\mathbb{C}$.
2. Se $\exists$ legge di composizione interna, bilineare e *superanticommutativa*, cioè

$$[A, B] = (-1)^{1+gr(A)gr(B)} [B, A] \quad (2.18)$$

ovvero in particolare:

$$\begin{cases} \text{due bosoni} \implies gr(A) = gr(B) = 0 \implies [A, B] = -[B, A] \\ \text{fermione e bosone} \implies gr(A)gr(B) = 0 \implies [A, B] = -[B, A] \\ \text{due fermioni} \implies gr(A)gr(B) = 1 \implies [A, B] = [B, A] \end{cases} \quad (2.19)$$

chiediamo inoltre che la legge sia additiva rispetto al grado, cioè che valga $C = [A, B] \implies gr(C) = gr(A) + gr(B)$.

3. Valga super-Jacobi, cioè

$$(-)^{gr(A)gr(C)} [[A, B], C] + (-)^{gr(B)gr(A)} [[B, C], A] + (-)^{gr(C)gr(B)} [[C, A], B] = 0 \quad (2.20)$$

Osserviamo che se prendiamo $[A, B] = A \cdot B - B \cdot A$ se almeno uno fra A, B è un bosone, e $[A, B] = A \cdot B + B \cdot A$ se entrambi sono fermioni, allora le ultime due condizioni sono automaticamente soddisfatte.

Proprio come le algebre, il modo più semplice per descrivere una superalgebra è pensarla come matrici, oppure supermatrici, che agiscono su spazi vettoriali di rappresentazione graduati.

Introduciamo uno spazio vettoriale $V(m/n)$ graduato, su $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. I suoi elementi sono dati da

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_m \\ y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \text{bosoni} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_m \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{fermioni} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ y_1 \\ \dots \\ y_m \end{pmatrix} \quad (2.21)$$

Le trasformazioni di V in sè stesso, cioè gli endomorfismi, ereditano anche loro una struttura gradata: in particolare le trasformazioni bosoniche devono mandare bosoni in bosoni e fermioni in fermioni, mentre le trasformazioni fermioniche devono mandare bosoni in fermioni, e fermioni in bosoni. Segue che le trasformazioni bosoniche sono rappresentate da matrici diagonali a blocchi, mentre le trasformazioni fermioniche l'opposto.

Con la struttura di commutatore e anticommutatore ordinari, si definisce allora la superalgebra generale lineare, e si indica con $\mathfrak{gl}(m/n)$

Chiaramente a parte $\mathfrak{gl}(n/m)$ si possono definire altri tipi di superalgebre, che sono sotto-algebre di $\mathfrak{gl}(m/n)$

Esempio 2.2.1 (La superalgebra speciale lineare)

Si può definire ad esempio la superalgebra speciale lineare, che si indica con $\mathfrak{sl}(m/n)$. Nel caso ordinario, si definiva

$$\mathfrak{sl}(m) = \{A \in \mathfrak{gl}(m) : \text{Tr}(A) = 0\} \quad (2.22)$$

Nel caso delle superalgebre però, non basta imporre che la traccia si annulli. Ad esempio, considera le due trasformazioni bosoniche

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & D' \end{pmatrix} \quad (2.23)$$

Si ottiene semplicemente

$$\text{Tr}([M, N]) = \text{Tr} \begin{pmatrix} [A, A'] & 0 \\ 0 & [D, D'] \end{pmatrix} = 0 \quad (2.24)$$

Siccome la traccia del commutatore di due matrici è sempre nullo. La cosa funziona anche se M è un bosone ed N è un fermione:

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \implies \text{Tr}([M, N]) = \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & AB \\ DC & 0 \end{pmatrix} - \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & BD \\ CA & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad (2.25)$$

I problemi si hanno quando ho due fermioni:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & B' \\ C' & 0 \end{pmatrix} \implies \text{Tr}(\{M, N\}) \neq 0 \quad (2.26)$$

La via di uscita da questo problema è la definizione della supertraccia:

$$\text{Str} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \text{Tr}(A) - \text{Tr}(D) \quad (2.27)$$

Definiamo così quindi l'algebra speciale lineare,

$$\mathfrak{sl}(m/n) = \{M \in \mathfrak{gl}(m/n) : \text{Str}(M) = 0\} \quad (2.28)$$

Ora, una supertraccia contiene sempre un settore bosonico, che indichiamo con ${}^0\mathfrak{S}$, ed un settore fermionico, che chiamiamo ${}^1\mathfrak{S}$. Come è fatto il settore bosonico? le matrici in generale si possono scrivere in termini di una base M, N, I , se

$$A = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{Tr}(A) = 0, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \text{Tr}(B) = 0, \quad C = \begin{pmatrix} \alpha \mathbb{I} & 0 \\ 0 & -\frac{m}{n} \alpha \mathbb{I} \end{pmatrix} \quad (2.29)$$

Concludiamo che ${}^0\mathfrak{sl}(m/n) = \mathfrak{sl}(m) \oplus \mathfrak{sl}(n) \oplus \mathfrak{u}(1)$, e quindi $\dim({}^0\mathfrak{sl}(m/n)) = m^2 - 1 + n^2 - 1 + 1 = m^2 + n^2 - 1$. Con ragionamenti simili, si mostra che ${}^1\mathfrak{sl}(m/n)$ è la somma dei due blocchi off-diagonal, cioè $\dim({}^1\mathfrak{sl}(m/n)) = 2mn$.

Esempio 2.2.2 (Superalgebra ortosimplettica $\mathfrak{osp}(m/n)$)

Possiamo dotare lo spazio $V(m/n)$ con una forma bilineare, $(x, y) = x^T G y$, con

$$G = \begin{pmatrix} \mathbb{I} & 0 \\ 0 & \mathbb{J} \end{pmatrix} \quad (2.30)$$

Se $\mathbb{J}$ è la matrice simplettica. Si definisce allora la sottoalgebra ortosimplettica dell'algebra generale lineare nel seguente modo:

$$\mathfrak{osp}(m/n) = \left\{ M \in \mathfrak{gl}(m/n) : (x, My) + (-1)^{gr(x)gr(y)} (Mx, y) = 0, \forall (x, y) \right\} \quad (2.31)$$

per studiare quindi la struttura della superalgebra partiamo dal suo settore bosonico. Quale è una base del settore bosonico? Separo i blocchi e indago:

1. Blocco $m \times m$: scrivo

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.32)$$

Quale deve essere la condizione affinché $M \in \mathfrak{osp}(m/n)$? siccome agisce su bosoni, deve rispettare $x^T A y + (A x)^T y = 0 \implies A + A^T = 0$, ovvero $A \in \mathfrak{o}(m)$.

2. Blocco $n \times n$: similmente, sia

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \quad (2.33)$$

La condizione per cui N appartiene alla superalgebra è che valga $\mathbb{J}D + D^T \mathbb{J} = 0$, ovvero $D \in \mathfrak{sp}(n)$. troviamo quindi che ${}^0\mathfrak{osp}(m/n) = \mathfrak{o}(m) \oplus \mathfrak{sp}(n)$

2.3 L'algebra di supersimmetria

Osserviamo che il settore bosonico ${}^0\mathfrak{S}$ di una superalgebra è sempre del tipo $\mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$, con queste due algebre ordinarie. Questo è utile perché noi vogliamo scrivere delle algebre che contengano $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{g}$. La parte "nuova" quindi sarà tutta nel settore fermionico.

In generale, indichiamo con B_i i generatori bosonici, e con Q_I i generatori fermionici. Capire come è fatto il settore fermionico vuol dire anche capire quali sono le relazioni di commutazione B_i, Q_I . Dalla regola di additività del grado, si vede subito che sono dei generatori fermionici, e quindi dovrò espanderli in una base di generatori fermionici. In formule, scriveremo

$$[Q_I, B_i] = (M_i)_{IJ} Q_J \quad (2.34)$$

La matrice di coefficienti $(M_i)_{IJ}$ è vincolata dalla identità di Jacobi:

$$0 = [[Q_I, B_i], B_j] + [[B_j, Q_I], B_i] + [[B_i, B_j], Q_I]$$

$$\begin{aligned}
& (M_i)_{IJ} [Q_J, B_j] - (M_j)_{IJ} [Q_J, B_i] + f_{ijk} [B_k, Q_I] = \\
& (M_i)_{IJ} (M_k)_{JK} Q_K - (M_j)_{IJ} (M_i)_{JK} Q_K + f_{ijk} (M_k)_{IK} Q_K
\end{aligned} \tag{2.35}$$

Posso riscrivere l'eq. come

$$[M_i, M_j]_{IK} Q_K = f_{ijk} (M_k)_{IK} Q_K \tag{2.36}$$

Che è un'equazione interessante, perché mostra che le matrici M_i stanno in una rappresentazione della parte bosonica della superalgebra, con le Q_I che appartengono allo spazio di rappresentazione. Come già discusso, la parte bosonica per un'algebra di supersimmetria è $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{g}$: i generatori fermionici devono stare in una rappresentazione, cioè portare un doppio indice: uno della simmetria interna, e un'indice di lorentz (e.g. Q_α^i). L'indice di lorentz sarà un indice di spin semi-intero, nel caso più semplice di spin 1/2. Poniamoci quindi proprio in questo caso (si dimostra che il caso generale è perfettamente analogo). Per quanto riguarda l'indice che corre sulla simmetria interna, per il momento lasciamolo libero di correre, $i \in 1, \dots, N$, così da non fare ipotesi sulla simmetria interna.

Il nostro obiettivo è quello di conoscere l'algebra di supersimmetria, cioè le seguenti parentesi:

$$\begin{aligned}
& [Q_\alpha^i, P_\mu] = ? \\
& [Q_\alpha^i, J^{\mu\nu}] = ? \\
& [Q_\alpha^i, T_r] = ? \\
& \{Q_\alpha^i, Q_\beta^j\} = ?
\end{aligned} \tag{2.37}$$

Si può mostrare che, senza perdere generalità, gli spinori Q_α^i possono essere presi come spinori di Majorana, cioè che soddisfano $Q_\alpha^i = C_{\alpha\beta} \bar{Q}_\beta^i$, con C la matrice di coniugazione della carica.

Apriamo adesso una parentesi sulle convenzioni che usiamo con gli spinori: