



Soluciones orgánicas
para un mundo más sano

Certificaciones
de este producto

EcoCert, OMRI y WSDA



Sociedad Agrícola Tierra S.A.C.
CC.PP. Nuestra Señora de Guadalupe
Mz G Lote 13, Salas - Ica - Perú
(Alt. Panamericana Sur Km. 290)
Telfs: 976688381 - 978617517
990486230 - 945207082

BOTRAID S

Descripción

BOTRAID S, es una nueva fórmula diseñada por Sociedad Agrícola Tierra Sac dándole al agricultor una herramienta eficaz y económica para su programa fitosanitario con 53% de Silicio Diatomita y 5% de azufre agrícola.

BOTRAID S, ha sido elaborado para control de hongos en la etapa inicial de campaña de cualquier cultivo, especialmente en la etapa de floración para control de Botrytis Cinérea, Mildiu y Oídium, permitiendo una mejor formación floral y protegiendo la cuaja finalmente.

BOTRAID S, por la concentración de caolín y diatomita rápidamente absorbe la humedad de las heridas o picadura de pájaros, moscas o tijera permitiendo que el ingrediente activo más azufre actúe contra el hongo.

BOTRAID S, por su perfecta formulación controla un ataque de hongos en tan solo 24 horas, preservando por su alta capacidad de adherencia y permaneciendo más tiempo en la canopia como en frutos.

BOTRAID S, es ideal para incorporarlo al programa fitosanitario se puede usar en etapas iniciales como en floración, hasta pre cosecha evitando considerablemente el uso de pesticidas y fungicidas químicos evitando mayor gasto y reduciendo y evitando estrés en la planta y por consiguiente una mejor producción.

BOTRAID S, puede ser usado en prevención como curativo recomendado por los expertos.

BOTRAID S, no tiene restricciones y debe ser aplicado con espolvoreadora manual o mecánica.

BOTRAID S, es un producto NO TOXICO!



PRECAUCIONES

- Manténgase los envases cerrados y fuera del alcance de los niños y personas irresponsables, lejos de alimentos, medicinas y bebidas. Lea detenidamente las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
- Utilice por precaución los equipos de protección personal (guantes, botas, anteojos).
- Terminadas las labores de aplicación del producto se recomienda lavar con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

INGREDIENTE ACTIVO	:	Diatomitas, caolín, extractos cítricos, azufre agrícola
NOMBRE QUÍMICO	:	No corresponde
GRUPO QUÍMICO	:	Mineral no pesado
CONCENTRACION	:	inertes combinados al 70%, extractos cítricos 15%, extractos vegetales 8%, azufre agrícola 7%.
MODO DE ACCIÓN	:	CONTACTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

BOTRAID S es un cobertor orgánico que protege los cultivos del ataque de hongos en etapa de nuevo brote y floración específicamente, también ayuda a evitar que la canopia reciba las esporas que el viento lleva evitando que se sitúen en las hojas y posteriormente en toda la planta.

BOTRAID S trabaja como fungicida natural por su formulación mezcla de caolín y diatomita mas azufre, induce las defensas de la planta y la protege manteniendo la temperatura de la hoja a temperaturas más bajas evitando también el estrés.

BOTRAID S está diseñado para ser aplicado con cualquier equipo estándar de tratamiento fitosanitario y también por vía aérea.

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES GENERALES
Uva de mesa, Cerezos, Fresas, Arándanos, Banano, Café	3-4 aplicaciones Una bolsa de 20 Kg x Ha Repetir cada 15 días.	Es necesario que el árbol quede completamente cubierto, especialmente las bayas de 18 mm a 20 mm y frutos en general Asegurar una óptima protección en el período de mayor susceptibilidad durante el envero para el cultivo. Red Globe, Crimpson, Flame, Superior entre otras. Se recomienda culminar los tratamientos 30 días previos a cosecha.
Paltos cítricos papaya, Olivos, Viveros frutales, Manzanos, Perales Granados.	2-4 aplicaciones Una bolsa de 20 kg x Ha Cada 15 a 21 días.	Aplicar espolvoreando el producto a todo el árbol incluyendo la parte interior entre el follaje en paltos y cítricos en general Se puede aplicar hasta una semana antes de cosecha!
Vid vinífera	Aplicar en bayas desde 2-4 mm de Diámetro una bolsa de 20 kg x Ha cada 11 días..	Aplicar con espolvoreadora manual o mecánica desde arriba hacia abajo tratando de dar la mayor cobertura del producto en la canopia y frutos o racimos. Aplicaciones hasta 30 días antes de cosecha!
Espárragos Tomates, Pimientos Hortalizas de hoja cucurbitáceas	2 – 3 aplicaciones una bolsa de 20 kg x ha cada 11 días.	En tomates y pimientos, aplicar desde floración época de mayor incidencia de hongos y bacterias hasta la pre cosecha. virar de verde a naranja. Suspender los tratamientos 10 días previos a la cosecha.

COMPATIBILIDAD:

BOTRAID S es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, pero se recomienda hacer una prueba en pequeña superficie.

BOTRAID S debe aplicarse con lentes, guantes y casco protector

RECOMENDACIÓN GENERAL:

Ante cualquier duda consulte al DEPARTAMENTO TÉCNICO.

Sociedadagricolat ierrasac@hotmail.com