

线性代数

第三章 线性空间与线性变换

岳晓青

同济大学数学科学学院

xiaoqingyue@tongji.edu.cn

线性空间与线性变换

n 个有次序的实数所组成的数组

$$\alpha = (a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n)^T$$

称为 n 维向量, n 维向量的全体在向量的加法和数乘运算下构成的向量空间 R^n .

这一章我们这些概念加以推广、抽象成一般的向量和线性空间.

§ 3.1 线性空间的基本概念

定义： 一个含有非零数的集合 F ，如果任意两个数的和、差、积、商（零不为除数）仍在该集合中，则称 F 为数域.

例：

Q : 有理数全体构成有理数域；

R : 实数全体构成实数域；

C : 复数全体构成复数域；

定义： 设 V 是一个非空集合， V 中元素用 α, β, \dots 表示.
 $V = \{\alpha, \beta, \gamma, \dots\}$. F 是一个数域. F 中元素以 k, l, \dots 表示.
 $F = \{k, l, \dots\}$. 在 V 的元素之间定义一种**加法**运算：对 V 中依次取出的两个元素 α, β ，根据一定的规则，在 V 中有**唯一**的元素 γ 与它们对应，称 γ 为 α 与 β 的**和**，记 $\gamma = \alpha + \beta$ 且加法满足下面规则(1)-(4)：

$\forall \alpha, \beta, \gamma \in V$ ，有

(1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ ；

(2) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ ；

(3) 存在零元素： $\exists \beta \in V, \forall \alpha \in V, \alpha + \beta = \alpha$,

称 β 为零元素，并记 β 为 0 ；

(4) 存在负元素 $\forall \alpha \in V, \exists \beta \in V, \alpha + \beta = 0$ ；

称 β 为 α 的负元素，并记 β 为 $-\alpha$ ；

又在数域 F 与集合 V 元素之间定义一种数乘运算:

$\forall k \in F, \forall \alpha \in V$, 根据一定的规则, 在 V 中有唯一的元素 β 与它们对应, $\beta = k \square \alpha$ 称 β 为 k 与 α 的数乘, 且数乘满足下面的规则(5)-(6):

$\forall k, l \in F, \forall \alpha, \beta \in V$, 有

$$(5) \quad 1 \square \alpha = \alpha$$

$$(6) \quad k \square (l \square \alpha) = (k \square l) \square \alpha$$

加法与数乘两个运算之间满足下面规则(7)-(8):

$$(7) \quad (k + l) \square \alpha = k \alpha + l \alpha$$

$$(8) \quad k \square (\alpha + \beta) = k \alpha + k \beta$$

称 V 为 F 上的线性空间.

注：

1. V 中元素不论其性质如何，统称为向量. 若不引起混淆，简称 V 为线性空间或向量空间； V 中的加法和数乘统一称为线性运算，数乘 $k\alpha$ 简写 $k\alpha$
2. 如 $F=R$,称 V 为实线性空间；
如 $F = C$,称 V 为复线性空间.

例： R 为实数域， R 上全体 n 维向量的集合记为

$$R^n = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in R \}$$

$$\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in R^n, k \in R$$

定义加法和数乘如下：

1. 加法

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix},$$

2. 数乘

$$k \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kx_1 \\ kx_2 \\ \vdots \\ kx_n \end{bmatrix}, \quad k \in R,$$

则加法与数乘满足(1)-(8), R^n 为 R 上的线性空间.

例:

$$S^n = \left\{ x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \mid x_1, x_1, \dots, x_n \in R \right\} \quad \text{定义加法如例1中的加法}$$

数乘为

$$k \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad k \in R,$$

可知 S^n 对上面两个运算封闭, 但当 $x \neq 0$ 时 $1 \square x = 0 \neq x$
不满足 (5), $\therefore S^n$ 不构成线性空间.

注：

0. S^n 与 R^n 作为集合是一样的，由于所定义的运算不同使得 R^n 是线性空间，而 S^n 不是线性空间.
1. 线性空间的概念是集合与线性运算二者的结合.
2. 线性空间 V 中所定义的线性运算是本质，而 V 中向量具体是什么并不重要；
3. R^n 中向量组的线性相关、线性无关和一个向量由向量组线性表示等定义结论，可以沿用到抽象的线性空间中.
4. 线性空间 V 中零元素和负元素是唯一的.

例：实数域 R 上的全体 $m \times n$ 矩阵，对矩阵的加法和数乘运算构成 R 上的线性空间，记作 $R^{m \times n}$

$$R^{m \times n} = \{ A \mid A = (a_{ij})_{m \times n}, a_{ij} \in R \}$$

$$\because A_{m \times n} + B_{m \times n} = C_{m \times n} \in R^{m \times n},$$

$$\lambda A_{m \times n} = D_{m \times n} \in R^{m \times n},$$

$\therefore R^{m \times n}$ 是一个线性空间。

例: 次数小于 n 的多项式的全体, 记作 $P[x]_n$

$$P[x]_n = \{ a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \mid a_{n-1}, \cdots, a_0 \in R \}$$

对于多项式的加法、数乘多项式构成线性空间。

例: $n-1$ 次多项式的全体

$$Q[x]_n = \{ a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \mid a_{n-1} \neq 0 \}$$

对于多项式的加法和数乘运算不构成线性空间

$$\because 0p = 0x^{n-1} + \cdots + 0x + 0 \notin Q[x]_n$$

$\therefore Q[x]_n$ 对运算不封闭

例： 正弦函数的集合

$$S[x] = \{ a \sin(x+b) \mid a, b \in \mathbf{R} \}.$$

对于通常的函数加法及数与函数的乘法构成线性空间.

$$\begin{aligned} \because s_1 + s_2 &= a_0 \sin(x+b_0) + a_0' \sin(x+b_0') \\ &= (a_1 \cos x + b_1 \sin x) + (a_2 \cos x + b_2 \sin x) \\ &= (a_1 + a_2) \cos x + (b_1 + b_2) \sin x \\ &= a \sin(x+b) \end{aligned}$$

$$\lambda s_1 = \lambda a_1 \sin(x+b_1) = (\lambda a_1) \sin(x+b_1) \in S[x]$$

$\therefore S[x]$ 是一个线性空间.

例：在区间 $[a, b]$ 上全体实连续函数，对函数的加法与数和函数的数量乘法，构成实数域 \mathbf{R} 上的线性空间，记作 $C[a, b]$ 。

$$C[a, b] = \{ f(x) \mid f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \}$$

$$\because f(x), g(x) \in C[a, b]$$

$$\therefore f(x) + g(x) \in C[a, b]$$

$$kg(x) \in C[a, b]$$

$\therefore C[a, b]$ 是一个线性空间。

线性空间的性质

1. 零元素是唯一的.

证明: 假设 $0_1, 0_2$ 是线性空间 V 中的两个零元素.

则对任何 $\alpha \in V$ 有, $\alpha + 0_1 = \alpha$, $\alpha + 0_2 = \alpha$,

由于 $0_1, 0_2 \in V$, 则有 $0_2 + 0_1 = 0_2$, $0_1 + 0_2 = 0_1$.

所以 $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2$.

2. 负元素是唯一的.

证明: 设 α 的负元素为 β 与 γ , 则有 $\alpha + \beta = 0$, $\alpha + \gamma = 0$,

所以 $\beta = \beta + 0 = \beta + (\alpha + \gamma) = (\beta + \alpha) + \gamma = (\alpha + \beta) + \gamma = 0 + \gamma = \gamma$.

因此, 将向量 α 的负元素记为 $-\alpha$.

3. $0\alpha = 0$; $(-1)\alpha = -\alpha$; $\lambda 0 = 0$.

证明: 因为 $\alpha + 0\alpha = 1\alpha + 0\alpha = (1+0)\alpha = 1\alpha = \alpha$.

则由零元素的唯一性得: $0\alpha = 0$

因为 $\alpha + (-1)\alpha = 1\alpha + (-1)\alpha = [1+(-1)]\alpha = 0\alpha = 0$.

则由负元素的唯一性得: $(-1)\alpha = -\alpha$.

$\lambda 0 = \lambda[\alpha + (-1)\alpha] = \lambda\alpha + (-\lambda)\alpha = [\lambda + (-\lambda)]\alpha = 0\alpha = 0$.

4. 如果 $\lambda\alpha = 0$, 则 $\lambda = 0$ 或 $\alpha = 0$.

证明: 如果 $\lambda \neq 0$, 那么,

$$\frac{1}{\lambda}(\lambda\alpha) = \frac{1}{\lambda} \cdot 0 = 0, \text{ 又 } \frac{1}{\lambda}(\lambda\alpha) = \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right)\alpha = 1\alpha = \alpha.$$

所以, $\alpha = 0$. 故结论成立.

定义： 设 V 是数域 F 上的线性空间， W 为 V 的非空子集，即 $\emptyset \neq W \subseteq V$. 如果 W 对 V 中的加法及数乘两种运算也构成 F 上的线性空间，则称 W 为 V 的**子空间**.

注： 1. V 的最小子空间为零空间： $\{0\}$.

2. V 的最大子空间为： V .

V 的这两类子空间称为 V 的**平凡子空间**，其他子空间称为 V 的**真子空间**.

例： $W = \{(0, x_2, x_3, \cdots, x_n)^T \mid x_i \in R\}$ 是 R^n 的子空间.

例： $N = \{x \in R^n \mid A_{m \times n} x = 0\}$ 是 R^n 的子空间.

称 N 为齐次方程 $A_{m \times n} x = 0$ 的解空间. 也称为矩阵 A 的核空间，记为 $N(A)$ 或 N .

定理: 设 V 是数域 F 上的线性空间, W 为 V 的非空子集, 则 W 为 V 的子空间 $\iff W$ 对 V 中的线性运算封闭, 即满足

1. $\forall \alpha, \beta \in W$ 有 $\alpha + \beta \in W$;
2. $\forall \alpha \in W, k \in F$ 有 $k\alpha \in W$.

证明: \Rightarrow 必要性是显然的

\Leftarrow W 为 V 的非空子集, 则(1) (2) (5) (6) (7) (8) 成立, 只需证(3) (4).

由2. 取 $k = 0$ 有 $0\alpha = O \in W$
 $k = -1$ 有 $-\alpha \in W$

例: V 为 F 上的线性空间, 向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$

令 $W = \{k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_i \in F, i = 1, 2, \dots, m\}$ 则 W 为 V 的子空间, 称 W 为由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 生成的子空间, 记作 $W = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \rangle = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$.

定义: 设 $T = \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}, S = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 是线性空间 V 中的两个向量组, 若 T 中每个向量均可由 S 中向量线性表示, 记为 $T \leftarrow S$. 若 $T \leftarrow S$ 又 $S \leftarrow T$ 则称向量组 S 与向量组 T 等价, 记作 $T \leftrightarrow S$

定理: 设 $W_1 = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_m \rangle, W_2 = \langle \beta_1, \dots, \beta_n \rangle$ 是数域 F 上的线性空间 V 的两个子空间, 如果

$\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\} \leftrightarrow \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 等价, 则 $W_1 = W_2$.

证明: (要证 $W_1 = W_2$, 只需证 $W_1 \subseteq W_2$ 且 $W_2 \subseteq W_1$ 即可)

$\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\} \leftarrow \{\beta_1, \dots, \beta_n\} \Rightarrow$ 存在 $A_{n \times m}$ 使得
 $(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\beta_1, \dots, \beta_n)A$.

下证 $W_1 \subseteq W_2$

$\forall \alpha \in W_1, \exists k_1, \dots, k_m \in F$ 使得

$$\alpha = k_1 \alpha_1 + \dots + k_m \alpha_m = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_m \end{bmatrix}$$

$$= (\beta_1, \dots, \beta_n) A_{n \times m} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_m \end{bmatrix} = (\beta_1, \dots, \beta_n) \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_n \end{bmatrix} \in W_2$$

即 $W_1 \subseteq W_2$ 同理可证 $W_2 \subseteq W_1$.

例： 在线性空间 R^4 中，

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \\ -7 \end{bmatrix}, \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \\ 11 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -5 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$W_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle, W_2 = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle. \quad \text{证明 } W_1 = W_2.$$

证明： 由定理知，只需证 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} \leftrightarrow \{\beta_1, \beta_2\}$

由线性代数的知识，初等行变不改变列向量的线性相关性

$$(\beta_1, \beta_2, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 4 & 6 \\ -4 & -5 & -1 & 1 & 3 \\ 11 & 14 & 3 & -2 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 9 & 15 \\ 0 & -8 & -8 & -24 & -40 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -4 & -7 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_1 = -\beta_1 + \beta_2, \alpha_2 = -4\beta_1 + 3\beta_2, \alpha_3 = -7\beta_1 + 5\beta_2$$

$$\text{即 } \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} \leftarrow \{\beta_1, \beta_2\}$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) \xrightarrow{\text{行变}} \begin{bmatrix} E_2 & B \\ O & O \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 = -\beta_1 + \beta_2 \\ \alpha_2 = -4\beta_1 + 3\beta_2 \end{cases} \quad \begin{cases} 3\alpha_1 = -3\beta_1 + 3\beta_2 \\ \alpha_2 = -4\beta_1 + 3\beta_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \beta_1 = 3\alpha_1 - \alpha_2 \\ \beta_2 = 4\alpha_1 - \alpha_2 \end{cases}$$

$$\text{即 } \{\beta_1, \beta_2\} \leftarrow \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$$

定义： 设 W_1, W_2 为线性空间 V 的两个子空间，则 W_1 与 W_2 的**和**定义为 $W_1 + W_2 = \{\alpha + \beta \mid \alpha \in W_1, \beta \in W_2\}$

W_1 与 W_2 的**交**定义为 $W_1 \cap W_2 = \{\alpha \mid \alpha \in W_1 \text{ 且 } \alpha \in W_2\}$.

定理： 设 W_1, W_2 为线性空间 V 的两个子空间，则 $W_1 + W_2$ ， $W_1 \cap W_2$ 都是 V 的子空间，分别称为 W_1 与 W_2 的**和空间**及 W_1 与 W_2 的**交空间**.

证明: $\forall \alpha, \beta \in W_1 + W_2$ 有 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \beta = \beta_1 + \beta_2$

$$\alpha + \beta = (\alpha_1 + \beta_1) + (\beta_2 + \alpha_2) \in W_1 + W_2.$$

$$\forall k \in F, k\alpha = k\alpha_1 + k\alpha_2 \in W_1 + W_2$$

$\forall \alpha, \beta \in W_1 \cap W_2$ 有 $\alpha \in W_1, \alpha \in W_2 \quad \alpha + \beta \in W_1 \cap W_2$

$$\beta \in W_1, \beta \in W_2$$

$$\forall k \in F, k\alpha \in W_1, k\alpha \in W_2 \quad k\alpha \in W_1 \cap W_2$$

注: 类似可定义有限个子空间的和与交.

$$W_1 + \cdots + W_n = \{ \alpha_1 + \cdots + \alpha_n \mid \alpha_i \in W_i, 1 \leq i \leq n \},$$

$$\bigcap_{i=1}^n W_i = \{ \alpha \mid \alpha \in W_i, 1 \leq i \leq n \}.$$

§ 3.2 维数、基与坐标

定义： 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 V 中的一组线性无关的向量，且 V 中每个向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示，则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个**基**； n 称为线性空间的**维数**，记作 $\dim V = n$ ；如果 V 中可以找到任意多个线性无关的向量，那么称 V 的维数为**无限**。

注：

1. 我们只讨论有限维的线性空间；
2. $V = \{O\}$ 则 $\dim V = 0$ ；
3. V 的基不是唯一的,但 V 的任意两个基是等价的。

定义： 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 V 中的一个基，则

$\forall \alpha \in V$ ， α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 唯一线性表示，即

$\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$ ，称 k_1, k_2, \dots, k_n 为

向量 α 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标，记为

k_i 称为 α 的第 i 个坐标分量.

注： 1.

$$\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

2. 向量的坐标使抽象的 n 维线性空间 V 的

向量 α 与 R^n 中向量

$$\begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$$

对应起来.

$$\begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$$

例: $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, e_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 R^n 的一个基, $\dim R^n = n$

$\forall \alpha = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ 在基 e_1, e_2, \dots, e_n 下的坐标为 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$

通常 e_1, e_2, \dots, e_n 称为 R^n 的自然基.

例: 系数取自数域 F 的多项式全体, 记作

$$P[x] = \left\{ f = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0 \in F, n \in N \right\} \quad n \geq 0 \text{ 整数}$$

$P[x]$ 是数域 F 上的一个线性空间, 它的维数是多少?

$\because \forall n \in N, 1, x, x^2, \cdots, x^n$ 是 $P[x]$ 中线性无关的向量组,

$\therefore P[x]$ 是无限维的线性空间.

定理: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是线性空间 V 中的一个基, 且

$$\beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \cdots + a_{n1}\alpha_n$$

$$\beta_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{n2}\alpha_n$$

.....

$$\beta_n = a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 + \cdots + a_{nn}\alpha_n$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 构成 V 的一个基

$$\Leftrightarrow |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

证明:

$\dim V = n$, 只需证 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性无关即可.

$$\begin{aligned} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A \end{aligned}$$

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \cdots + k_n\beta_n = \mathbf{0}$$

$$\Leftrightarrow (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = \mathbf{0} \Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) A \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\Leftrightarrow A \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} \text{ 是齐次线性方程组 } AX=\mathbf{0} \text{ 的解.}$$

$$\Leftarrow |A| \neq \mathbf{0}, \quad AX = \mathbf{0} \text{ 只有零解, 即 } k_1 = k_2 = \cdots = \mathbf{0}.$$

$$\Rightarrow \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n \text{ 线性无关, } k_1 = k_2 = \cdots = \mathbf{0},$$

$$AX = \mathbf{0} \text{ 只有零解, 从而 } |A| \neq \mathbf{0}.$$

例： 设

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_5 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$V = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \rangle$, 求 $\dim V$ 和 V 的一个基, 并把 α_i 表示为这个基的线性组合.

解：

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

行初等变换不改变列向量的线性相关性，所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 V 的一个基， $\dim V=3$.

$$\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3, \quad \alpha_5 = -\alpha_2 + \alpha_3.$$

例: 线性空间 $P[x]_3$ 中(系数取自数域 F 的次数小于3的多项式全体)

- 1) 证明向量 $f_1 = 1 + x + x^2, f_2 = 1 + x - x^2, f_3 = 1 - x - x^2$ 是一个基;
- 2) 求向量 $f = 1 + 2x + x^2$ 在这个基下的坐标.

证明:

1) $1, x, x^2$ 为 $P[x]_3$ 的一组基.

$$(f_1, f_2, f_3) = (1, x, x^2) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} = (1, x, x^2) A$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \therefore f_1, f_2, f_3 \text{ 是一个基.}$$

2) 解: $f = (1, x, x^2) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, 设 f 在 f_1, f_2, f_3 下的坐标为 $\begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix}$

$$f = (f_1, f_2, f_3) \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = (1, x, x^2) A \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = (1, x, x^2) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\therefore 1, x, x^2$ 线性无关

$$\therefore A \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad |A| \neq 0 \quad \therefore \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}.$$

定理: 设 $W \subseteq V$ 是子空间, $\dim V = n, \dim W = m, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 W 的一个基, 那么必然存在 $n-m$ 个向量 $\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$ 使得 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$ 构成 V 的一个基.

证明: 对 $n-m$ 进行归纳.

1) $n-m=0, W=V, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 V 的一个基.

2) $n > m$, 若结论对 $n-m < k$ 成立, 则当 $n-m=k$ 时, $W \subseteq V$ $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 仍是 V 的线性无关组, 而它们不是 V 的基.

\therefore 必存在 $\alpha_{m+1} \in V$, 使 α_{m+1} 不能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 即 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}$ 线性无关. 令 $W_1 = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1} \rangle$,

则 $\dim W_1 = m+1$ 且 $\dim V - \dim W_1 = n-m-1 < k$

由归纳假设, 存在 $\alpha_{m+2}, \dots, \alpha_n \in V$

11 使 $\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1}, \alpha_{m+2}, \dots, \alpha_n$ 构成 V 的一个基.

定理： 设 V_1 与 V_2 均是 V 的子空间，那么

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim (V_1 + V_2) + \dim (V_1 \cap V_2)$$

证明： 设 $\dim V_1 = r$ ， $\dim V_2 = s$ ， $\dim V_1 \cap V_2 = l$

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的基，由**定理** 知存在向量

$\beta_{l+1}, \dots, \beta_r$ 和 $\gamma_{l+1}, \dots, \gamma_s$ 使得

$\alpha_1, \dots, \alpha_l, \beta_{l+1}, \dots, \beta_r$ 为 V_1 的一个基，

$\alpha_1, \dots, \alpha_l, \gamma_{l+1}, \dots, \gamma_s$ 为 V_2 的一个基。

下面只需证：

$\alpha_1, \dots, \alpha_l, \beta_{l+1}, \dots, \beta_r, \gamma_{l+1}, \dots, \gamma_s$ 为 $V_1 + V_2$ 的一个基，即证：

- 1) 线性无关；
- 2) 任意元素都可由这个基线性表示。

证: 1) 设

$$a_1\alpha_1 + \cdots + a_l\alpha_l + b_{l+1}\beta_{l+1} + \cdots + b_r\beta_r + c_{l+1}\gamma_{l+1} + \cdots + c_s\gamma_s = \mathbf{0}$$

$$\alpha = a_1\alpha_1 + \cdots + a_l\alpha_l + b_{l+1}\beta_{l+1} + \cdots + b_r\beta_r \in V_1$$

$$= -c_{l+1}\gamma_{l+1} - \cdots - c_s\gamma_s \in V_2 \quad \alpha \in V_1 \cap V_2$$

α 可由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_l$ 线性表示, 即

$$-c_{l+1}\gamma_{l+1} - \cdots - c_s\gamma_s = d_1\alpha_1 + \cdots + d_l\alpha_l$$

$$d_1\alpha_1 + \cdots + d_l\alpha_l + c_{l+1}\gamma_{l+1} + \cdots + c_s\gamma_s = \mathbf{0}$$

$\because \alpha_1, \cdots, \alpha_l, \gamma_{l+1}, \cdots, \gamma_s$ 为 V_2 的一个基

$$\therefore d_1 = \cdots = d_l = \mathbf{0} = c_{l+1} = \cdots = c_s$$

$$\text{从而 } a_1\alpha_1 + \cdots + a_l\alpha_l + b_{l+1}\beta_{l+1} + \cdots + b_r\beta_r = \mathbf{0}$$

又 $\because \alpha_1, \cdots, \alpha_l, \beta_{l+1}, \cdots, \beta_r$ 为 V_1 的一个基,

$$\therefore a_1 = \cdots = a_l = \mathbf{0} = b_{l+1} = \cdots = b_r \Rightarrow \text{线性无关}$$

证: 2) $\forall \alpha \in V_1 + V_2, \alpha = \beta + \gamma$ 其中 $\beta \in V_1, \gamma \in V_2$

$$\beta = b_1\alpha_1 + \cdots + b_l\alpha_l + b_{l+1}\beta_{l+1} + \cdots + b_r\beta_r$$

$$\gamma = c_1\alpha_1 + \cdots + c_l\alpha_l + c_{l+1}\gamma_{l+1} + \cdots + c_s\gamma_s$$

$$\alpha = \beta + \gamma = \sum_{i=1}^l (b_i + c_i)\alpha_i + \sum_{i=l+1}^r b_i\beta_i + \sum_{i=l+1}^s c_i\gamma_i$$

例: 证明 $\dim V = n, \dim V_1 + \dim V_2 > n$

$\Rightarrow V_1, V_2$ 必含非零的公共向量.

证明:

$$\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) > 0$$

§ 3.3 基变换与坐标变换

定义： 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 n 维线性空间 V 的两个基，且它们的关系为

[illegible]

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad *(\beta_1, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)A$$

称(1)为**基变换**，方阵A为由基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 的**过渡矩阵**，也称为**基变换矩阵**.

例： 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

是 R^3 中的两组基，求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 P ；

解： $\because \begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 \\ \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3 \\ \beta_3 = \alpha_2 - 3\alpha_3 \end{cases}$ 基变换公式

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix} \leftarrow P$$

P 是由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵

定理： 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 n 维线性空间 V 的两个基, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 A . 向量 α 在这两个基下的坐标分别是

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad \text{则有坐标变换公式} \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (2)$$

证：

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

注：定理是可逆的，如果有(2)成立，则有(1)式成立.

例： 设 n 维线性空间 V 的坐标变换是

$$y_1 = x_1, \quad y_2 = x_2 - x_1, \quad y_3 = x_3 - x_2, \quad \cdots, \quad y_n = x_n - x_{n-1},$$

求: V 的基变换矩阵 (过渡矩阵)

解：

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$A = (A^{-1})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad \text{为基变换矩阵.}$$

例: 设 $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

是 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 中的两组基, 求

(1) 由基 E_1, E_2, E_3, E_4 到基 A_1, A_2, A_3, A_4 的过渡矩阵 P

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 在基 A_1, A_2, A_3, A_4 下的坐标.

解:

$$\therefore \begin{cases} A_1 = E_1 + 2E_2 - E_3 \\ A_2 = E_1 - E_2 + E_3 + E_4 \\ A_3 = -E_1 + 2E_2 + E_3 + E_4 \\ A_4 = -E_1 - E_2 + E_4 \end{cases}$$

$$(A_1, A_2, A_3, A_4) = (E_1, E_2, E_3, E_4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore y = P^{-1}x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 18 \\ 4 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$(P, x) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 18/13 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4/13 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/13 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8/13 \end{pmatrix}$$

例：求 R^3 中向量在两个基

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{和} \beta_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

下的坐标变换.

解：

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 为 } R^3 \text{ 的自然基.}$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (e_1, e_2, e_3) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} = (e_1, e_2, e_3) A$$

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (e_1, e_2, e_3) \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & -6 \end{bmatrix} = (e_1, e_2, e_3) B$$

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) A^{-1} B, \quad P = A^{-1} B$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = B^{-1} A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} A = \begin{bmatrix} -7 & 16 & 3/2 \\ 5 & -11 & -1 \\ -3 & 7 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 53/2 & 77/2 & 185/2 \\ -18 & -26 & -63 \\ 23/2 & 33/2 & 81/2 \end{bmatrix}$$

即:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{2}(53x_1 + 77x_2 + 185x_3) \\ y_2 = \frac{1}{2}(-36x_1 - 52x_2 - 126x_3) \\ y_3 = \frac{1}{2}(23x_1 + 33x_2 + 81x_3) \end{cases}$$

注:

1. R^n 的基: e_1, e_2, \dots, e_n

2. $R^{n \times n}$ 的基: $(E_{ij})_{n \times n}$

3. $P[x]_n$ 的基: $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$

思考题:

设线性空间 $P[x]_4$ 的二组基分别是

$$1, x, x^2, x^3 \text{ 和 } 1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3$$

- (1) 求由前一组基到后一组基的过渡矩阵;
- (2) 设 $f(x)$ 在后一组基下的坐标为 $(7, 0, -8, 2)^T$,
且 $g(x)$ 在前一组基下的坐标为 $(1, 0, -2, 5)^T$,
求 $f(x) + g(x)$ 在前一组基下的坐标.

§ 3.4 子空间的直和

定义： 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间，如果和 $V_1 + V_2$ 中每个向量 α 的分解式 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$ 是唯一的，则称和 $V_1 + V_2$ 为**直和**，记作 $V_1 \oplus V_2$ 。

定理： 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间，则下述命题等价：

- (1) 子空间 $V_1 + V_2$ 是直和；
- (2) 零向量的分解式是唯一的；
- (3) $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$ ；
- (4) V_1 的一个基与 V_2 的一个基的并集是 $V_1 + V_2$ 的基；
- (5) $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$

证明： 由维数公式

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim (V_1 + V_2) + \dim (V_1 \cap V_2)$$

所以：(3) \iff (4) \iff (5)

(1) \implies (2) V_1, V_2 为线性空间, $\mathbf{O} \in V_1 + V_2$

\because 子空间 $V_1 + V_2$ 是直和;

$\therefore \mathbf{O}$ 的分解式是唯一的.

(2) \implies (3) $\forall \alpha \in V_1 \cap V_2$ 则有 $\alpha \in V_1$ 且 $\alpha \in V_2$

$\because V_1, V_2$ 为 V 子空间, $\therefore -\alpha \in V_1, -\alpha \in V_2$

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{O} &= \alpha + (-\alpha) \in V_1 + V_2 \\ &= \mathbf{O} + \mathbf{O} \end{aligned} \right\}$$

$\therefore \mathbf{O}$ 的分解式是唯一的;

$\therefore \alpha = \mathbf{O}$, 即 $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{O}\}$;

(3) \Rightarrow (1) $\forall \alpha \in V_1 + V_2, \exists \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$, 使 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$,

如果 $\exists \beta_1 \in V_1, \beta_2 \in V_2$, 使 $\alpha = \beta_1 + \beta_2$, 有 $\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2$

$$\alpha_1 - \beta_1 = \beta_2 - \alpha_2 \in V_1 \cap V_2 = \{O\} \quad \therefore \alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2$$

例: $V = R^{n \times n} = \{n \text{ 阶实方阵全体}\}, V_1 = \{A \in R^{n \times n} \mid A^T = A\}$

$V_2 = \{A \in R^{n \times n} \mid A^T = -A\}$, 易知: V_1, V_2 是 V 子空间.

则有: $V = V_1 \oplus V_2$

证:

$$\forall A \in V \text{ 有 } A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2} \text{ 且 } \left(\frac{A + A^T}{2} \right)^T = \frac{A + A^T}{2}$$
$$\left(\frac{A - A^T}{2} \right)^T = -\frac{A - A^T}{2} \quad \text{即 } A \in V_1 + V_2, \quad V = V_1 + V_2$$

$\forall A \in V_1 \cap V_2, A^T = A = -A, A = O$, 即 $V_1 \cap V_2 = \{O\}$

由等价命题有 $V = V_1 \oplus V_2$.

定理： 设 U 是线性空间 V 的子空间，则一定存在 V 的一个子空间 W , 使 $V=U \oplus W$, 称 W 为 U 在 V 中的直和补.
(直和补一般不是唯一的) .

证明： 取 U 的一个基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$, 由基的扩充定理, 存在 $\alpha_{m+1}, \cdots, \alpha_n$ 使得 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \cdots, \alpha_n$ 构成 V 的一个基.
取 $W = \langle \alpha_{m+1}, \cdots, \alpha_n \rangle$
由等价命题有 $V=U \oplus W$.

定义： 设 V_1, V_2, \cdots, V_r 是线性空间 V 的子空间，如果和 $V_1+V_2+\cdots+V_r$ 中每个向量 α 的分解式 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_r (\alpha_i \in V_i, i = 1, 2, \cdots, r)$ 是唯一的，则称这个和为直和，记作 $V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_r$.

定理： 设 V_1, V_2, \dots, V_r 是线性空间 V 的子空间，则下述命题等价：

(1) $V_1 + V_2 + \dots + V_r$ 是直和；

(2) 零向量 O 的分解式唯一；

(3) 把 V_1, V_2, \dots, V_r 任意分成两组，

V_{i_1}, \dots, V_{i_s} 与 V_{j_1}, \dots, V_{j_t} , ($s + t = r$), 则有

$$(V_{i_1} + \dots + V_{i_s}) \cap (V_{j_1} + \dots + V_{j_t}) = \{O\};$$

(4) V_1, V_2, \dots, V_r 各自的一个基的并集是 $V_1 + V_2 + \dots + V_r$ 的一个基；（数归）

$$\begin{aligned} (5) \quad & \dim(V_1 + V_2 + \dots + V_r) \\ &= \dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_r. \end{aligned}$$

思考题： 线性空间 R^3 的子空间

$$R_x = \{ (x, 0, 0)^T \mid x \in R \} \quad R_y = \{ (0, y, 0)^T \mid y \in R \}$$

$$R_{yz} = \{ (0, y, z)^T \mid y, z \in R \}$$

求 $R_x \oplus R_y$, $R_x \oplus R_{yz}$ 。

解：

$$R_x \oplus R_y = \{ (x, y, 0)^T \mid x, y \in R \} = R_{xy}$$

$$R_x \oplus R_{yz} = \{ (x, y, z)^T \mid x, y, z \in R \} = R^3$$

§ 3.5 线性变换（线性映射）

定义： 若在数域 F 的线性空间 V 上，有一种规则 T ，使得 V 中任意向量 α 对应于 V 中唯一向量 $\alpha' \triangleq T(\alpha)$ ，规则 T 称为 V 的**变换**， α' 称为 α 的**像**， α 称为 α' 的**原像**。

$$T : V \longrightarrow V$$

$$\alpha \mapsto \alpha' = T(\alpha)$$

如果变换 T 又满足下面条件： $\forall \alpha, \beta \in V$ 和 $k \in F$ 有

$$T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta)$$

$$T(k\alpha) = kT(\alpha)$$

则称 T 为 V 的**线性变换**（线性映射）。

例： 设 A 是给定的 n 阶方阵，

$$T : R^n \longrightarrow R^n$$

$$\alpha \mapsto \alpha' = T(\alpha) = A\alpha \in R^n$$

(1) T 是变换；


$$(2) T(\alpha + \beta) = A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta = T(\alpha) + T(\beta)$$

$$T(k\alpha) = A(k\alpha) = kA\alpha = kT(\alpha)$$


\Rightarrow T 是线性变换，由方阵 A 所确定的线性变换也通常用 A 表示.

特别 $n=2$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 时，将 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 分

别对应于 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3/2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 画图来看：



$\tan(\varphi) = 1/2$,
这时 T 称为以 φ 为切变角的切变.



$n = 3$
取 $H = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$, $\forall \alpha = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in R^3$. 线性变换

$$H(\alpha) = H \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ -c \end{bmatrix}$$

H 称为关于坐标平面 xoy 的反射变换

注：(1) 把线性空间中任意向量都变为零向量的变换是线性变换，称为**零变换**，记作 O

$$O: V \rightarrow V$$

$$\alpha \mapsto O$$

(2) 把 V 中向量 α 变为自身的变换也是线性变换，称为**恒等变换**，记作 I ，

$$I: V \longrightarrow V$$

$$\alpha \mapsto I(\alpha) = \alpha$$

(3) 对固定的数 k ， $T: V \longrightarrow V$ T 称为**数乘变换**。

$$\alpha \mapsto T(\alpha) = k\alpha$$

(4) $k \in \mathbb{R}$, V 为实线性空间，

$|k| > 1$ 时 T 称为**拉伸变换**

$|k| < 1$ 时 T 称为**压缩变换**

线性变换的性质

设 T 是数域 F 上的线性空间 V 的线性变换, 则有:

$$(1) \quad T(O) = O \quad (\because T(k\alpha) = kT(\alpha), \text{取 } k = 0 \text{ 即可})$$

$$(2) \quad T(-\alpha) = -T(\alpha) \quad (\forall \alpha \in V, \text{取 } k = -1 \text{ 即可})$$

$$(3) \quad T(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s) \\ = k_1T(\alpha_1) + k_2T(\alpha_2) + \cdots + k_sT(\alpha_s), \quad \text{其中}$$

$$\alpha_1, \cdots, \alpha_s \in V, \quad k_1, \cdots, k_s \in F.$$

(4) T 把线性相关的向量组变成线性相关的向量组, 即
若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 $T(\alpha_1), \dots, T(\alpha_m)$ 也线性相关.

注: T 是否能将线性无关的向量组变成线性无关的向量组?

反例: 零变换可将任意线性无关的向量组变成线性相关的向量组.

定理： 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是数域 F 上的线性空间 V 的一个基, 那么对 V 中任意 n 个向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 必存在 V 的唯一的线性变换 T , 使 $T(\alpha_i) = \beta_i, i = 1, \dots, n$.

证明：

(1) 构造一个变换 T :

$$\forall \alpha \in V, \text{ 设 } \alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n.$$

令 $T(\alpha) = k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_n\beta_n$, 则 T 是 V 的一个变换.

(2) 令 $k_i = 1, k_j = 0 \ (j \neq i),$

$$\text{有 } T(\alpha_i) = k_i\beta_i = \beta_i, \ i = 1, 2, \dots, n.$$

(3) 需证 T 是 V 的一个线性变换.

$$\forall \alpha, \beta \in V, \quad \alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i, \quad \beta = \sum_{i=1}^n l_i \alpha_i, \quad \lambda \in F$$

$$\begin{aligned} T(\alpha + \beta) &= T\left(\sum_{i=1}^n (k_i + l_i) \alpha_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n (k_i + l_i) \beta_i = \sum_{i=1}^n k_i \beta_i + \sum_{i=1}^n l_i \beta_i = T(\alpha) + T(\beta), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(\lambda \alpha) &= T\left(\lambda \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i\right) = T\left(\sum_{i=1}^n \lambda k_i \alpha_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda k_i \beta_i = \lambda T(\alpha). \end{aligned}$$

(4) 唯一性: 设 \tilde{T} 是 V 的线性变换, 且

$$\tilde{T}(\alpha_i) = \beta_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

要证 $\tilde{T}(\alpha) = T(\alpha), \forall \alpha \in V$ 即 $T = \tilde{T}$.

$$\forall \alpha \in V, \alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i$$

$$\begin{aligned} \tilde{T}(\alpha) &= \sum_{i=1}^n k_i \tilde{T}(\alpha_i) = \sum_{i=1}^n k_i \beta_i = \sum_{i=1}^n k_i T(\alpha_i) = T\left(\sum_{i=1}^n k_i \alpha_i\right) \\ &= T(\alpha). \end{aligned}$$

定义： 设 T_1, T_2 是数域 F 上线性空间 V 的两个线性变换， $k \in F$ ，定义如下：

$$\forall \alpha \in V, (T_1 + T_2)(\alpha) \triangleq T_1(\alpha) + T_2(\alpha)$$

$$(kT_1)(\alpha) \triangleq kT_1(\alpha)$$

$$(T_1 T_2)(\alpha) \triangleq T_1(T_2(\alpha))$$

显然 $T_1 + T_2, kT_1, T_1 T_2$ 为 V 的线性变换.

规律： 设 T_1, T_2, T_3 是 V 的任意线性变换, $\forall k, l \in F$, 则

$$(1) \quad T_1 + T_2 = T_2 + T_1$$

$$(2) \quad (T_1 + T_2) + T_3 = T_1 + (T_2 + T_3)$$

$$(3) \quad T + O = T$$

$$(4) \quad (kl)T = k(lT)$$

$$(5) \quad (k + l)T = kT + lT$$

$$(6) \quad k(T_1 + T_2) = kT_1 + kT_2$$

$$(7) \quad 1T = T$$

$$(8) \quad (T_1 T_2) T_3 = T_1 (T_2 T_3)$$

$$(9) \quad TI = IT = T \quad I \text{ 为恒等变换}$$

$$(10) \quad T(T_1 + T_2) = TT_1 + TT_2, \quad (T_1 + T_2)T = T_1T + T_2T$$

如果定义 $-T: \alpha \mapsto -T(\alpha), \forall \alpha \in V$ 显然有 $T + (-T) = O$
 V 的所有线性变换, 对于线性变换的加法和数乘也
构成一个线性空间.

注: (1) 与矩阵的乘法类似, 线性变换关于乘积运算

一般不满足交换率, 即 $T_1 T_2 \neq T_2 T_1$,

$$(T_1 T_2)^2 \neq T_1^2 T_2^2, (T_1 + T_2)^2 \neq T_1^2 + 2T_1 T_2 + T_2^2$$

(2) 定义 $T^2 = TT, T^m = T^{m-1}T, T^0 = I$ 有指数运算法则

$$T^m T^n = T^{m+n}, (T^m)^n = T^{mn}, m, n \text{ 为非负整数}$$

(3) $\forall f(x) = P[x],$

$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0, (a_i \in F, i = 0, 1, \cdots, m)$$

定义线性变换 T 的多项式: $f(T) = a_m T^m + a_{m-1} T^{m-1} +$
 $\cdots + a_1 T + a_0 I$, 显然 $f(T)$ 仍为 V 的线性变换.

定义： 设 T 是线性空间 V 的线性变换，若存在 V 的另一个变换 S , 使 $TS=ST=I$ (恒等变换)，则称变换 T 是**可逆**的， S 称为 T 的**逆变换**，记作 $S=T^{-1}$.

定理： 若 T 是线性空间 V 的线性变换，且 T 可逆，则 T 的逆变换 T^{-1} 也是线性变换.

证明： $\forall \alpha, \beta \in V, k \in F,$

$$\begin{aligned} T^{-1}(\alpha + \beta) &= T^{-1}[TT^{-1}(\alpha) + TT^{-1}(\beta)] \\ &= T^{-1}\left[T(T^{-1}(\alpha)) + T(T^{-1}(\beta))\right] \\ &= T^{-1}\left[T(T^{-1}(\alpha) + T^{-1}(\beta))\right] \\ &= (T^{-1}T)(T^{-1}(\alpha) + T^{-1}(\beta)) \\ &= T^{-1}(\alpha) + T^{-1}(\beta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 T^{-1}(k\alpha) &= T^{-1}\left[kTT^{-1}(\alpha)\right] = T^{-1}\left[kT\left(T^{-1}(\alpha)\right)\right] \\
 &= T^{-1}\left[T\left(kT^{-1}(\alpha)\right)\right] = (T^{-1}T)(kT^{-1}(\alpha)) \\
 &= kT^{-1}(\alpha).
 \end{aligned}$$

注：当 T 可逆时，可以定义 T 的**负整数幂**，即 $\forall n \in \mathbf{Z}_+$ ，
定义 $T^{-n} = (T^{-1})^n$ 。

T 的指数法则：

$$T^m T^n = T^{m+n},$$

$$(T^m)^n = T^{mn}, \quad m, n \in \mathbf{Z}.$$

§ 3.6 线性变换的矩阵

取 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, V 中任意向量 β 可由基线性

表示, 有

$$\beta = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}, \text{ 即 } \beta \text{ 由它在基 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 下}$$

的坐标 $\begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$ 唯一确定, $T(\beta) = T\left(\sum_{i=1}^n k_i \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^n k_i T(\alpha_i),$

T 由它在基上的作用 $T(\alpha_i)$ 唯一确定, 自然地得到
线性变换与矩阵的联系.

定义: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是数域 F 上 n 维线性空间 V 的一个基,

T 是 V 的线性变换, 则基向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的像,

$T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)$ 可由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示

[illegible]

$$\text{即 } T(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \cdots, T(\alpha_n)) \\ = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) A_{n \times n}$$

A 称为线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵,

简称线性变换 T 的矩阵.

注： O 的矩阵为 O , I 的矩阵为 E .

注： (1) 由定义：取线性空间 V 的一个基后，线性变换 T 就对应了唯一的一个 n 阶方阵，即线性变换 T 的矩阵

$$T \xrightarrow{\text{基取定}} A$$

(2) 基不同，得到的矩阵一般来说是不同的，特别当调整基向量的顺序时，得到的矩阵也可能是不同的.

(3) 反之，给定一个方阵 A ，是否能找到 V 的一个线性变换 T 与之对应呢？ $A \xrightarrow{?} T$ 使 T 在上述给定的基下的矩阵就是 A .

$\forall \alpha \in V, \alpha$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $\begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$ ，即

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}, \text{ 令 } T(\alpha) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$$

由线性变换的定义易知, T 是 V 的线性变换.

$$T(\alpha_i) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_i \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

$$T(\alpha_i) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A e_i$$

$$\begin{aligned} T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) &= (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)) \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A (e_1, e_2, \dots, e_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A \end{aligned}$$

即我们所构造的线性变换 T 的矩阵就是 A , 即 $A \longrightarrow T$

例：在 R^3 中，把向量 $\alpha = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 向坐标平面 xoy 投影，得到

$\alpha' = \begin{bmatrix} a \\ b \\ 0 \end{bmatrix}$ 是一个投影变换，易证它也是一个线性变换，

求投影变换 T 在基 $\alpha_1 = e_1, \alpha_2 = e_2, \alpha_3 = e_1 + e_2 + e_3$ 下的矩阵.

解： $T(\alpha_1) = \alpha_1, T(\alpha_2) = \alpha_2, T(\alpha_3) = e_1 + e_2 = \alpha_1 + \alpha_2.$

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$\therefore T$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$

T 在基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

例: 求 n 维线性空间 $P[x]_n$ 的线性差分变换

$\Delta f = f(x+1) - f(x)$ 分别在基:

(1) $1, x, \dots, x^{n-1}$

(2) $f_0 = 1, f_1 = x, \dots, f_k = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}, \dots,$

$$f_{n-1} = \frac{x(x-1)\cdots(x-n+2)}{(n-1)!}$$

下的矩阵.

解:

(1) $\Delta(1) = 1 - 1 = 0, \quad \Delta(x) = (x+1) - x = 1,$
 $\Delta(x^2) = (x+1)^2 - x^2, \dots$

$$1 \leq k \leq n-1, \quad \Delta(x^k) = (x+1)^k - x^k$$

$$= 1 + kx + C_k^2 x^2 + \cdots + C_k^{k-1} x^{k-1}$$

$$\Delta(1, x, \dots, x^{n-1}) = (1, x, \dots, x^{n-1}) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ & 0 & 2 & \dots & C_{n-1}^1 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & C_{n-1}^{n-2} \\ & & & & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

$$(2) \quad \Delta f_0 = 0, \quad \Delta f_1 = 1 = f_0$$

$$1 \leq k \leq n-1$$

$$\begin{aligned} \Delta f_k &= \frac{(x+1)x \cdots (x-k+2)}{k!} - \frac{x(x-1) \cdots (x-k+1)}{k!} \\ &= \frac{1}{k!} x(x-1) \cdots (x-k+2)(x+1-x+k-1) \\ &= \frac{1}{(k-1)!} x(x-1) \cdots (x-k+2) = f_{k-1}. \end{aligned}$$

$$\Delta(f_0, f_1, \dots, f_{n-1}) = (f_0, f_1, \dots, f_{n-1}) \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \\ & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \dots & \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & \mathbf{1} \\ & & & & \mathbf{0} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

定理： V 为线性空间， $\dim V = n$ ， T 为 V 的一个线性变换，

T 在 V 的两个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的矩阵分别为 A 和 B ，则 $A \sim B$ ；如果

$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$ ，则有 $B = P^{-1}AP$ 。

证明：由假设

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$$

$$T(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)B \quad (1)$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P,$$

$\because P$ 为过渡矩阵 $\therefore P$ 可逆，从而有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)P^{-1},$$

$$\begin{aligned}
 \therefore T(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) &= (T(\beta_1), T(\beta_2), \dots, T(\beta_n)) \\
 &= (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n))P = T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P \\
 &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)AP = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)P^{-1}AP \quad (2)
 \end{aligned}$$

比较式(1)和(2)，由 T 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下矩阵的唯一性，得 $B=P^{-1}AP$ ，从而 $A \sim B$.

注：定理的逆也是成立的.

即若 $A \sim B$ ，则 A 与 B 是同一线性变换在两个基下的矩阵.

证明：

$\forall \alpha \in V, \alpha$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $\begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$ ，即

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$$

令 $T(\alpha) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) A \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$ 则 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的矩阵就为 A .

$A \sim B$, 设 $B = P^{-1}AP$.

$$\text{令 } (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) P$$

$\because |P| \neq 0, \therefore \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 为 V 的基.

$$\begin{aligned} T(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) &= T(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) P = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) AP \\ &= (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) P^{-1} AP = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) B \end{aligned}$$

$A \sim B \iff A$ 与 B 是同一线性变换在两个基下的矩阵.

由第二章的定理2.5.1,任一复矩阵必定相似于Jordan标准形, 即

$$A \sim J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{bmatrix},$$

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & \mathbf{1} & & \\ & \lambda_i & \mathbf{1} & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \mathbf{1} \\ & & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}$$

$$m_i = \mathbf{1}, J_i = \lambda_i$$

推论1: V 为复数域 C 上的线性空间, T 为 V 的任意一个线性变换, 则必存在 V 的一个基, 使 T 在这个基下矩阵是Jordan标准形.

定义: T 是可对角化的, 如果存在一个基, 使 T 在该基下的矩阵为对角阵.

推论2: 线性空间 V 的线性变换 T 是可对角化的
 $\Leftrightarrow T$ 的矩阵是可对角化的.

线性变换 T 在不同基下的矩阵是相似的, 而相似矩阵有相同的秩, 下面我们来定义线性变换的秩.

定义： 设 T 是线性空间 V 的线性变换， $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基， T 在这个基下的矩阵为 A ，那么 A 的秩称为**线性变换 T 的秩**，特别当 A 为满秩时，也称 T 为**满秩线性变换**.

定理： 设 T 是线性空间 V 的线性变换，那么 T 是可逆的线性变换 $\iff T$ 为满秩线性变换.

证明： \Rightarrow
$$T(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)A$$
$$T^{-1}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)B$$
$$(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = T^{-1}T(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$$
$$= T^{-1}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)BA$$
$$\therefore BA=E, \text{ 即 } T \text{ 是满秩的线性变换.}$$

$$\Leftarrow T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A$$

$$S(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A^{-1}$$

$$\therefore TS = ST = I.$$

例： 设 T 是 n 维线性空间 V 的线性变换， T 在 V 的一个基

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 下的矩阵为 } A, \text{ 其中 } A = \begin{bmatrix} & & & & 1 \\ & & & 1 & \\ & & \ddots & & \\ & 1 & & & \\ 1 & & & & \end{bmatrix}_{n \times n}$$

求： T 在基 $\beta_1 = \alpha_2, \beta_2 = \alpha_3, \dots, \beta_{n-1} = \alpha_n, \beta_n = \alpha_1,$
下的矩阵.

解: $T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$

$$T(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)B$$

$$\begin{aligned} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} \mathbf{0} & & & & & \mathbf{1} \\ & \mathbf{1} & \mathbf{0} & & & \\ & & \mathbf{1} & \mathbf{0} & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P \end{aligned}$$

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{1} \\ E_{n-1} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{O} & E_{n-1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{O} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore B = P^{-1}AP &= \begin{bmatrix} e_2^T \\ e_3^T \\ \vdots \\ e_n^T \\ e_1^T \end{bmatrix} (e_n, e_{n-1}, \dots, e_2, e_1)P \\
 &= \begin{bmatrix} e_{n-1}^T \\ e_{n-2}^T \\ \vdots \\ e_1^T \\ e_n^T \end{bmatrix} (e_2, e_3, \dots, e_n, e_1) = \begin{bmatrix} e_{n-2}^T \\ \vdots \\ e_1^T \\ e_n^T \\ e_{n-1}^T \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

$$\therefore \mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} & & & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ & \ddots & & & & \\ \mathbf{1} & & & & & \\ \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \\ \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \end{bmatrix}.$$

定义： 设 T 是线性空间 V 的线性变换，分别定义 T 的核
 $\text{Ker}T$ 与 T 的像 $\text{Im}T$

$$\text{Ker}T = \{\alpha \in V \mid T(\alpha) = 0\},$$

$$\text{Im}T = \{\beta \in V \mid \exists \alpha \in V \text{ 使 } T(\alpha) = \beta\}.$$

性质： $\text{Ker}T$ 和 $\text{Im}T$ 均是 V 的子空间，从而分别称为
 T 的核空间和像空间.

证明： 1. $\text{Im}T$ 为 V 的子空间；

1) $T(0) = 0 \in \text{Im}T \therefore \text{Im}T$ 是非空子集.

2) $\forall \alpha, \beta \in \text{Im}T, \exists \alpha', \beta' \in V$
使 $T(\alpha') = \alpha, T(\beta') = \beta.$

$$\alpha + \beta = T(\alpha') + T(\beta') = T(\alpha' + \beta') \in \text{Im}T.$$

$$\begin{aligned} 3) \quad & \forall \alpha \in \text{Im} T, \quad k \in F, \quad \exists \alpha' \in V, \text{ 使 } T(\alpha') = \alpha \\ & k\alpha = kT(\alpha') = T(k\alpha') \in \text{Im} T. \end{aligned}$$

2. $\text{Ker} T$ 为 V 的子空间:

$$1) \quad T(O) = O, \quad \therefore O \in \text{Ker} T, \quad \text{Ker} T \text{ 为 } V \text{ 的非空子集.}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & \forall \alpha, \beta \in \text{Ker} T, \\ & \text{有 } T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta) = O + O = O \\ & \therefore \alpha + \beta \in \text{Ker} T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad & \forall \alpha \in \text{Ker} T, \quad k \in F, \\ & \text{有 } T(k\alpha) = kT(\alpha) = kO = O. \end{aligned}$$

问: 像空间和核空间的维数分别为多少?

定理: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 的一个基,

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A$$

若 $\text{rank}(A) = r$, 则 $\dim \text{Ker} T = n - r$; $\dim \text{Im} T = r$.

证明: 1. $\dim \text{Ker} T = n - r$;

$\because \text{rank}(A) = r, \therefore AX = O$ 解空间维数为 $n - r$.

设 x_{r+1}, \dots, x_n 为解空间的一个基, 即线性方程的一个

基础解系. 令 $\beta_j = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) x_j, j = r + 1, \dots, n$

即 β_j 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 x_j .

$$1) \quad \beta_j \in \text{Ker} T, j = r + 1, \dots, n$$

$$\begin{aligned} T(\beta_j) &= T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) x_j \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A x_j = O \end{aligned}$$

2) $\beta_{r+1}, \dots, \beta_n$ 线性无关. $k_{r+1}\beta_{r+1} + \dots + k_n\beta_n = \mathbf{0}$

$$\therefore (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(k_{r+1}x_{r+1} + \dots + k_nx_n) = \mathbf{0}$$

$\because \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, x_{r+1}, \dots, x_n 线性无关,

$\therefore \beta_{r+1}, \dots, \beta_n$ 线性无关.

3) $\forall \alpha \in \text{Ker } T$, α 可由 $\beta_{r+1}, \dots, \beta_n$ 线性表示.

设

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) y_0$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \mathbf{0} &= T(\alpha) = T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) y_0 \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A y_0 \end{aligned}$$

$\because \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关,

$\therefore Ay_0 = O$ 即 y_0 为 $AX=O$ 的解, 从而有

$$y_0 = \sum_{j=r+1}^n k_j x_j$$

$$\begin{aligned} \therefore \alpha &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) y_0 \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \sum_{j=r+1}^n k_j x_j \\ &= \sum_{j=r+1}^n k_j (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) x_j = \sum_{j=r+1}^n k_j \beta_j. \end{aligned}$$

由 1), 2), 3) 可知 $\beta_{r+1}, \dots, \beta_n$ 为 $\text{Ker} T$ 的一个基,

即 $\dim \text{Ker} T = n - r$.

2) $\dim \operatorname{Im} T = r$

$\because \beta_{r+1}, \dots, \beta_n$ 为 $\operatorname{Ker} T \subset V$ 的一个基, 由基的扩充定理, 必存在 V 中向量 β_1, \dots, β_r 使 $\beta_1, \dots, \beta_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_n$ 为 V 的一个基, 即 $\forall \alpha \in V$ 有 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \beta_i$,

$$\beta = T(\alpha) = \sum_{i=1}^n a_i T(\beta_i) = \sum_{i=1}^r a_i T(\beta_i) \in \operatorname{Im} T,$$

即 $\operatorname{Im}(T)$ 中任意向量可由 $T(\beta_i)$ 线性表示, $i=1, 2, \dots, r$.
下面只需证 $T(\beta_i)$ 线性无关即可.

设 $k_1T(\beta_1) + \cdots + k_rT(\beta_r) = \mathbf{0}$, 则有

$$T(k_1\beta_1 + \cdots + k_r\beta_r) = \mathbf{0},$$

$\therefore k_1\beta_1 + \cdots + k_r\beta_r \in \text{Ker } T$, 从而可由 $\beta_{r+1}, \cdots, \beta_n$

线性表示.

$$k_1\beta_1 + \cdots + k_r\beta_r = k_{r+1}\beta_{r+1} + \cdots + k_n\beta_n$$

$$k_1\beta_1 + \cdots + k_r\beta_r - k_{r+1}\beta_{r+1} - \cdots - k_n\beta_n = \mathbf{0}$$

$\because \beta_1, \cdots, \beta_n$ 为 V 的基

$\therefore k_i = 0, i = 1, 2, \cdots, n$, 即 $T(\beta_i), i = 1, 2, \cdots, r$ 线性无关.

推论: 设 T 是有限维线性空间 V 的线性变换, 则

$$\dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T = \dim V$$

注: 1) $\dim \operatorname{Im} T = r$ 等于 T 的秩, $\dim \operatorname{Ker} T$ 称为 T 的亏
则 n 维线性空间的任一线性变换的亏与秩之和恰好为 n .

2) 和空间 $\operatorname{Im} T + \operatorname{Ker} T$ 一般不是直和.

例: 设 D 是 R 上线性空间 $P[x]_4$ 的微分线性变换

$$D(f) = f'(x)$$

求: 1) $\operatorname{Im} D$ 和 $\operatorname{Ker} D$; 2) $\operatorname{Im} D + \operatorname{Ker} D$ 是否是直和?

解: 方法一: $P[x]_4$ 的自然基为: $1, x, x^2, x^3$.

$$D(1) = 0, \quad D(x) = 1, \quad D(x^2) = 2x, \quad D(x^3) = 3x^2$$

$$D(1, x, x^2, x^3) = (1, x, x^2, x^3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad \text{rank}(A) = 3$$

由定理可知: $\dim \text{Ker } D = 1, \quad \dim \text{Im } D = 3.$

$$\beta_i = (1, x, x^2, x^3)\alpha_i, \quad i = 2, 3, 4$$

$$= (1, x, x^2, x^3)Ae_i$$

$$= D(1, x, x^2, x^3)e_i \in \text{Im } D, \quad i = 2, 3, 4$$

下证 β_i 线性无关.

$$\text{设 } k_2\beta_2 + k_3\beta_3 + k_4\beta_4 = 0$$

$$(1, x, x^2, x^3)(k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4) = 0$$

$$\because 1, x, x^2, x^3 \text{ 为基} \quad \therefore k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 = 0$$

$$\text{又 } \because \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \text{ 线性无关} \quad \therefore k_2 = k_3 = k_4 = 0$$

$$\therefore \beta_2, \beta_3, \beta_4 \text{ 线性无关} \quad \therefore \text{Im } D = \langle \beta_2, \beta_3, \beta_4 \rangle$$

$$\because \text{Im } D \subseteq P[x]_3, \text{ 且 } \dim \text{Im } D = 3 = \dim P[x]_3, \therefore \text{Im } D = P[x]_3$$

方法二: $\text{Im } D \subseteq P[x]_3$,

$$\begin{aligned} \text{又 } \forall f(x) &= b_0 + b_1x + b_2x^2 \in P[x]_3, \\ &= D\left(b_0x + \frac{b_1}{2}x^2 + \frac{b_2}{3}x^3\right) \in \text{Im } D, \end{aligned}$$

$$\therefore \text{Im } D = P[x]_3.$$

下面求 $\text{Ker } D$.

$$\text{设 } C \in R \text{ 且 } C \neq 0, \quad D(C) = 0$$

$$\therefore C \in \text{Ker } D, \quad \text{但} \quad \dim \text{Ker } D = 1$$

$$\therefore \text{Ker } D = \langle C \rangle = R$$

$$2) \text{ 设 } C \in R \text{ 且 } C \neq 0, \quad C \in \text{Ker } D,$$

$$\text{又 } C \in P[x]_3 = \text{Im } D$$

$$\therefore \text{Im } D \cap \text{Ker } D \neq \{0\}, \quad \therefore \text{不是直和.}$$

§ 3.7 不变子空间

设 T 是复线性空间 V 的线性变换, 由前面讲过的知识, 必存在 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)J, \text{ 其中}$$

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{bmatrix}$$

这节我们要讨论的是若当块 J_i 与基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的联系.

例： V 为复线性空间， $\dim V = 6$ ， T 为 V 的线性变换， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_6$ 为 V 的基，

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_6) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_6)$$

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & J_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & & & & \\ & 3 & & & & \\ & & 2 & 1 & & \\ & & & 2 & 1 & \\ & & & & 2 & \\ & & & & & 5 \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} T(\alpha_1) = 3\alpha_1 \\ T(\alpha_2) = \alpha_1 + 3\alpha_2, \end{cases} \quad \begin{cases} T(\alpha_3) = 2\alpha_3 \\ T(\alpha_4) = \alpha_3 + 2\alpha_4 \\ T(\alpha_5) = \alpha_4 + 2\alpha_5, \end{cases} \quad T(\alpha_6) = 5\alpha_6.$$

$$T(\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2)J_1,$$

$$T(\alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = (\alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)J_2, \quad T(\alpha_6) = \alpha_6J_3.$$

$$\text{令 } V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle, \quad V_2 = \langle \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \rangle, \quad V_3 = \langle \alpha_6 \rangle.$$

则 (1) 由子空间是直和的等价命题有 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$

$$(2) TV_1 \subseteq V_1, \quad TV_2 \subseteq V_2, \quad TV_3 \subseteq V_3.$$

定义： 设 T 是线性空间 V 的线性变换， W 是 V 的子空间，

如 $\forall \alpha \in W$ 有 $T(\alpha) \in W$ ，则称 W 是 V 的 **T -不变子空间**。

注：(1) V_1, V_2, V_3 均为 V 的 T -不变子空间；

(2) 如果 T 在 V 的某个基下的矩阵是Jordan标准形，
那么 V 就可表示为若干个 T -不变子空间的直和；

(3) $TV \subseteq V$, $TO \subseteq O$,

所以 V 本身及零子空间都是 T -不变子空间，

例： 设 T 是线性空间 V 的线性变换，则像空间 $\text{Im}T$ 与核空间 $\text{Ker}T$ 都是 T -不变子空间.

证明： (1) $\forall \beta \in \text{Im}T = \{ \beta \in V \mid \exists \alpha \in V \text{ 使 } T(\alpha) = \beta \}$,

$$\exists \alpha \in V \text{ 使 } T(\alpha) = \beta$$

$$T(\beta) = T(T(\alpha)) \in \text{Im}T$$

(2) $\forall \alpha \in \text{Ker}T, T(\alpha) = O \in \text{Ker}T$

定义： 设 T 是数域 F 上线性空间 V 的线性变换，若存在 V 的非零向量 α 和数 $\lambda \in F$ 使得 $T(\alpha) = \lambda\alpha$ ，则称 λ 为 T 的特征值， α 为 T 的属于特征值 λ 的特征向量.

例： $T(\alpha_1) = 3\alpha_1$, $T(\alpha_3) = 2\alpha_3$, $T(\alpha_6) = 5\alpha_6$.

3,2,5 为 T 的特征值， $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_6$ 为 T 的属于特征值 3,2,5 的特征向量， $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_6$ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ 的坐标分别为 e_1, e_3, e_6 .

而若当矩阵 J 的特征值为3, 2, 5,
 J 的对应的特征向量恰好是 e_1, e_3, e_6 .

即

$$Je_1 = 3e_1, Je_3 = 2e_3, Je_6 = 5e_6.$$

定理: 设 T 是数域 F 上线性空间 V 的线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$,
是 V 的一个基, 且 $T(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)A$,
则 $O \neq \alpha \in V, T(\alpha) = \lambda\alpha$,

$$\iff Ax_0 = \lambda x_0, \text{ 其中 } \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)x_0$$

证明: $T(\alpha) = T(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)x_0 = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)Ax_0$
 $\lambda\alpha = \lambda(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)x_0 = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\lambda x_0$

$$\therefore T(\alpha) = \lambda\alpha \iff (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)Ax_0 = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\lambda x_0$$
$$\iff Ax_0 = \lambda x_0,$$

(是 V 中同一向量在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的坐标)

注: 求 T 的特征值、特征向量时, 可以先求其矩阵的特征值、特征向量; T 的特征多项式、最小多项式就是它的矩阵的特征多项式、最小多项式.

例： 设 T 是数域 F 上 n 维线性空间 V 的线性变换，且满足
 $\text{Im } T + \ker T = V$. 证明： $\text{Im } T^2 = \text{Im } T$.

证：(1) 显然有 $\text{Im } T^2 \subset \text{Im } T$.

(2) 由 $\text{Im } T + \ker T = V$, 及 $\dim \text{Im } T + \dim \ker T = n$,

知 $\text{Im } T \oplus \ker T = V$. 取 $\ker T$ 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$,
扩充成 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-r}, \alpha_{n-r+1}, \dots, \alpha_n$. 则有

$\forall \alpha \in V, T\alpha \leftarrow \{T\alpha_{n-r+1}, \dots, T\alpha_n\}$, 结合 $\text{Im } T \oplus \ker T = V$,
可得 $T\alpha_{n-r+1}, \dots, T\alpha_n$ 是 $\text{Im } T$ 的一个基. 则有

$\alpha_1, \dots, \alpha_{n-r}, T\alpha_{n-r+1}, \dots, T\alpha_n$ 是 V 的一个基. 于是

$$T\alpha \leftarrow (T^2\alpha_{n-r+1}, \dots, T^2\alpha_n) \subset \text{Im } T$$

因此, $T\alpha \in \text{Im } T^2$, 即 $\text{Im } T^2 \supset \text{Im } T$.

例： 设 T 是数域 F 上 n 维线性空间 V 的线性变换，且满足

$$T^2 = 3T. \quad \text{证明：} \quad \text{Im } T \oplus \text{Ker } T = V.$$

证： 设 $\alpha \in \text{Im } T \cap \text{ker } T$,

由 $\alpha \in \text{ker } T$ 知, $T\alpha = 0$.

由 $\alpha \in \text{Im } T$ 知, 存在 $\beta \in V$, 使得 $T\beta = \alpha$.

$$\text{于是 } \alpha = T\beta = \frac{1}{3}T^2\beta = \frac{1}{3}T(T\beta) = \frac{1}{3}T\alpha = 0.$$

即 $\text{Im } T \cap \text{ker } T = \{0\}$.

$$\text{又} \quad \dim \text{Im } T + \dim \text{ker } T = n,$$

$$\text{故} \quad \text{Im } T \oplus \text{ker } T = V.$$