
a Complete factorial, frozen encoders
Pre-reference / stages / seizure SD / patient Z
0000 0.36 0.40 0.38 0.26 0.34
0001 0.34 0.40 0.33 0.34 0.34
0010 0.36 0.41 0.37 0.31 0.32
0011 0.33 0.41 0.30 0.32 0.35
0100 0.36 0.40 0.33 0.26 0.36
0101 0.34 0.40 0.26 0.37 0.34
0110 0.32 0.41 0.36 0.27 0.37
0111 0.34 0.38 0.38 0.32 0.35
1000 0.33 0.41 0.36 0.24 0.38
1001 0.42 0.45 0.35 0.40 0.39
1010 0.33 0.41 0.36 0.29 0.37
1011 0.39 0.44 0.38 0.36 0.39
1100 0.34 0.37 0.33 0.29 0.37
1101 0.41 0.43 0.33 0.37 0.38
1110 0.34 0.41 0.35 0.28 0.37
1111 original 0.39 0.42 0.36 0.35 0.38
Fold 1
Fold 2
Fold 3
Fold 4
Fold 5
Patient-average EZ-F1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
b Fold-local component selection
Pre-reference
Two phases
Seizure SD
Patient Z
4
1
2
5
0
1
2
3
4
5
Selected own-FIT recipes (of 5)
c Context dependence
Pre-reference
Two phases
Seizure SD
Patient Z
EZ-F1
AUROC
−0.025
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
On − off across 8 matched contexts