

Simulation

<model 3>

$$Y_3 = \beta_1^T X (\beta_1^T X + \beta_2^T X + 1) + 0.2\varepsilon$$

n = 100, p = 10

Case(1): $\beta_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$, $\beta_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T$. True beta 0의 개수 : 18개	Sparse dr																		
$\lambda_1 = (0.01, 0.01), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.0</td><td>0.9023539</td><td>0.3582309</td><td>0.20441361</td><td>2.013343</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>8.4</td><td>0.9889003</td><td>0.5342424</td><td>0.02353643</td><td>2.259421</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.0	0.9023539	0.3582309	0.20441361	2.013343	sparse dr	8.4	0.9889003	0.5342424	0.02353643	2.259421
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.0	0.9023539	0.3582309	0.20441361	2.013343														
sparse dr	8.4	0.9889003	0.5342424	0.02353643	2.259421														
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.9023539</td><td>0.3582309</td><td>0.2044136110</td><td>2.013343</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>16.33</td><td>0.9998277</td><td>0.4252261</td><td>0.0003724295</td><td>2.155955</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.9023539	0.3582309	0.2044136110	2.013343	sparse dr	16.33	0.9998277	0.4252261	0.0003724295	2.155955
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.9023539	0.3582309	0.2044136110	2.013343														
sparse dr	16.33	0.9998277	0.4252261	0.0003724295	2.155955														
$\lambda_1 = (0.1, 0.1), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.9023539</td><td>0.3582309</td><td>0.2044136</td><td>2.013343</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>17.86</td><td>1.0000000</td><td>0.2945666</td><td>0.0000000</td><td>2.037919</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.9023539	0.3582309	0.2044136	2.013343	sparse dr	17.86	1.0000000	0.2945666	0.0000000	2.037919
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.9023539	0.3582309	0.2044136	2.013343														
sparse dr	17.86	1.0000000	0.2945666	0.0000000	2.037919														
$\lambda_1 = (0.1, 0.1), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.8765027</td><td>0.4790111</td><td>0.2546006</td><td>2.121877</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>17.02</td><td>1.0000000</td><td>0.5038377</td><td>0.0000000</td><td>2.275580</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.8765027	0.4790111	0.2546006	2.121877	sparse dr	17.02	1.0000000	0.5038377	0.0000000	2.275580
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.8765027	0.4790111	0.2546006	2.121877														
sparse dr	17.02	1.0000000	0.5038377	0.0000000	2.275580														

Case(2): $\beta_1 = (1, 1, 0.1, 0.1, 0, \dots, 0)^T$, $\beta_2 = (0, 0, \dots, 0, 0.1, 0.1, 1, 1)^T$, True beta 0의 개수 : 16개	Sparse dr																		
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.8926849</td><td>0.7441008</td><td>0.7422822</td><td>2.360219</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>12.74</td><td>0.9386644</td><td>0.8530844</td><td>0.7038246</td><td>2.741271</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.8926849	0.7441008	0.7422822	2.360219	sparse dr	12.74	0.9386644	0.8530844	0.7038246	2.741271
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.8926849	0.7441008	0.7422822	2.360219														
sparse dr	12.74	0.9386644	0.8530844	0.7038246	2.741271														
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.9117192</td><td>0.7576560</td><td>1.768800</td><td>2.670831</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>14.72</td><td>0.9835670</td><td>0.8561785</td><td>1.820555</td><td>3.141346</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.9117192	0.7576560	1.768800	2.670831	sparse dr	14.72	0.9835670	0.8561785	1.820555	3.141346
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.9117192	0.7576560	1.768800	2.670831														
sparse dr	14.72	0.9835670	0.8561785	1.820555	3.141346														

$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 10개	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2
	dr	0.00	0.8951393	0.7440215	0.5933793	2.480356
	sparse dr	12.95	0.9442555	0.8642252	0.5366405	2.887598
$\lambda_1 = (0.1, 0.1), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 10개	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2
	dr	0.00	0.8969179	0.7303821	0.5876484	2.498324
	sparse dr	16.43	0.8644084	0.7750632	0.6741271	2.900782

Case(3): $\beta_1 = (1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0)^T$, $\beta_2 = (0, 0, \dots, 0, 1, 1, 1, 1, 1)^T$, True beta 0의 개수 : 10개	Sparse dr																		
$\lambda_1 = (0.05, 0.01), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.3443642</td><td>0.3333781</td><td>2.565917</td><td>2.142812</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>8.77</td><td>0.6384969</td><td>0.3491921</td><td>1.921513</td><td>2.235067</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.3443642	0.3333781	2.565917	2.142812	sparse dr	8.77	0.6384969	0.3491921	1.921513	2.235067
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.3443642	0.3333781	2.565917	2.142812														
sparse dr	8.77	0.6384969	0.3491921	1.921513	2.235067														
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.2634347</td><td>0.3226514</td><td>2.381886</td><td>2.271132</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>12.79</td><td>0.5734163</td><td>0.2351197</td><td>2.275058</td><td>2.251113</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.2634347	0.3226514	2.381886	2.271132	sparse dr	12.79	0.5734163	0.2351197	2.275058	2.251113
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.2634347	0.3226514	2.381886	2.271132														
sparse dr	12.79	0.5734163	0.2351197	2.275058	2.251113														
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.2652045</td><td>0.3255123</td><td>2.338302</td><td>2.289543</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>12.76</td><td>0.5778242</td><td>0.2346929</td><td>2.155990</td><td>2.238162</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.2652045	0.3255123	2.338302	2.289543	sparse dr	12.76	0.5778242	0.2346929	2.155990	2.238162
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.2652045	0.3255123	2.338302	2.289543														
sparse dr	12.76	0.5778242	0.2346929	2.155990	2.238162														
$\lambda_1 = (0.1, 0.1), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.3206840</td><td>0.2585343</td><td>2.150356</td><td>2.242556</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>8.71</td><td>0.7533963</td><td>0.1154713</td><td>1.717944</td><td>1.900907</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.3206840	0.2585343	2.150356	2.242556	sparse dr	8.71	0.7533963	0.1154713	1.717944	1.900907
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.3206840	0.2585343	2.150356	2.242556														
sparse dr	8.71	0.7533963	0.1154713	1.717944	1.900907														

<model 4>

$$Y_4 = \frac{\beta_1^T X}{0.5 + (\beta_2^T X + 1.5)^2} + 0.02\varepsilon$$

n = 400, p = 20

Case(1): $\beta_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$ $\beta_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T$ True beta 0의 개수 : 38개	Sparse dr																		
$\lambda_1 = (0.01, 0.01), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.0</td><td>0.9910928</td><td>0.9601205</td><td>0.01791585027</td><td>1.568229</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>35.2</td><td>0.9999502</td><td>0.9978728</td><td>0.00009773017</td><td>1.536892</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.0	0.9910928	0.9601205	0.01791585027	1.568229	sparse dr	35.2	0.9999502	0.9978728	0.00009773017	1.536892
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.0	0.9910928	0.9601205	0.01791585027	1.568229														
sparse dr	35.2	0.9999502	0.9978728	0.00009773017	1.536892														
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0</td><td>0.9910928</td><td>0.9601205</td><td>0.01791585</td><td>1.568229</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>38</td><td>1.0000000</td><td>1.0000000</td><td>0.00000000</td><td>1.537359</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0	0.9910928	0.9601205	0.01791585	1.568229	sparse dr	38	1.0000000	1.0000000	0.00000000	1.537359
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0	0.9910928	0.9601205	0.01791585	1.568229														
sparse dr	38	1.0000000	1.0000000	0.00000000	1.537359														

Case(2): $\beta_1 = (1, 1, 1, 0.1, 0.1, 0, \dots, 0)^T$, $\beta_2 = (0, 0, \dots, 0, 0.1, 0.1, 1, 1, 1)^T$, True beta 0의 개수 : 30개	Sparse dr																		
$\lambda_1 = (0.01, 0.01), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.9902523</td><td>0.9397599</td><td>3.523601</td><td>1.263554</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>26.92</td><td>0.9979160</td><td>0.9792754</td><td>3.552670</td><td>1.291342</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.9902523	0.9397599	3.523601	1.263554	sparse dr	26.92	0.9979160	0.9792754	3.552670	1.291342
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.9902523	0.9397599	3.523601	1.263554														
sparse dr	26.92	0.9979160	0.9792754	3.552670	1.291342														
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0</td><td>0.9903701</td><td>0.9401990</td><td>3.762007</td><td>1.301785</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>34</td><td>0.9953800</td><td>0.9606207</td><td>3.777331</td><td>1.339770</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0	0.9903701	0.9401990	3.762007	1.301785	sparse dr	34	0.9953800	0.9606207	3.777331	1.339770
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0	0.9903701	0.9401990	3.762007	1.301785														
sparse dr	34	0.9953800	0.9606207	3.777331	1.339770														
$\lambda_1 = (0.05, 0.01), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.9841425</td><td>0.9129147</td><td>3.751120</td><td>3.602607</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>22.47</td><td>0.9955477</td><td>0.9582296</td><td>3.777496</td><td>3.937488</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.9841425	0.9129147	3.751120	3.602607	sparse dr	22.47	0.9955477	0.9582296	3.777496	3.937488
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.9841425	0.9129147	3.751120	3.602607														
sparse dr	22.47	0.9955477	0.9582296	3.777496	3.937488														

Case(3): $\beta_1 = (1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0)^T$, $\beta_2 = (0, 0, \dots, 0, 1, 1, 1, 1, 1)^T$, True beta 0의 개수 : 30개	Sparse dr																		
$\lambda_1 = (0.01, 0.01), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.9897923</td><td>0.9640755</td><td>3.982248</td><td>3.564794</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>29.52</td><td>0.9910237</td><td>0.9742756</td><td>4.090417</td><td>3.750457</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.9897923	0.9640755	3.982248	3.564794	sparse dr	29.52	0.9910237	0.9742756	4.090417	3.750457
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.9897923	0.9640755	3.982248	3.564794														
sparse dr	29.52	0.9910237	0.9742756	4.090417	3.750457														

$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2
	dr	0.00	0.9903003	0.9632674	3.821423	3.721649
	sparse dr	30.02	0.9424159	0.7998194	3.850717	3.677173
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 10개	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2
	dr	0.00	0.9861000	0.9708270	4.015291	2.217221
	sparse dr	30.01	0.9803134	0.8855361	4.119591	2.346826
$\lambda_1 = (0.1, 0.01), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 10개	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2
	dr	0.00	0.9860943	0.9702612	3.934985	1.977878
	sparse dr	27.48	0.9057710	0.9781346	3.930187	2.069311

<model 5>

$$Y_5 = (\beta_1^T X)^2 + 0.5\beta_2^T X + 0.2\varepsilon$$

n = 200, p = 20

Case(1): $\beta_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$ $\beta_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T$ True beta 0의 개수 : 38개	Sparse dr																		
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.9015751</td><td>0.6874325</td><td>0.24806573</td><td>2.213422</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>37.37</td><td>0.9997441</td><td>0.9519316</td><td>0.04492693</td><td>2.408697</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.9015751	0.6874325	0.24806573	2.213422	sparse dr	37.37	0.9997441	0.9519316	0.04492693	2.408697
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.9015751	0.6874325	0.24806573	2.213422														
sparse dr	37.37	0.9997441	0.9519316	0.04492693	2.408697														
$\lambda_1 = (0.1, 0.05), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.9015751</td><td>0.6874325</td><td>0.24806573</td><td>2.213422</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>37.89</td><td>1.0000000</td><td>0.9519349</td><td>0.04433987</td><td>2.408707</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.9015751	0.6874325	0.24806573	2.213422	sparse dr	37.89	1.0000000	0.9519349	0.04433987	2.408707
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.9015751	0.6874325	0.24806573	2.213422														
sparse dr	37.89	1.0000000	0.9519349	0.04433987	2.408707														
$\lambda_1 = (0.1, 0.05), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0</td><td>0.9348252</td><td>0.7841413</td><td>0.1384839</td><td>1.764273</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>38</td><td>1.0000000</td><td>0.9703274</td><td>0.0000000</td><td>1.792192</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0	0.9348252	0.7841413	0.1384839	1.764273	sparse dr	38	1.0000000	0.9703274	0.0000000	1.792192
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0	0.9348252	0.7841413	0.1384839	1.764273														
sparse dr	38	1.0000000	0.9703274	0.0000000	1.792192														

Case(2): $\beta_1 = (1, 1, 1, 0.1, 0.1, 0, \dots, 0)^T$, $\beta_2 = (0, 0, \dots, 0, 0.1, 0.1, 1, 1, 1)^T$, True beta 0의 개수 : 30개	Sparse dr					
$\lambda_1 = (0.01, 0.01), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 4개						
	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2
	dr	0.0	0.9797262	0.4418520	3.94459	2.141691
	sparse dr	21.8	0.9080583	0.3214264	3.81560	2.173087

$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.9797424</td><td>0.4423434</td><td>3.866103</td><td>2.017269</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>35.74</td><td>0.9655623</td><td>0.1601148</td><td>3.940063</td><td>1.956685</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.9797424	0.4423434	3.866103	2.017269	sparse dr	35.74	0.9655623	0.1601148	3.940063	1.956685
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.9797424	0.4423434	3.866103	2.017269														
sparse dr	35.74	0.9655623	0.1601148	3.940063	1.956685														
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.9807788</td><td>0.4662995</td><td>3.907071</td><td>1.948356</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>35.75</td><td>0.9690957</td><td>0.1473087</td><td>3.979200</td><td>1.956210</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.9807788	0.4662995	3.907071	1.948356	sparse dr	35.75	0.9690957	0.1473087	3.979200	1.956210
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.9807788	0.4662995	3.907071	1.948356														
sparse dr	35.75	0.9690957	0.1473087	3.979200	1.956210														
$\lambda_1 = (0.1, 0.05), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.9537961</td><td>0.6943232</td><td>3.818503</td><td>2.039708</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>34.98</td><td>0.8542076</td><td>0.3208446</td><td>3.561178</td><td>1.926632</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.9537961	0.6943232	3.818503	2.039708	sparse dr	34.98	0.8542076	0.3208446	3.561178	1.926632
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.9537961	0.6943232	3.818503	2.039708														
sparse dr	34.98	0.8542076	0.3208446	3.561178	1.926632														

Case(3): $\beta_1 = (1, 1, 1, 1, 1, 0, \dots, 0)^T$, $\beta_2 = (0, 0, \dots, 0, 1, 1, 1, 1)^T$, True beta 0의 개수 : 30개	Sparse dr																		
$\lambda_1 = (0.01, 0.01), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.4316639</td><td>0.08454211</td><td>2.734656</td><td>1.885188</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>23.62</td><td>0.2203903</td><td>0.07986797</td><td>2.230414</td><td>2.014137</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.4316639	0.08454211	2.734656	1.885188	sparse dr	23.62	0.2203903	0.07986797	2.230414	2.014137
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.4316639	0.08454211	2.734656	1.885188														
sparse dr	23.62	0.2203903	0.07986797	2.230414	2.014137														
$\lambda_1 = (0.05, 0.01), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.0</td><td>0.3597001</td><td>0.072620076</td><td>2.547514</td><td>1.912906</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>28.9</td><td>0.4886754</td><td>0.006923542</td><td>2.010319</td><td>1.940209</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.0	0.3597001	0.072620076	2.547514	1.912906	sparse dr	28.9	0.4886754	0.006923542	2.010319	1.940209
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.0	0.3597001	0.072620076	2.547514	1.912906														
sparse dr	28.9	0.4886754	0.006923542	2.010319	1.940209														
$\lambda_1 = (0.05, 0.01), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.8012559</td><td>0.4122566</td><td>3.459842</td><td>1.909934</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>33.73</td><td>0.7214096</td><td>0.2596883</td><td>3.397723</td><td>1.915082</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.8012559	0.4122566	3.459842	1.909934	sparse dr	33.73	0.7214096	0.2596883	3.397723	1.915082
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.8012559	0.4122566	3.459842	1.909934														
sparse dr	33.73	0.7214096	0.2596883	3.397723	1.915082														
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.3244805</td><td>0.06563743</td><td>2.462489</td><td>1.893912</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>34.49</td><td>0.5579383</td><td>0.09049100</td><td>2.653359</td><td>1.905140</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.3244805	0.06563743	2.462489	1.893912	sparse dr	34.49	0.5579383	0.09049100	2.653359	1.905140
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.3244805	0.06563743	2.462489	1.893912														
sparse dr	34.49	0.5579383	0.09049100	2.653359	1.905140														

<model 6>

$$Y_6 = \log(|\beta_1^T X + 3|) * \text{sign}(\beta_2^T X) + 0.3\varepsilon$$

n = 300, p = 40

Case(1): $\beta_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$, $\beta_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T$. True beta 0의 개수 : 78개	Sparse dr
--	-----------

$\lambda_1 = (0.01, 0.01), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2
	dr	0.00	0.8124052	0.8924323	0.38268107	2.118174
	sparse dr	63.78	0.9641079	0.9863830	0.07850886	2.110922
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.05$ slice 개수: 4개	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2
	dr	0	0.8124052	0.8924323	0.3826811	2.118174
	sparse dr	78	1.0000000	1.0000000	0.0000000	2.068330

Case(2): $\beta_1=(1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0)$ $\beta_2=(0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1)$ True beta 0의 개수 : 60개	Sparse dr																		
$\lambda_1=(0.01,0.01), \lambda_2=0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.0</td><td>0.7543497</td><td>0.5851777</td><td>3.563543</td><td>1.839152</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>54.1</td><td>0.8355395</td><td>0.7486166</td><td>3.798262</td><td>2.042167</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.0	0.7543497	0.5851777	3.563543	1.839152	sparse dr	54.1	0.8355395	0.7486166	3.798262	2.042167
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.0	0.7543497	0.5851777	3.563543	1.839152														
sparse dr	54.1	0.8355395	0.7486166	3.798262	2.042167														
$\lambda_1=(0.05,0.01), \lambda_2=0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.0</td><td>0.7543497</td><td>0.5851777</td><td>3.563543</td><td>1.839152</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>65.5</td><td>0.6691903</td><td>0.2604054</td><td>2.298235</td><td>2.618012</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.0	0.7543497	0.5851777	3.563543	1.839152	sparse dr	65.5	0.6691903	0.2604054	2.298235	2.618012
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.0	0.7543497	0.5851777	3.563543	1.839152														
sparse dr	65.5	0.6691903	0.2604054	2.298235	2.618012														
$\lambda_1=(0.05,0.01), \lambda_2=0.01$ slice 개수: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.8885770</td><td>0.6775665</td><td>3.865197</td><td>1.949734</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>59.86</td><td>0.6949699</td><td>0.1764802</td><td>2.455619</td><td>2.154638</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.8885770	0.6775665	3.865197	1.949734	sparse dr	59.86	0.6949699	0.1764802	2.455619	2.154638
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.8885770	0.6775665	3.865197	1.949734														
sparse dr	59.86	0.6949699	0.1764802	2.455619	2.154638														
$\lambda_1=(0.05,0.05), \lambda_2=0.05$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.7491676</td><td>0.5905225</td><td>3.530537</td><td>1.787060</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>77.03</td><td>0.3288655</td><td>0.2936073</td><td>2.718157</td><td>2.003606</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.7491676	0.5905225	3.530537	1.787060	sparse dr	77.03	0.3288655	0.2936073	2.718157	2.003606
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.7491676	0.5905225	3.530537	1.787060														
sparse dr	77.03	0.3288655	0.2936073	2.718157	2.003606														

Case(3): $\beta_1=(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0...0,0)$ $\beta_2=(0,0...0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1)$ True beta 0의 개수 : 60개	Sparse dr																		
$\lambda_1=(0.01,0.01), \lambda_2=0.01$ slice 개수: 4개																			
	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.7155065</td><td>0.6013300</td><td>3.46307</td><td>1.747512</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>50.58</td><td>0.7519425</td><td>0.6298458</td><td>3.75939</td><td>1.943649</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.7155065	0.6013300	3.46307	1.747512	sparse dr	50.58	0.7519425	0.6298458	3.75939	1.943649
	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2													
	dr	0.00	0.7155065	0.6013300	3.46307	1.747512													
sparse dr	50.58	0.7519425	0.6298458	3.75939	1.943649														

$\lambda_1 = (0.05, 0.01), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 4개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.0</td><td>0.7155065</td><td>0.6013300</td><td>3.463070</td><td>1.747512</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>64.1</td><td>0.4957000</td><td>0.2649962</td><td>2.674059</td><td>2.117620</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.0	0.7155065	0.6013300	3.463070	1.747512	sparse dr	64.1	0.4957000	0.2649962	2.674059	2.117620
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.0	0.7155065	0.6013300	3.463070	1.747512														
sparse dr	64.1	0.4957000	0.2649962	2.674059	2.117620														
$\lambda_1 = (0.05, 0.05), \lambda_2 = 0.01$ slice 개수: 10개	<table><tr><th>method</th><th>p</th><th>corr1</th><th>corr2</th><th>mse1</th><th>mse2</th></tr><tr><td>dr</td><td>0.00</td><td>0.7817200</td><td>0.6492801</td><td>3.670312</td><td>1.799867</td></tr><tr><td>sparse dr</td><td>77.14</td><td>0.4157279</td><td>0.3233558</td><td>3.093285</td><td>1.906111</td></tr></table>	method	p	corr1	corr2	mse1	mse2	dr	0.00	0.7817200	0.6492801	3.670312	1.799867	sparse dr	77.14	0.4157279	0.3233558	3.093285	1.906111
method	p	corr1	corr2	mse1	mse2														
dr	0.00	0.7817200	0.6492801	3.670312	1.799867														
sparse dr	77.14	0.4157279	0.3233558	3.093285	1.906111														