

מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים --- תרגיל בית 4

26 במאי 2024

הנחיות:

- ההגשה היא בזוגות בלבד ולפי ההנחיות המופיעות באתר הקורס. לא ייבדקו תרגילי בית שיוגשו לבד.
- יש להגיש שני קבצים בלבד:
 - קובץ PDF עם תשובות לשאלות וצילום מסך של קוד ופלטים.
 - קובץ ZIP המכיל את כל קובצי הקוד אותם נדרשתם לכתוב.

שאלה 1

א. כיתבו פונקציית python המממשת את שיטת הגרדיאנט עבור שיטת חיפוש קווי גנרית. הפונקציה מופעלת באופן הבא:

```
x , fs , gs , ts = generic_grad(f , gf , lsearch , x0 , eps)
```

כאשר הקלטים הם:

- `f, gf` --- הפונקציה f והגרדיאנט ∇f בהתאמה.
- `lsearch` --- פונקציית חיפוש קווי. הפונקציה תופעל באמצעות `lsearch(f, xk, gk)`, כאשר `gk` הגרדיאנט של f בנקודה x^k והיא מחזירה את גודל הצעד שיש לבצע.
- `x0` --- נקודת ההתחלה של השיטה.
- `eps` --- רמת דיוק. השיטה תעצור כאשר $|f(x^k) - f(x^{k+1})| \leq \varepsilon$.

הפונקציה מחזירה את הפלטרים הבאים:

- `x` --- הנקודה אליה התכנסה השיטה.
- `fs, gs` --- מערכים שגודלם ככמות האיטרציות המחזירים את הערכים של f כך ש- $fs(k) = f(x^k)$ ו- $gs(k) = \|\nabla f(x^k)\|$. הנקודה הראשונה במערך מתאימה לנקודת ההתחלה x^0 .
- `ts` --- מערך שגודלו ככמות האיטרציות כך ש-`ts(k)` הוא הזמן במילישניות שעבר מתחילת הרצת הפונקציה ועד סוף האיטרציה ה- k . השתמשו בפקודות `tic` ו-`toc` לצורך כך. הנקודה הראשונה במערך מתאימה לנקודת ההתחלה x^0 ולכן היא 0.

ב. ממשו שלוש פונקציות המופעלות באופן הבא:

```
lsearch = const_step(s)
lsearch = exact_quad(A)
lsearch = back(alpha, beta, s)
```

שכל אחת מהן מחזירה פונקציית חיפוש קווי כפי שהוגדרה בסעיף הקודם. הקלט של שיטת גודל צעד קבוע הוא גודל צעד $s > 0$. הקלט של חיפוש קווי מדויק הוא מטריצה $A \succ 0$ (שיטה זו מחזירה גודל צעד מדויק עבור פונקציות ריבועיות בלבד מהצורה $x^T A x$, כפי שראינו בתרגול). הקלטים של עקיבה לאחר הם פרמטרים $\alpha, \beta \in (0, 1)$ ו- $s > 0$.

ש לבדוק את תקינות הקלט של הפונקציה `exact_quad(A)` (כלומר, שאכן $A \succ 0$). השתמשו בפקודה `linalg.cholesky(A)` שמחזירה שגיאה אם המטריצה לא מוגדרת חיובית. כעת, נוכל להפעיל את שיטת הגרדיאנט הגנרית באחד מהאופנים הבאים:

```
x , fs , gs , ts = generic_grad(f, gf, const_step(s), x0, eps)
x , fs , gs , ts = generic_grad(f, gf, back(alpha, beta, s), x0, eps)
```

ואם f פונקציה ריבועית עם מטריצה מובילה A אז

```
x, fs, gs, ts = generic_grad(f, gf, exact_quad(A), x0, eps)
```

ג. תהי $f: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על-ידי $f(x) = x^T A^T A x$ עבור $A \in \mathbb{R}^{20 \times 5}$ מטריצה שכל רכיביה מוגרלים בהתפלגות אחידה בקטע $[0, 1]$. הפעילו את הפונקציה `generic_grad` עבור:

- גודל צעד קבוע $t^k \equiv \frac{1}{2\lambda_{\max}(A^T A)}$ לכל $k \geq 0$ (השתמשו בפונקציה `eigvals`).
- חיפוש קווי מדויק (לפי הנוסחה אותה פיתחנו בתרגול עבור פונקציות ריבועיות).
- עקיבה לאחר עם $(\alpha, \beta, s) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$.

נקודת ההתחלה עבור שלוש השיטות היא וקטור האחדות בגודל המתאים, ותנאי העצירה הוא $\varepsilon = 10^{-5}$. צרפו את שלושת התרשימים הבאים, שלושתם בסולם לוגריתמי בציר ה- y (השתמשו בפונקציה `semilogy`):

- ערך הפונקציה f בשלוש השיטות בכל איטרציה.
- נורמת הגרדיאנט בשלוש השיטות בכל איטרציה.
- נורמת הגרדיאנט בשלוש השיטות כפונקציה של הזמן.

שאלה 2

הדמיית נתונים (Data Visualization) הוא תחום בו מציגים נתונים באופן גרפי כך שניתן יהיה לפרש אותם טוב יותר. תחת תחום זה, ב-Multidimensional Scaling (MDS) מנסים להציג באופן גרפי את השוני בין אובייקטים מתוך בסיס נתונים. לקריאה נוספת:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_visualization

https://en.wikipedia.org/wiki/Multidimensional_scaling

בבעיית MDS קיים בסיס נתונים \mathcal{O} שבאמצעותו ניתן למדוד את השוני בין N האובייקטים שמרכיבים את \mathcal{O} , וכך לבנות את המטריצה D שנקראת Dissimilarity Matrix. זו מטריצה ריבועית וסימטרית המקיימת $D_{ij} = D_{ji}$. $\text{distance}(o_i, o_j) \geq 0$ כאשר $o_i, o_j \in \mathcal{O}$ (כלומר, הרכיב D_{ij} מראה כמה האובייקטים o_i ו- o_j שונים זה מזה). המטרה היא למצוא ייצוג דו-ממדי (קונפיגורציה) עבור כל אובייקט ב- \mathcal{O} כך שהמרחקים ב- \mathbb{R}^2 יבטאו כמה שיותר את המרחקים (שוני) בין האובייקטים. כלומר, לכל $o_i \in \mathcal{O}$ נמצא $x_i \in \mathbb{R}^2$ כך ש- $\|x_i - x_j\| \approx D_{ij}$. נעשה זאת על ידי פתרון בעיית המינימיזציה

$$(MDS) \quad \min_{\mathbf{X}} S(\mathbf{X}) \equiv \sum_{i < j} \left(\|x_i - x_j\|^2 - D_{ij}^2 \right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left(\|x_i - x_j\|^2 - D_{ij}^2 \right)^2$$

א. הסבירו באופן אינטואיטיבי מדוע בעיית (MDS) אכן מוצאת קונפיגורציה.

ב. הסבירו מדוע ניתן להפעיל את שיטת ירידת הגרדיאנט לפתרון (MDS). בהנחה שהסדרה $\{S(X^k)\}_{k \geq 0}$ המתקבלת ע"י שיטת הגרדיאנט היא מונוטונית יורדת, האם מובטחת התכנסות של השיטה תחת תנאי העצירה $S(X^k) - S(X^{k+1}) \leq \varepsilon$ עבור $\varepsilon > 0$? (בהמשך הקורס נראה שהסדרה אכן מונוטונית יורדת).

ג. הראו (למשל באמצעות כלל השרשרת) כי

$$\nabla S(\mathbf{X}) = 4 \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^N (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_j) (\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_j\|^2 - D_{1j}^2) \\ \sum_{j=1}^N (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_j) (\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_j\|^2 - D_{2j}^2) \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^N (\mathbf{x}_N - \mathbf{x}_j) (\|\mathbf{x}_N - \mathbf{x}_j\|^2 - D_{Nj}^2) \end{pmatrix}$$

ד. נניח כי קיימים $\tilde{i} \neq \tilde{j}$ עבורם $D_{\tilde{i}\tilde{j}} > 0$. הראו שכל קונפיגורציה מהצורה $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2 = \dots = \mathbf{x}_N \equiv (c, c) \in \mathbb{R}^2$ עבור c קבוע היא נקודה סטציונרית של $S(\mathbf{X})$. בנוסף, הסבירו מדוע כאשר נאתחל את שיטת הגרדיאנט עם קונפיגורציה מצורה זו, אז בטוח נתכנס לקונפיגורציה מאותה הצורה. (שימו לב שזו קונפיגורציה "מנוונת" במובן שכל האובייקטים עוברים לאותה הנקודה, אפילו שידוע שיש אובייקטים עם מרחק חיובי ממש).

כעת נניח שבכנסת יש שתי מפלגות, ועל בסיס ההצבעות של חברי הכנסת אנו מעוניינים להבין באופן גרפי את השוני בין מפלגת הימין למפלגת השמאל. נתון בסיס הנתונים הבא, שבו כל שורה מייצגת הצבעות של חבר כנסת אחד, כאשר 1 משמעו בעד, -1 משמעו נגד ו-0 משמעו נמנע

$$\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{8 \times 9}$$

ארבע השורות הראשונות הם חברי הכנסת מהימין, וארבע האחרונות הם חברי הכנסת מהשמאל. כמו כן, נניח שהשוני בין הצבעות חברי הכנסת נמדד באופן אוקלידי, כלומר $D_{ij} = \|\mathbf{o}_i - \mathbf{o}_j\|$.

ה. כיתבו קוד python המממש את שיטת הגרדיאנט עבור בעיית (MDS) המנסה למצוא קונפיגורציה ב- \mathbb{R}^2 לשמונת חברי הכנסת. תנאי העצירה הוא 1000 איטרציות, וגודל הצעד נקבע לפי שיטת גודל צעד קבוע עם $t \equiv \frac{1}{1000}$. בשביל להימנע מהתכנסות לנקודות מהצורה המתוארת בסעיף ד', אתחלו את האלגוריתם עם נקודה אקראית כלשהי (השתמשו בפקודה rand).

שרטטו את הקונפיגורציה שהתקבלה, כך שארבעת חברי הכנסת מהימין יהיו בכחול והארבעה מהשמאל יהיו באדום (השתמשו בפקודה scatter). האם ניתן לומר שקיים הבדל בין מפלגת הימין למפלגת השמאל?

בנוסף, צרפו תרשים המראה את ערכי פונקציית המטרה בכל איטרציה על בסיס לוגריתמי בציר ה-y (השתמשו בפקודה semilogy). האם ניתן לומר שהשיטה התכנסה לאחר 1000 איטרציות?

שאלה 3

תהי $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על-ידי

$$f(x, y) = x^2 + y^4 - y^2.$$

א. מציאו וסווגו את כל הנקודות הסטציונריות של f (מינימום/מקסימום מקומי/מקומי ממש, גלובלי/גלובלי ממש או אוקף).

ב. תהי $\{(x^k, y^k)\}_{k \geq 0}$ הסדרה הנוצרת על-ידי שיטת הגרדיאנט עבור נקודת התחלה כלשהי המקיימת $x^0 \in \mathbb{R}$ ו- $y^0 = 0$. סדרת גודלי הצעד $\{t^k\}_{k \geq 0}$ נבחרת באמצעות שיטת גודל צעד קבוע (ובמקרה זה ניתן להניח שהסדרה $\{(x^k, y^k)\}_{k \geq 0}$ היא מונוטונית יורדת ממש), חיפוש קווי מדויק או עקיבה לאחר. הוכיחו כי $(x^k, y^k) \rightarrow (0, 0)$ כאשר $k \rightarrow \infty$.

תחת ההנחה שאנו מעוניינים למצוא נקודת מינימום גלובלי של f , האם שיטת גרדיאנט עבור נקודת ההתחלה הנתונה התכנסה לנקודה כזו?

ג. לשיטת הגרדיאנט יש גרסאות רבות, מתוכן בוחרים את המתאימה ביותר לפי שיקולים שונים. אחת מהן נקראת "שיטת גרדיאנט מורעשת". צעד העדכון הכללי של השיטה הוא

$$\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k - t^k \nabla g(\mathbf{x}^k) + \beta^k$$

עבור $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה וכאשר $\beta^k \sim \text{Noraml}(\mu, \sigma)$ לכל $k \geq 0$ (זהו וקטור עמודה מגודל n שבו כל קואורדינטה מתפלגת נורמלית עם תוחלת $\mu \in \mathbb{R}$ וסטיות תקן $\sigma \geq 0$). השתמשו בפונקציה `normrnd` ממשו פונקציית `python` המשתמשת בשיטת הגרדיאנט וגם בשיטת הגרדיאנט המורעשת למציאת נקודת מינימום גלובלי של f הנתונה. הפונקציה מופעלת באופן הבא:

$$[x, x_noise, fs, fs_noise] = \text{ex3}(\mu, \sigma, x0, \epsilon)$$

כאשר x היא נקודת הפלט של הפונקציה של שיטת הגרדיאנט, x_noise היא נקודת הפלט של שיטת הגרדיאנט המורעשת, fs הוא מערך מגודל סך האיטרציות כך ש- $fs(k) = f(x^k) + 0.25$ עבור $\{x^k\}_{k \geq 0}$ הסדרה הנוצרת על-ידי שיטת הגרדיאנט ו- $fs_noise(k) = f(x^k) + 0.25$ עבור $\{x^k\}_{k \geq 0}$ הסדרה הנוצרת על-ידי שיטת הגרדיאנט המורעשת. עבור שתי השיטות הניחו ש- $t^k \equiv 0.1$ לכל $k \geq 0$. השתמשו בתנאי העצירה $|f(x^k) - f(x^{k+1})| \leq \epsilon$. צרפו את הפלט של הקוד הבא:

$$[x, x_noise, fs, fs_noise] = \text{ex3}(0, 0.0005, [100; 0], 1[\text{U+FFFD}])$$

כמו כן, צרפו תרשים אחד בעל סולם לוגריתמי בציר ה- y , המראה את ערכי `fs` ו-`fs_noise` כתלות בכמות האיטרציות של כל שיטה..

איזו מהשיטות התכנסה לנקודת מינימום גלובלי של f ? הסבירו את ההבדלים בתוצאות שבין השיטות (אין צורך לתת הוכחה מתמטית). בנוסף, ציינו לפחות חיסרון אחד של שיטת הגרדיאנט המורעשת ביחס לשיטת הגרדיאנט. האם ניתן להעריך מראש לאיזו נקודה תתכנס שיטת הגרדיאנט המורעשת?

שאלה 4

תהי $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה ברציפות ותהי $x \in \mathbb{R}^n$ נקודה שאינה סטציונרית. הוכיחו שפתרון אופטימלי עבור הבעיה

$$\min_{d \in \mathbb{R}^n} \{f'(x; d) : \|d\| = 1\}$$

$$d = -\frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|} \text{ הוא}$$

הערה: הסימון $f'(x; d)$ משמעו הנגזרת הכיוונית של f בנקודה $x \in \mathbb{R}^n$ ובכיוון $d \in \mathbb{R}^n$. עבור פונקציות גזירות ברציפות מתקיים $f'(x; d) = \nabla f(x)^T d$ (ניתן להשתמש בכך ללא הוכחה). מכאן, המשמעות של הטענה היא שהנגזרת הכיוונית המינימלית בנקודה $x \in \mathbb{R}^n$ מתקבלת בכיוון האנטי־גרדיאנט. כלומר, בכיוון זה מתקבלת הירידה הגדולה ביותר בערך הפונקציה מכל כיוון אחר (בהרצאה הוכחנו שכיוון האנטי־גרדיאנט הוא כיוון שבו מתקבלת ירידה בערך הפונקציה, וכעת הוכחנו שזהו גם הכיוון שיכול לתת את הירידה הגדולה ביותר).