

# Лекции по предмету Алгоритмы 2

Группа лектория ФКН ПМИ 2016-2017  
Данила Кутенин

2016/2017 учебный год

## Содержание

<b>1</b>	<b>Программа. Орг моменты</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Лекция 01 от 02.09.2016. Матроиды</b>	<b>2</b>
2.1	Матроид . . . . .	2
2.2	Приводимость одной базы к другой . . . . .	4
2.3	Жадный алгоритм на матроиде . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Лекция 2 от 06.09.2016. Быстрое преобразование Фурье</b>	<b>6</b>
3.1	Применение преобразования Фурье . . . . .	6
3.2	Алгоритм быстрого преобразования Фурье . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Лекция 3 от 16.09.2016. Алгоритм Карацубы, алгоритм Штрассена</b>	<b>9</b>
4.1	Перемножение 2 длинных чисел с помощью FFT . . . . .	9
4.2	Алгоритм Карацубы . . . . .	9
4.3	Перемножение матриц. Алгоритм Штрассена . . . . .	10
4.4	Эквивалентность асимптотик некоторых алгоритмов . . . . .	12

# Программа. Орг моменты

Внимание: программа дополняется после каждой лекции.

1. Матроиды.
2. Быстрое преобразование Фурье.
3. Алгоритм Карацубы, алгоритм Штрассена.

Формула такая же, как и в прошлом году:

$$0.3 \cdot O_{\text{контексты}} + 0.25 \cdot O_{\text{семинарские листки}} + 0.15 \cdot O_{\text{кр}} + 0.3 \cdot O_{\text{экзамен}} + B.$$

Округление вверх.

## Лекция 01 от 02.09.2016. Матроиды

Пока чуть отдаленно от матроидов.

У нас есть конечное множество  $A$ , которое в будущем мы будем называть *носителем*. Пусть  $F \subset 2^A$ , и  $F$  мы будем называть *допустимыми* множествами.

Также у нас есть весовая функция  $c(w) \forall w \in A$ . Для каждого  $B \in F$  мы определим *стоимость* множества, как  $\sum_{w \in B} c(w)$ . Наша задача заключается в том, чтобы найти максимальный вес из всех допустимых множеств.

**Пример 1** (Задача о рюкзаке). У каждого предмета есть вес и стоимость. Мы хотим унести как можно больше вещей максимальной стоимости с весом не более  $k$ .

Вес не более  $k$  нам задает ограничение, то есть множество  $F$ . А максимизация унесенной суммы нам и задаёт задачу.

## Матроид

Множество  $F$  теперь будет всегда обозначаться как  $I$ .

Матроидом называется множество подмножеств множества  $A$  таких, что выполняются следующие 3 свойства:

1.  $\emptyset \in I$
2.  $B \in I \Rightarrow \forall D \subset B \Rightarrow D \in I$
3. Если  $B, D \in I$  и  $|B| < |D| \Rightarrow \exists w \in D \setminus B$  такой, что  $B \cup w \in I$

Дальнейшее обозначение матроидов —  $\langle A, I \rangle$ .

**Определение 1.** Базой матроида называют множество всех таких элементов  $B \in I$ , что не существует  $B'$ , что  $B \subset B'$ ,  $|B'| > |B|$  и  $B' \in I$ . Обозначение  $\mathfrak{B}$ .

**Свойство 1.** Все элементы из базы имеют одну и ту же мощность. И все элементы из  $I$ , имеющие эту мощность, будут в базе.

Доказательство очевидно из определения.

**Пример 2** (Универсальный матроид). Это все подмножества  $B$  множества  $A$  такие, что  $|B| \leq k$  при  $k \geq 0$ . Все свойства проверяются непосредственно.

База такого матроида — все множества размера  $k$ .

**Пример 3** (Цветной матроид). У элементов множества  $A$  имеются цвета. Тогда  $B \in I$ , если все элементы множества  $B$  имеют разные цвета. Свойства проверяются непосредственно, в 3 свойстве надо воспользоваться принципом Дирихле.

База такого матроида — множества, где присутствуют все цвета.

**Пример 4** (Графовый матроид на  $n$  вершинах).  $\langle E, I \rangle$ . Множество ребер  $T \in I$ , если  $T$  не содержит циклов.

Докажем 3 свойство:

*Доказательство.* Пусть у нас есть  $T_1$  и  $T_2$  такие, что  $|T_1| < |T_2|$ . Разобьём граф, построенный на  $T_1$  на компоненты связности. Так как ребер ровно  $|T_1|$  на  $n$  вершинах, то компонент связности будет  $n - |T_1|$ . В другом случае компонент связности будет  $n - |T_2| < n - |T_1|$ . То есть во 2-ом графе будет меньше компонент связности, а значит по принципу Дирихле найдётся ребро, которое соединяет 2 компоненты связности в 1-ом графе.

Этот алгоритм чем-то отдаленно напоминает алгоритм Краскала. □

Базой в таком матроиде являются все остовные деревья.

**Пример 5** (Матричный матроид). Носителем здесь будут столбцы любой фиксированной матрицы.  $I$  — множество всех подмножеств из линейно независимых столбцов. Все свойства выводятся из линейной алгебры (3-е из метода Гаусса, если быть точным).

**Пример 6** (Трансверсальный матроид).  $G = \langle X, Y, E \rangle$  — двудольный граф с долями  $X, Y$ . Матроид будет  $\langle X, I \rangle$  такой, что  $B \in I$ , если существует паросочетание такое, что множество левых концов этого паросочетания совпадает с  $B$ .

Докажем 3 свойство:

*Доказательство.* Пусть есть 2 паросочетания на  $|B_1|$  и  $|B_2|$  ( $|B_1| < |B_2|$ ) вершин левой доли. Тогда рассмотрим симметрическую разность этих паросочетаний. Так как во 2-ом паросочетании ребер больше, то существует чередующаяся цепь, а значит при замене ребер на этой чередующейся цепи с новой добавленной вершиной (а она найдётся по принципу Дирихле) получим паросочетание с ещё 1 добавленной вершиной. □

Базой в таком матроиде будут вершины левой доли максимального паросочетания.

## Приводимость одной базы к другой

**Лемма 1.** Пусть  $B, D \in \mathfrak{B}$ . Тогда существует последовательность  $B = B_0, B_1, \dots, B_k = D$  такие, что  $|B_i \Delta B_{i+1}| = 2$ , где  $\Delta$  обозначает симметрическую разность множеств.

*Доказательство.* Будем действовать по шагам. Если текущее  $B_i \neq D$ , тогда возьмём произвольный элемент  $w$  из  $B_i \setminus D$ . Тогда по 2-ому пункту определения матроида следует, что  $B_i \setminus w \in I$ . Так как  $|B_i \setminus w| < |D|$ , то существует  $u \in D$  такой, что  $(B_i \setminus w) \cup u \in I$ . И теперь  $B_{i+1} \leftarrow (B_i \setminus w) \cup u$ . Мы сократили количество несовпадающих элементов с  $D$  на 1, симметрическая разность  $B_i$  и  $B_{i+1}$  состоит из 2 элементов —  $w$  и  $u$ .  $\square$

Наконец, мы подошли к основной теореме лекции — жадный алгоритм или теорема Радо-Эдмондса.

## Жадный алгоритм на матроиде

Доказательство будет в несколько этапов.

Для начала определимся с обозначениями.  $M = \langle A, I \rangle$ ,  $n = |A|$ ,  $w_i$  — элементы множества  $A$ . Решаем обычную задачу на максимизацию необходимого множества.

**Теорема 1** (Жадный алгоритм. Теорема Радо-Эдмондса). Если отсортировать все элементы  $A$  по невозрастанию стоимостей весовой функции:  $c_1 \geq c_2 \geq \dots \geq c_n$ , то такой алгоритм решает исходную задачу о нахождении самого дорогого подмножества:

---

**Algorithm 1** Жадный алгоритм на матроиде.

---

```

 $B \leftarrow \emptyset$ 
for  $c_i$  do
  if  $B \cup w_i \in I$  then
     $B \leftarrow B \cup w_i$ 

```

---

*Доказательство.* Теперь поймём, что наш алгоритм в итоге получит какой-то элемент из базы. Пусть  $B_i$  — множество, которое мы получим после  $i$  шагов цикла нашего алгоритма. Действительно, если это не так, что существует множество из базы, которое его покрывает: формально  $\exists D \in I : B_n \subset D$  и  $|B_n| < |D|$ , так как можно взять любой элемент из базы и добавлять в  $B_n$  по 1 элементу из пункта 3 определения матроида. Тогда у нас существует элемент  $w_i$ , который мы не взяли нашим алгоритмом, но  $B_{i-1} \cup w_i \in I$ , так как  $B_{i-1} \cup w_i \subset B_n \cup w_i \subset D$ , то есть это лежит в  $I$  по пункту 2 определения матроида. Значит мы должны были взять  $w_i$ , противоречие.

Рассмотрим последовательность  $d_i$  из 0 и 1 длины  $n$  такую, что  $d_i = 1$  только в том случае, если мы взяли алгоритмом  $i$ -ый элемент. А оптимальное решение задачи пусть будет  $e_i$  — тоже последовательность из 0 и 1. Последовательности будут обозначаться  $d$  и  $e$  соответственно.

Если на каком-то префиксе последовательности  $d$  единиц стало меньше, чем в  $e$ , то возьмём все элементы, которые помечены последовательностью  $e$  единицами. Пусть это множество будет  $E$ . Аналогично на этом префиксе последовательности  $d$  определим множество  $D$ .  $|D| < |E|$ ,  $D \in I$ ,  $E \in I$ , поэтому мы можем дополнить  $D$  каким-то элементом из  $E$ , которого не было в  $D$ . То есть на этом префиксе у  $d$  стоит 0 (пусть это будет место  $i$ ), но заметим, что на  $i$ -ом шаге мы обязаны были брать этот элемент, из-за рассуждений аналогичным рассуждению про базу (2 абзаца вверх).

Получаем, что на каждом префиксе  $d$  единиц не меньше, чем на этом же префиксе последовательности  $e$ . Значит 1-ая единица в  $d$  встретится не позже, чем в  $e$ , 2-ая единица в  $d$  не позже, чем 2-ая в  $e$  и т.д. по рассуждениям по индукции.

□

На лекции была теория про ранги. В доказательстве можно обойтись без неё, просто приложу то, что сказал Глеб. Может быть понадобится в задачах.

*Рангом* множества  $B \subset A$  (обозн.  $r(B)$ ) называют максимальное число  $k$  такое, что  $\exists C \subset B$  такое, что  $|C| = k, C \in I$ .

Эта функция обладает таким свойством: для любого элемента  $w \in A$  следует, что  $r(B \cup w) \leq r(B) + r(w)$ . Давайте поймём, почему так:

Если  $r(B \cup w) = r(B)$ , то всё хорошо, так как  $r(w) \geq 0$ . Если  $r(B \cup w) = r(B) + 1$  (других вариантов не бывает из определения), то тогда  $w \in I$ , так как в  $B \cup w$  найдётся такое  $C \subset (B \cup w)$ , что  $|C| = r(B \cup w), w \in C$  (иначе  $C$  годилось бы для  $B$  и  $r(B \cup w) = r(B)$ ), значит  $r(w) = 1$ , так как  $C \in I$ , а  $\{w\} \subset C$ .

# Лекция 2 от 06.09.2016. Быстрое преобразование Фурье

Чтобы быть успешным программистом, надо знать 3 вещи:

- Сортировки;
- Хэширование;
- Преобразование Фурье.

---

Глеб

В этой лекции будет разобрано дискретное преобразование Фурье (Discrete Fourier Transform).

## Применение преобразования Фурье

Допустим, что мы хотим решить такую задачу:

**Пример 1.** Даны 2 бинарные строки  $A$  и  $B$  длины  $n$  и  $m$  соответственно. Мы хотим найти, какая подстрока в  $A$  наиболее похожа на  $B$ . Наивная реализация решает эту задачу в худшем случае за  $O(n^2)$ . Преобразование Фурье поможет решить эту задачу за  $O(n \log n)$ , а именно научимся решать другую задачу:

**Цель.** Хотим научиться перемножать многочлены одной степени

$A(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$  и  $B(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_{m-1}x^{m-1}$  так, что  $C(x) = A(x)B(x)$ , то есть считать свёртку (найти все коэффициенты, если по-другому)  $\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} a_j b_{i-j} x^i$  за  $O(n \log n)$ .

Вернёмся к нашему примеру. Поймём как с помощью нашей **цели** решать задачу про бинарные строки.

Пусть  $A = a_0 \dots a_{n-1}$ ,  $B = b_0 \dots b_{m-1}$ . Их можно считать одной длины (просто добавим нулей в конец  $b$  при надобности). Теперь задача переформулировывается как нахождение максимального скалярного произведения  $B$  и некоторых циклических сдвигов  $A$  (до  $n - m + 1$ ).

Инвертируем массив  $B$  и припишем в конец  $n$  нулей, а к массиву  $A$  припишем самого себя. Посмотрим на все коэффициенты перемножения:

$$c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

Но  $b_i = 0$  при  $i \geq n$ , поэтому при  $k \geq n$ :

$$c_k = \sum_{i=0}^{n-1} b_i a_{k-i}$$

Выбрав нужные коэффициенты, мы решили эту задачу.

## Алгоритм быстрого преобразования Фурье

Основная идея алгоритма заключается в том, чтобы представить каждый многочлен через набор  $n$  точек и значений многочлена в этих точках, быстро (за  $O(n \log n)$ ) вычислить значения в каких-то  $n$  точках для обоих многочленов, потом перемножить за  $O(n)$  сами значения. Потом применить обратное преобразование Фурье и получить коэффициенты  $C(x) = A(x)B(x)$ .

Итак, для начала будем считать, что  $n = 2^k$  (просто добавим нулей до степени двойки).

Рассмотрим циклическую группу корней из 1 —  $W_n = \{e^{i\frac{2\pi k}{n}} \mid k = 0, \dots, n-1\}$ . Обозначим за  $w_n = e^{i\frac{2\pi}{n}}$ . Одно из самых главных свойств, что  $w_n^p \cdot w_n^q = w_n^{p+q}$ , которым мы будем пользоваться в дальнейшем.

Воспользуемся идеей метода «разделяй и властвуй».

Пусть  $A(x) = a_0 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ .

Представим  $A(x) = A_l(x^2) + xA_r(x^2)$  так, что

$$A_l(x^2) = a_0 + a_2x^2 + \dots + a_{n-2}x^{n-2}$$

$$A_r(x^2) = a_1 + a_3x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-2}$$

**Определение 1.** Назовём *Фурье-образом* многочлена  $P(x) = p_0 + \dots + p_{m-1}x^{m-1}$  вектор из  $m$  элементов —  $\langle P(1), P(w_m), P(w_m^2), \dots, P(w_m^{m-1}) \rangle$ .

Теперь рекурсивно запускаемся от многочленов меньшей степени. Так как для любого целого неотрицательного  $k$  следует, что  $2k$  четное число, то  $w_n^{2k} = w_{n/2}^k \in W_{n/2}$ , то есть мы можем уже использовать значения Фурье-образа для вычисления  $A(x)$ .

Если мы сможем за линейное время вычислить сумму  $A_l(x^2) + xA_r(x^2)$ , то суммарное время работы будет  $O(n \log n)$ , так как  $A_l(x), A_r(x)$  имеют степень в 2 раза меньше, чем  $A(x)$ .

Действительно это легко сделать из псевдокода, который приведен ниже:

---

### Algorithm 2 FFT

---

```

1: function FFT( $A$ )  $\triangleright$   $A$  — массив из комплексных чисел, функция возвращает Фурье-образ
2:    $n \leftarrow \text{length}(A)$ 
3:   if  $n == 1$  then
4:     return  $A$ 
5:    $A_l \leftarrow \langle a_0, a_2, \dots, a_{n-2} \rangle$ 
6:    $A_r \leftarrow \langle a_1, a_3, \dots, a_{n-1} \rangle$ 
7:    $\hat{A}_l \leftarrow \text{FFT}(A_l)$ 
8:    $\hat{A}_r \leftarrow \text{FFT}(A_r)$ 
9:   for  $k \leftarrow 0$  to  $\frac{n}{2} - 1$  do
10:     $A[k] \leftarrow \hat{A}_l[k] + e^{i\frac{2\pi k}{n}} \hat{A}_r[k]$ 
11:     $A[k + \frac{n}{2}] \leftarrow \hat{A}_l[k] - e^{i\frac{2\pi k}{n}} \hat{A}_r[k]$   $\triangleright$  Здесь минус перед комплексным числом из-за того,
    что мы должны найти другой угол, удвоенный которого на окружности будет  $\frac{2\pi(k+n/2)}{n}$ 
12:   return  $A$ 
```

---

Теперь поговорим про обратное FFT. Этого материала не было на лекции на момент написания:

Фактически, мы вычислили такую вещь за  $O(n \log n)$ :

$$\begin{pmatrix} w_n^0 & w_n^0 & w_n^0 & w_n^0 & \cdots & w_n^0 \\ w_n^0 & w_n^1 & w_n^2 & w_n^3 & \cdots & w_n^{n-1} \\ w_n^0 & w_n^2 & w_n^4 & w_n^6 & \cdots & w_n^{2(n-1)} \\ w_n^0 & w_n^3 & w_n^6 & w_n^9 & \cdots & w_n^{3(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_n^0 & w_n^{n-1} & w_n^{2(n-1)} & w_n^{3(n-1)} & \cdots & w_n^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{pmatrix}$$

где  $y_i$  — Фурье-образ многочлена  $A(x)$ .

Фактически нам надо найти обратное преобразование. Магическим образом обратная матрица к квадратной матрице выглядит почти также:

$$\frac{1}{n} \begin{pmatrix} w_n^0 & w_n^0 & w_n^0 & w_n^0 & \cdots & w_n^0 \\ w_n^0 & w_n^{-1} & w_n^{-2} & w_n^{-3} & \cdots & w_n^{-(n-1)} \\ w_n^0 & w_n^{-2} & w_n^{-4} & w_n^{-6} & \cdots & w_n^{-2(n-1)} \\ w_n^0 & w_n^{-3} & w_n^{-6} & w_n^{-9} & \cdots & w_n^{-3(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_n^0 & w_n^{-(n-1)} & w_n^{-2(n-1)} & w_n^{-3(n-1)} & \cdots & w_n^{-(n-1)(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Откуда получаем:  $a_k = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} y_j w_n^{-kj}$ .

Теперь напомним псевдокод обратного алгоритма:

---

**Algorithm 3** FFT\_inverted

---

```

1: function FFT_INVERTED( $A$ )  $\triangleright A$  — Фурье-образ, возвращает коэффициенты многочлена
2:    $n \leftarrow \text{length}(A)$ 
3:   if  $n == 1$  then
4:     return  $A$ 
5:    $A_l \leftarrow \langle a_0, a_2, \dots, a_{n-2} \rangle$ 
6:    $A_r \leftarrow \langle a_1, a_3, \dots, a_{n-1} \rangle$ 
7:    $\hat{A}_l \leftarrow \text{FFT\_inverted}(A_l)$ 
8:    $\hat{A}_r \leftarrow \text{FFT\_inverted}(A_r)$ 
9:   for  $k \leftarrow 0$  to  $\frac{n}{2} - 1$  do
10:     $A[k] \leftarrow \hat{A}_l[k] + e^{i\frac{-2\pi k}{n}} \hat{A}_r[k]$   $\triangleright$  Здесь угол идёт с минусом
11:     $A[k + \frac{n}{2}] \leftarrow \hat{A}_l[k] - e^{i\frac{-2\pi k}{n}} \hat{A}_r[k]$ 
12:     $A[k] \leftarrow A[k]/2$   $\triangleright$  Поделим на 2  $\log n$  раз, а значит поделим на  $n$  в итоге
13:     $A[k + \frac{n}{2}] \leftarrow A[k + \frac{n}{2}]/2$   $\triangleright$  Аналогично строчке выше
14:  return  $A$ 
```

---



# Лекция 3 от 16.09.2016. Алгоритм Карацубы, алгоритм Штрассена

## Перемножение 2 длинных чисел с помощью FFT

Пусть  $x = \overline{x_1 x_2 \dots x_n}$  и  $y = \overline{y_1 y_2 \dots y_n}$ . Распишем их умножение в столбик:

$$+ \frac{\begin{array}{c} x_1 x_2 \dots x_n \\ y_1 y_2 \dots y_n \\ z_{11} z_{12} \dots z_{1n} \\ z_{21} z_{22} \dots z_{2n} \\ \vdots \\ z_{n1} z_{n2} \dots z_{nn} \end{array}}{z_1 z_2 \dots z_{2n}}$$

Понятно, что наивное умножение 2 длинных чисел будет иметь сложность  $O(n^2)$ .

Давайте научимся перемножать 2 числа быстрым преобразованием Фурье за  $O(n \log n)$ .

Пусть  $a = \overline{a_{n-1} \dots a_0}, b = \overline{b_{n-1} \dots b_0}$ .

Тогда введём многочлены  $f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i, g(x) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i$ .

За  $O(n \log n)$  мы можем найти  $h(x) = (f(x) \cdot g(x)) = \sum_{i=0}^{2n-2} c_i x^i$ .

После этого надо аккуратно провести переносы разрядов таким образом:

---

**Algorithm 4** Умножение 2 длинных чисел.

---

---

```

1: function УМНОЖЕНИЕ_2_ДЛИННЫХ_ЧИСЕЛ( $h(x)$ )  $\triangleright h(x)$  — перемножение 2 многочленов
    $f(x)$  и  $g(x)$ .
2:    $carry \leftarrow 0$ 
3:   for  $i = 0$  to  $2n - 2$  do
4:      $h_i \leftarrow h_i + carry$ 
5:      $carry \leftarrow \lfloor \frac{h_i}{10} \rfloor$ 
6:      $h_i \leftarrow h_i \bmod 10$ 

```

Но этот метод плохо применим на практике из-за того, что быстрое преобразование Фурье имеет очень большую константу.

## Алгоритм Карацубы

Какое-то время человечество не знало алгоритмов перемножения быстрее, чем за  $O(n^2)$ . А.Н. Колмогоров считал, что это вообще невозможно. В один момент собрались математики на мехмате МГУ и решили доказать, что это невозможно. Но один из аспирантов (Анатолий Алексеевич Карацуба) Колмогорова пришёл и сказал, что у него получилось сделать это быстрее. Давайте посмотрим, как:

Будем считать, что  $n = 2^k$  (если это не так, дополним нулями, сложность вырастет лишь в константу раз).

Для начала просто попробуем воспользоваться стратегией «Разделяй и властвуй». Разобьём числа в разрядной записи пополам. Тогда

$$\begin{aligned} & \times \begin{cases} x = 10^{n/2}a + b \\ y = 10^{n/2}c + d \end{cases} \\ & \quad \downarrow \\ & xy = 10^n ac + 10^{n/2}(ad + bc) + bd \end{aligned}$$

Как видно, получается 4 умножения чисел размера  $\frac{n}{2}$ . Так как сложение имеет сложность  $\Theta(n)$ , то

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$$

Чему равно  $T(n)$ ? Если посмотреть на дерево исходов или воспользоваться индукцией, то получим, что  $T(n) = O(n^2)$ , что, конечно, неэффективно.

Анатолий Алексеевич проявил недюжие способности и предложил следующее:

Разложим  $(a + b)(c + d)$ :

$$(a + b)(c + d) = ac + (ad + bc) + bd \implies ad + bc = (a + b)(c + d) - ac - bd$$

Подставим это в начальное выражение для  $xy$ :

$$xy = 10^n ac + 10^{n/2}((a + b)(c + d) - ac - bd) + bd$$

Отсюда видно, что достаточно посчитать три числа размера  $\frac{n}{2}$ :  $(a + b)(c + d)$ ,  $ac$  и  $bd$ . Тогда:

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$$

Докажем, что  $T(n) = O(n^{\log_2 3})$ .

Рассмотрим дерево исходов: в каждой вершине дерева мы выполняем не более  $Cm$  действий, где  $C$  —какая-то фиксированная константа, а  $m$  — размер числа на данном шаге, поэтому

$$T(n) \leq Cn \left(1 + \frac{3}{2} + \dots + \frac{3^{\log_2 n}}{2^{\log_2 n}}\right), \text{ так как на каждом шаге мы запускаемся 3 раза от задачи в 2 раза}$$

$$\text{Откуда } T(n) \leq Cn \cdot \frac{3^{\log_2 n} - 1}{1/2} = 2Cn^{\log_2 3} = O(n^{\log_2 3}) \approx O(n^{1.5849})$$

Полученный алгоритм называется алгоритмом Карацубы.

## Перемножение матриц. Алгоритм Штрассена

После идеи А.А. Карацубы, появились многие алгоритмы, использующие ту же идею. Одним из этих алгоритмов является алгоритм Штрассена. Будем считать, что  $n = 2^k$  снова (оставляем читателю самим подумать, как дополнить матрицы  $m \times t$ ,  $t \times u$ , чтобы потом легко восстановить ответ)

Пусть у нас есть квадратные матрицы

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

Сколько операций нужно для умножения матриц? Умножим их по определению. Матрицу  $C = AB$  заполним следующим образом:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

Всего в матрице  $n^2$  элементов. На получение каждого элемента уходит  $O(n)$  операций (умножение за константное время и сложение  $n$  элементов). Тогда умножение требует  $n^2 O(n) = O(n^3)$  операций.

Попробуем применить аналогичную стратегию «Разделяй и властвуй». Представим матрицы  $A$  и  $B$  в виде:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

где каждая матрица имеет размер  $\frac{n}{2}$ . Тогда матрица  $C$  будет иметь вид:

$$C = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}$$

Как видно, получаем 8 перемножений матриц порядка  $\frac{n}{2}$ . Тогда

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2)$$

По индукции получаем, что  $T(n) = O(n^{\log_2 8}) = O(n^3)$ .

Можно ли уменьшить число умножений до 7? Алгоритм Штрассена утверждает, что можно. Он предлагает ввести следующие матрицы (даже не спрашивайте, как до них дошли):

$$\begin{cases} M_1 = (A_{11} + A_{22})(B_{11} + B_{22}); \\ M_2 = (A_{21} + A_{22})B_{11}; \\ M_3 = A_{11}(B_{12} - B_{22}); \\ M_4 = A_{22}(B_{21} + B_{11}); \\ M_5 = (A_{11} + A_{12})B_{22}; \\ M_6 = (A_{21} - A_{11})(B_{11} + B_{12}); \\ M_7 = (A_{12} - A_{22})(B_{21} + B_{22}); \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{cases} C_1 = M_1 + M_4 - M_5 + M_7; \\ C_2 = M_3 + M_5; \\ C_3 = M_2 + M_4; \\ C_4 = M_1 - M_2 + M_5 + M_6; \end{cases}$$

Можно проверить что всё верно (оставим это как наказание упражнение читателю). Сложность алгоритма:

$$T(n) = 7T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2) \implies T(n) = O(n^{\log_2 7}) \approx O(n^{2.8073})$$

Доказательство времени работы такое же, как и в алгоритме Карацубы.

Также существует модификация алгоритма Штрассена, где используется лишь 15 сложений матриц на каждом шаге, вместо 18 предъявленных выше.

## Эквивалентность асимптотик некоторых алгоритмов

Этот раздел не войдёт в экзамен.

Здесь мы поговорим об обращении и перемножении 2 матриц. Докажем, что асимптотики этих алгоритмов эквивалентны.

**Теорема 1** (Умножение не сложнее обращения). *Если можно обратить матрицу размеров  $n \times n$  за время  $T(n)$ , где  $T(n) = \Omega(n^2)$ , и  $T(3n) = O(T(n))$  (условие регулярности), то две матрицы размером  $n \times n$  можно перемножить за время  $O(T(n))$*

*Доказательство.* Пусть  $A$  и  $B$  матрицы одного порядка размера  $n \times n$ . Пусть

$$D = \begin{pmatrix} I_n & A & 0 \\ 0 & I_n & B \\ 0 & 0 & I_n \end{pmatrix}$$

Тогда легко понять, что

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} I_n & -A & AB \\ 0 & I_n & -B \\ 0 & 0 & I_n \end{pmatrix}$$

Матрицу  $D$  мы можем построить за  $\Theta(n^2)$ , которое является  $O(T(n))$ , поэтому с условием регулярности получаем, что  $M(n) = O(T(n))$ , где  $M(n)$  — асимптотика перемножения 2 матриц.  $\square$

С обратной теоремой предлагаем ознакомиться в книге Кормена или Ахо, Хопкрофта и Ульмана.