

# Programmi ed esercizi per il Senior

I programmi sono descritti sinteticamente all'inizio, come linee guida. Il testo successivo serve per specificare alcuni dettagli e come controllo per non dimenticare niente per chi fa lezione.

## 1 Programmi Basic

### 1.1 GB - 1 [Metodi Algebrici]

### 1.2 GB - 2 [Trasformazioni]

Isometrie: Traslazione, Simmetria, Rotazione. Similitudine. Scrittura di queste trasformazioni in complessi. [★ Affinità] Inversione Circolare. Inversione + Simmetria in un triangolo.

**Isometrie.** Le isometrie sono trasformazioni che conservano la distanza. Le figure mantengono la stessa forma: le rette vanno in rette, circonferenze in circonferenze, poligoni in poligoni, gli angoli mantengono la misura.

Le isometrie più importanti sono traslazione, riflessione e rotazione.

La traslazione si definisce con un vettore  $\vec{v}$ , che manda ogni punto  $P$  in  $P + \vec{v}$  (in cartesiane e in complessi).

La rotazione si definisce tramite un centro  $C$  e un angolo  $\alpha$  tra 0 e 360. In complessi, se il centro è l'origine, il punto  $z$  viene mandato in  $z \cdot e^{i\alpha}$ ; se il centro è un altro punto, allora bisogna fare una traslazione, rotazione e traslare indietro:  $z \rightarrow (z - c) \cdot e^{i\alpha} + c$ .

La riflessione si definisce tramite una retta  $r$ , ogni punto viene mandato nel suo simmetrico rispetto a questa retta.

La riflessione inverte l'orientamento a differenza della traslazione e della rotazione.

Come per la rotazione, per scrivere in complessi la riflessione si compongono tre trasformazioni: si sceglie un punto  $c$  sulla retta e sia  $\alpha$  l'angolo che forma con l'asse reale, allora  $z$  va in  $(z - c)e^{-i\alpha} \cdot e^{i\alpha} + c = (z - c) \cdot e^{2i\alpha} + c$ .

*Esempio easy:*  $ABC$  triangolo,  $H$  ortocentro,  $AH$  interseca  $BC$  in  $D$  e la circonferenza circoscritta in  $N$ . Dimostrare  $DH = HN$ .

[★ Fatti sparsi:

1) ogni isometria è composizione di al massimo tre riflessioni.

2) Si possono dividere in due gruppi, a seconda se mantengono l'orientamento oppure no. Quelle che mantengono l'orientamento sono traslazione e rotazione, quelle che lo invertono sono riflessione e glissoriflessione (=traslazione lungo una retta e riflessione lungo quella retta), questa sono tutte le isometrie possibili

3) rotazione di  $\alpha$  + rotazione di  $\beta$  = rotazione di  $\alpha + \beta$  se  $\alpha + \beta \neq 0$ , altrimenti è traslazione. Traslazione + rotazione di  $\alpha$  = rotazione di  $\alpha$  con un altro centro. analogamente per rotazione + traslazione]

### Affinità

**Inversione.** A ogni punto  $P$  associa  $P'$  tale che  $OP \cdot OP' = R^2$ . Costruzione con le tangenti (per punto esterno) e al contrario per punto interno. È involutiva, scambia interno ed esterno, i punti sulla circonferenza di inversione rimangono gli stessi.

Le rette per l'origine rimangono rette per l'origine, circonferenze per l'origine diventano rette non per l'origine [questo si può dimostrare], circonferenze non per l'origine diventano circonferenze non per l'origine. Calcolo di  $A'B' = \frac{AB \cdot R^2}{OA \cdot OB}$ , dire che  $OAB$  e  $OB'A'$  sono simili. L'inversione conserva gli angoli tra le curve, ma non gli angoli tra punti.

*Esempio* Teorema di Tolomeo.

In complessi, l'inversione nell'origine di raggio  $R$  manda  $z$  in  $R^2 \cdot \bar{z}^{-1}$ .

[★ Si può fare un ponte tra potenze e inversione: una circonferenza  $\gamma$  è invariata per inversione in  $O$  di raggio  $R$  se  $\text{pow}_\gamma(O) = R^2$ . per esempio  $\gamma$  circoscritta ad  $ABC$ ,  $P$  è l'intersezione della tangente in  $A$  con  $BC$ , allora l'inversione in  $P$  di raggio  $PA$  scambia  $B$  e  $C$  e di conseguenza lascia invariata  $\gamma$ ]

### 1.3 GB - 3 [Sintetica]

Circonferenza di Apollonio. Circonferenza di Feuerbach. Simmediana. Segmenti di tangenza di Incerchi/Excerchi, punti di Gergonne e Nagel. Retta di simson. Applicazioni di potenze e assi radicali.

## 2 Programmi Medium

### 2.1 GM - 1 [Numeri complessi e coordinate baricentriche]

Numeri complessi nella geometria euclidea. Si assume che si possieda una discreta maneggevolezza con il piano complesso. Rapido ripasso sulla forma polare dei numeri complessi e significato geometrico delle operazioni.

Condizione di allineamento e scrittura dell'equazione di una retta per due punti. Condizione di parallelismo e scrittura della parallela ad una retta passante per un punto ad essa esterno. Condizione di perpendicolarità e scrittura della perpendicolare ad una retta passante per un punto ad essa esterno. Birapporto fra 4 numeri complessi e condizione di ciclicità.

Equazione di una generica circonferenza. Scelta classica delle coordinate: circonferenza circoscritta  $\equiv$  circonferenza unitaria. Punti notevoli nella scelta classica delle coordinate. Esempio di quanto si semplificano i conti: intersezione di due corde generiche. Coordinate  $u, v, w$  per l'incentro.

Definizione di coordinate baricentriche.

Come verificare l'allineamento di tre punti ed equazione di una retta generica. Intersezione di due rette. Area di un triangolo di cui si conoscono le coordinate dei vertici. Punto all'infinito di una retta. Quando due rette sono parallele?

Punti notevoli e notazione di Conway: baricentro, incentro, ortocentro, circocentro, excentri, nagel, gergonne, lemoine... Coniugati isogonali e coniugati isotomici.

Equazione della circonferenza circoscritta (come coniugato isogonale della retta all'infinito). Equazione di una circonferenza in posizione generale. Equazione dell'asse radicale fra una circonferenza in posizione generale e la circonferenza circoscritta al triangolo referenziale: relazione di tale equazione con le potenze dei vertici del triangolo referenziale rispetto alla circonferenza in posizione generale. Formula di sdoppiamento per la tangente e la polare.

## 2.2 GM - 2, [Geometria proiettiva, poli e polari, quadrilateri armonici]

Lunghezze con segno (velocemente). Birapporto tra 4 punti su una retta. Proiezione del birapporto, quindi birapporto tra 4 rette o 4 punti su circonferenza. Quaterna Armonica. Teorema di Desargues. Polo e Polare. Teorema di La Hire. Lemma della polare. Teorema di Pappo. Teorema di Pascal. Dualità polo-polare.

Lunghezze con segno. Definizione di birapporto fra 4 punti  $(A, B; C, D)$  su una retta e quando si dicono coniugati armonici. Conservazione del birapporto fra punti per proiezione da un punto esterno. Discussione del caso in cui, proiettando da un punto esterno su una retta, un punto va nel punto all'infinito: cosa diventa il birapporto nel caso in cui un punto sia all'infinito? Unicità del quarto armonico. Definizione di birapporto fra 4 rette e relazione con gli angoli che queste formano. Definizione di birapporto fra 4 punti su una circonferenza. Teorema di Desargues, Teorema di Pappo e Teorema di Pascal.

Definizione proiettiva di polare: data una circonferenza (o due rette) e punto  $P$ , si traccino le rette che passano per  $P$  e secano la circonferenza (o incontrano le rette) in due punti  $A$  e  $B$ . Il luogo dei punti  $X$  tali che  $(A, B; P, X) = -1$  è una retta detta polare di  $P$  rispetto alla circonferenza (o alle due rette). Proprietà geometriche nel caso della circonferenza.

Dualità poli-polari. Lemma della polare: Dato un punto  $P$  e una circonferenza (o due rette), se traccio due rette secanti che tagliano la circonferenza (o le rette) in due coppie di punti  $A, B$  e  $C, D$  dimodoché i punti siano nell'ordine  $P, A, B$  e  $P, C, D$ , allora  $AD \cap BC$  e  $AC \cap BD$  sono sulla polare di  $P$  rispetto alla circonferenza (o alle due rette). Teorema di Brianchon.

Definizione di quadrilatero armonico con i birapporti. In un quadrilatero armonico una diagonale e la tangenti alla circonferenza in cui è inscritto condotte per gli altri due punti concorrono.

### Versione estesa

Il setting della geometria proiettiva è quello della retta euclidea a cui viene aggiunto un punto all'infinito, o del piano euclideo in cui viene aggiunta una retta all'infinito.

**Lunghezze con segno** Su una retta  $r$  sono presenti alcuni punti  $A, B, C, \dots$ . Si scelga un verso sulla retta e si considerino i segmenti su di essa come vettori, con segno positivo se orientati nel verso scelto e negativo altrimenti. Il vantaggio di questo è che vale  $\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC}$  per qualsiasi posizione reciproca di  $A, B, C$ .

**Birapporto** Dati 4 punti  $A, B, C, D$  su una retta, si definisce il birapporto è la seguente quantità:

$$(A, B; C, D) = \frac{\frac{AC}{AD}}{\frac{BC}{BD}} = \frac{AC \cdot BD}{BC \cdot AD}$$

dove le lunghezze sono prese con segno.

Se  $(A, B; C, D) = k$ , qual è il valore del birapporto se si permuta l'ordine in cui si prendono i punti? Le  $4! = 24$  possibilità si dividono in 6 gruppi in ciascuno dei quali il birapporto è lo stesso. Se si scambiano le due coppie oppure si inverte l'ordine in entrambe il birapporto non cambia:  $(A, B; C, D) = (C, D; A, B) = (B, A; D, C)$ .

Se si scambiano i primi due o gli ultimi due, il birapporto diventa reciproco:  $(A, B; D, C) = (B, A; C, D) = 1/k$ .

Se si scambia il secondo e il terzo  $B \leftrightarrow C$ , si ottiene  $(A, C; B, D) = 1 - k$ .

Se si scambia il primo e il terzo  $A \leftrightarrow C$ , si ottiene  $(C, B; A, D) = \frac{k}{k-1}$ .

Combinando queste trasformazioni, si possono ottenere i valori di  $(A, C; D, B) = \frac{1}{1-k}$  e  $(A, D; B, C) = \frac{k-1}{k}$ .

Un'altra cosa interessante è fissare i punti  $A, B, C$  e vedere come varia il birapporto  $(A, B; C, D)$  al variare di  $D$  sulla retta. Questa è una funzione biettiva dalla retta proiettiva in  $\mathbb{R} \cup \infty$ , nei casi degeneri in cui  $D$  coincide con uno dei punti assume i valori degeneri di  $0, 1, \infty$ ; se  $D = \infty$ , il birapporto vale  $AC/BC$ .

**Quaterna Armonica** Quattro punti su una retta si dicono una quaterna armonica se  $(A, B; C, D) = -1$ . Per quanto detto sulle permutazioni, una quaterna è armonica se e solo se non è degenera e  $(A, B; C, D) = (B, A; C, D)$ . Una quaterna armonica dev'essere "incatenata": fissati  $A, B$ , uno tra  $C$  e  $D$  deve stare all'interno del segmento  $AB$  e uno all'esterno. Analogamente si avrà che uno tra  $A$  e  $B$  sta all'interno del segmento  $CD$  e uno all'esterno.

## 2.3 GM - 3 [Configurazione di Miquel, rotomotetia, qualcosa sulle mistilinee e inversioni sintetiche]

Angoli orientati, Miquel su triangolo e su quadrilatero. Lemma della rotomotetia. Quadrilatero completo e rotomotetie presenti nella configurazione. Altre applicazioni di inversione. mistilinei,

Angoli orientati ed esercizi/complementi sui quadrilateri ciclici.

Punto di Miquel riferito a una terna di punti presi sui lati di un triangolo. Punto di Miquel riferito a un quadrilatero. Facendo opportuno riferimento all'esercizio 2 della sezione **GM-1**, osservare che il punto di Miquel di un quadrilatero  $ABCD$  è il centro della *spiral similarity* che manda  $AB$  in  $DC$  o  $AD$  in  $BC$ . Il quadrilatero  $ABCD$  è ciclico se e solo se il punto di Miquel  $M$  sta su  $QR$ , dove  $Q = AB \cap CD$  e  $R = AD \cap BC$ .

Nel caso di ciclicità:

- $OM$  è perpendicolare a  $QR$ , essendo  $O$  il circocentro di  $ABCD$ ;
- $A, C, M, O$  e  $B, D, M, O$  sono conciclici;
- $AC, BD$  e  $OM$  sono concorrenti in  $P$ ;
- $MO$  biseca  $\angle CMA$  e  $\angle BMD$ ;
- $P$  e  $M$  sono inversi rispetto alla circonferenza circoscritta al quadrilatero  $ABCD$ .

Un'avventura mistilinea: considerati quattro punti in senso antiorario su una circonferenza  $\Gamma (A, B, C, D)$  ed essendo  $P = AC \cap BD$ , considero  $\omega$  tangente ai segmenti  $AP$  e  $BP$  e a  $\Omega$  rispettivamente in  $E, F$  e  $T$ . Provare le seguenti:

- $TE$  biseca l'arco  $AC$  che contiene  $D$ ;
- Detto  $I$  l'incentro di  $ABC$ ,  $IFTB$  è ciclico e  $I \in EF$
- Detto  $J$  l'incentro di  $APB$  allora  $TJFB$  è ciclico e  $TJ$  biseca  $\angle ATB$ .

Ripasso delle proprietà base riguardanti l'inversione.  $\sqrt{bc}$ -inversione più simmetria: risoluzione di alcuni problemi.

### 3 Esercizi Basic

#### 3.1 GB-1, Esercizi

1. Teoremi di Napoleone e Vecten (enunciato in G2)

#### 3.2 GB-2, Esercizi

1. Fare i conti per traslazioni, rotazioni, riflessioni, inversione in complessi.
2. **Problema di Fagnano** Sia  $ABC$  un triangolo acutangolo,  $P, Q, R$  tre punti variabili sui lati  $BC, AC, AB$  rispettivamente. Per quale posizione dei tre punti il perimetro del triangolo  $PQR$  è minimo?  
*Sol:* Sia  $P_1$  il simmetrico di  $P$  rispetto  $AB$  e  $P_2$  rispetto  $AC$ . Allora il perimetro  $PR + RQ + QP = P_1R + RQ + QP_2$  è la lunghezza della spezzata  $P_1RQP_2$ , fissato  $P$  è minimo se i quattro punti sono allineati. Inoltre  $\widehat{P_1AP_2} = 2 \cdot \widehat{BAC}$  e  $AP_1 = AP_2 = AP$ , quindi  $P_1P_2 = AP \sin \widehat{BAC}$  è minimo quando è minimo  $AP$ . Quindi  $P$  è piede dell'altezza da  $A$ , e in tale caso anche  $Q$  e  $R$  lo sono
3. **Teorema di Napoleone** Sia  $ABC$  un triangolo e si costruisca un triangolo equilatero su ciascuno dei lati di  $ABC$ , esterno ad esso. Chiamati  $O_A, O_B, O_C$  i centri dei tre triangoli, dimostrare che  $O_AO_BO_C$  è un triangolo equilatero.

#### 3.3 GB-3, Esercizi

1. [Copiato da GM] Sia  $ABC$  un triangolo con ortocentro  $H$  e siano  $D, E$  e  $F$  i piedi delle altezze che cadono sui lati  $BC, CA$  e  $AB$  rispettivamente. Sia  $T = EF \cap BC$ .  
Mostrare che  $TH$  è perpendicolare alla mediana condotta da  $A$ .  
*Sol:* Oltre alla soluzione per inversione, pensavo anche qualcosa con gli assi radicali: il centro radicale delle circonferenze per  $AEFH, BCH, ABEF$  è  $T$ , quindi  $TH$  passa per l'intersezione di  $AEFH$  e  $BCH$  che chiamo  $P$ . Allora  $APH$  è retto in quanto diametro inversione di centro  $A$  e raggio  $AH \cdot HD$ . La tesi diventa equivalente a mostrare che la circonferenza per  $D$  (immagine di  $H$ ), per l'intersezione della circoscritta con  $AEF$  (immagine di  $T$ ) e  $A$  ha la retta  $AM$  come diametro. Questo segue perché in effetti  $M, T', A, D$  sono ciclici
2. Sia  $ABC$  un triangolo,  $E, F$  i piedi delle altezze su  $AC, AB$ . Sia  $H$  l'ortocentro,  $M$  il punto medio di  $BC$  e  $Q$  l'intersezione più vicina ad  $A$  di  $HM$  con la circoscritta  $\Gamma$ . Sia  $T = EF \cap BC$ . Dimostrare che  $T, Q, A$  sono allineati.  
*Sol:* Usare due fatti 1) Il punto  $Q$  è l'intersezione di  $\Gamma$  con la circonferenza di diametro  $AH$  ed è allineato con  $H, M$  e il simmetrico di  $A$  rispetto  $O$  2) Assi radicali di  $AQH, ABC, BCEF$ .
3. Sia  $ABC$  un triangolo con  $I$  incentro e  $I_A$  centro della circonferenza ex-inscritta relativa ad  $A$ . Sia  $\Gamma$  la circonferenza circoscritta ad  $ABC$  e sia  $M$  il punto medio dell'arco  $BC$  non contenente  $A$ .  
Dimostrare che  $B, I, C, I_A$  si trovano su una stessa circonferenza di centro  $M$
4. Sia  $ABC$  un triangolo,  $\omega$  la circonferenza inscritta tangente a  $BC$  in  $D$ . Sia  $M$  il punto medio di  $BC$  e  $E$  il simmetrico di  $D$  rispetto a  $M$ . Sia  $T$  il diametralmente opposto a  $D$  in  $\omega$ . Dimostrare che  $A, T, E$  sono allineati.  
*Sol:* Calcolare i segmenti di tangenza di inscritta ed ex-inscritta, poi omotetia in  $A$
5. Proprietà varie della circonferenza di Feuerbach.

## 4 Esercizi Medium

### 4.1 GM - 1, Esercizi

1. [Scrittura del coniugato isogonale in complessi] Dimostrare che in un triangolo  $abc$  inscritto in una circonferenza unitaria centrata nell'origine, il coniugato isogonale di  $p$  è

$$q = \frac{-p + a + b + c - \bar{p}(ab + bc + ca) + \bar{p}^2 abc}{(1 - p\bar{p})}. \quad (1)$$

2. [Seconda intersezione di due circonferenze in complessi] Siano dati 4 punti  $a, b, c, d$  nel piano complesso che non formano un parallelogrammo.

Mostrare che esiste una e una sola rotomotetia che manda  $a$  in  $b$  e  $c$  in  $d$ . Detto  $x$  il centro di tale rotomotetia e  $\alpha$  la ragione, si ha

$$c = \frac{ad - bc}{a - b - c + d}$$

$$\alpha = \frac{b - d}{a - c}.$$

Mostrare che l'intersezione delle circonferenze circoscritte a  $ABX$  e  $CDX$  dove  $AC$  e  $BD$  sono segmenti non paralleli le cui rette si intersecano in  $X$ , è il centro della rotomotetia che manda  $A$  in  $B$  e  $C$  in  $D$ .

3. [Una caratterizzazione della polare come luogo dei quarti armonici] Sia  $\gamma$  la circonferenza unitaria centrata nell'origine e sia  $P$  un punto qualsiasi. Siano  $r$  ed  $s$  la polare di  $P$  rispetto a  $\Gamma$  e una retta passante per  $P$  rispettivamente.

- Mostrare che  $r$  ha equazione

$$x\bar{p} - 2 + \bar{x}p = 0 \quad (2)$$

dove  $p$  è il numero complesso associato a  $P$ .

- Supponiamo che  $s$  intersechi  $\gamma$  in  $A_1, A_2$ , ed  $r$  in  $Q$ . Mostrare che  $(P, Q; A_1, A_2) = -1$ .

4. [Scrittura del circocentro di un triangolo generico in complessi] Mostrare che il circocentro del triangolo  $z_1 z_2 z_3$  è

$$\frac{z_1 \bar{z}_1 (z_2 - z_3) + z_2 \bar{z}_2 (z_3 - z_1) + z_3 \bar{z}_3 (z_1 - z_2)}{\begin{vmatrix} z_1 & \bar{z}_1 & 1 \\ z_2 & \bar{z}_2 & 1 \\ z_3 & \bar{z}_3 & 1 \end{vmatrix}}. \quad (3)$$

5. [Teorema di Brocard] Sia  $ABCD$  un quadrilatero inscritto in una circonferenza di centro  $O$ . Le rette  $AB$  e  $CD$  si intersecano in  $E$ , le rette  $AD$  e  $BC$  si intersecano in  $F$  e le rette  $AC$  e  $BD$  si intersecano in  $G$ .

Mostrare che  $O$  è ortocentro di  $EFG$ .

6. Sia  $ABC$  un triangolo di ortocentro  $H$ . Da  $A$  si conducano le due tangenti alla circonferenza di diametro  $BC$  che la intersecano in  $P$  e  $Q$ .

Mostrare che  $H \in PQ$ .

7. [Una caratterizzazione del punto di Lemoine] Sia  $ABC$  un triangolo e siano  $D, E$  e  $F$  i punti medi di  $BC, CA$  e  $AB$  rispettivamente. Siano  $X, Y$  e  $Z$  i punti medi delle altezze condotte da  $A, B$  e  $C$  rispettivamente.

Mostrare che  $DX, EY$  e  $FZ$  si intersecano in un punto di coordinate baricentriche  $[a^2 : b^2 : c^2]$ . Chi è tale punto nel triangolo referenziale?

(\*) Mostrare che tale punto (il *punto di Lemoine*) è l'unico punto ad essere baricentro del proprio triangolo pedale.

8. [Coordinate dei vertici del triangolo tangenziale in baricentriche] Dato un triangolo  $ABC$  referenziale in un sistema di coordinate baricentriche, mostrare che la tangente condotta da  $A$  alla circonferenza circoscritta ad  $ABC$  ha equazione

$$c^2 y + b^2 z = 0. \quad (4)$$

Ciclando opportunamente, calcolare le coordinate dei vertici del triangolo tangenziale (*i.e.* il triangolo formato dalle intersezione delle tangenti condotte da  $A, B$  e  $C$  alla circonferenza circoscritta ad  $ABC$ ).

9. Sia dato un triangolo  $ABC$  e un punto  $P$  di coordinate baricentriche  $[u : v : w]$  scegliendo come triangolo referenziale  $ABC$ .

- **[Proiezione di un punto sui lati in baricentriche]** Mostra che, dette  $P_A$ ,  $P_B$  e  $P_C$  le proiezioni di  $P$  sui lati  $BC$ ,  $CA$  e  $AB$ , si ottiene

$$P_A = [0 : S_C u + a^2 v : S_B u + a^2 w]$$

$$P_B = [S_C v + b^2 u : 0 : S_A v + b^2 w]$$

$$P_C = [S_B w + c^2 u : S_A w + c^2 v : 0]$$

dove  $S_A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$  e cicliche.

- **[Punto all'infinito della retta perpendicolare in baricentriche]** Usando il punto precedente mostrare che il punto all'infinito di una retta perpendicolare a  $px + qy + rz = 0$  è

$$[S_B g - S_C h : S_C h - S_A f : S_A f - S_B g] \quad (5)$$

dove  $[f : g : h] = [q - r : r - p : p - q]$  è il punto all'infinito della retta.

10. **[Intersezione delle ceviane per un punto  $P$  con la circonscritta in baricentriche]** Sia  $P = [u : v : w]$ , dove le coordinate baricentriche sono riferite ad  $ABC$ . Dette  $P^A$ ,  $P^B$  e  $P^C$  rispettivamente le intersezioni di  $AP$ ,  $BP$  e  $CP$  con la circonferenza circonscritta, mostrare che

$$P^A = \left[ \frac{-a^2 vw}{c^2 v + b^2 w} : v : w \right]$$

$$P^B = \left[ u : \frac{-b^2 uw}{a^2 w + c^2 u} : w \right]$$

$$P^C = \left[ u : v : \frac{-c^2 uv}{a^2 v + b^2 u} \right].$$

11. Ricordiamo il seguente fatto noto di geometria elementare: un punto  $P$  sta sulla circonferenza circonscritta ad un triangolo  $ABC$  se e solo se le sue proiezioni sui lati  $AB$ ,  $BC$  e  $CA$  sono allineate (su quella che si chiama *retta di Simson*).

Usando questo fatto e l'esercizio 9 mostrare che l'equazione della circonferenza circonscritta al triangolo referenziale è

$$a^2 yz + b^2 xz + c^2 xy = 0. \quad (6)$$

12. Mostrare che l'asse radicale fra la circonferenza circonscritta al triangolo referenziale e

- la circonferenza di Feuerbach è  $S_A x + S_B y + S_C z = 0$ .
- la circonferenza inscritta è  $(p - a)^2 x + (p - b)^2 y + (p - c)^2 z = 0$ , essendo  $p = \frac{a + b + c}{2}$ .

13. **[Distanza fra due punti in baricentriche]** Siano  $P = [u : v : w]$  e  $Q = [u' : v' : w']$  le coordinate baricentriche esatte di due punti rispetto a un triangolo referenziale  $ABC$ .

- Mostrare che

$$PQ^2 = S_A(u - u')^2 + S_B(v - v')^2 + S_C(w - w')^2. \quad (7)$$

- Dato un generico punto  $P = [u : v : w]$ , mostrare che

$$AP^2 = \frac{c^2 v^2 + 2S_A vw + b^2 w^2}{(u + v + w)^2} \quad (8)$$

e dedurre, ciclicamente, le espressioni per  $BP^2$  e  $CP^2$ .



## 4.2 GM - 2, Esercizi

1. Siano  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  due circonferenze di centri  $O_1$  e  $O_2$  rispettivamente. Siano  $S_1$  e  $S_2$  rispettivamente il centro di similitudine interno ed esterno di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ .

Mostrare che  $(O_1, O_2; S_1, S_2) = -1$ .

2. Siano  $A, C, B$  e  $D$  allineati in quest'ordine su una retta. Siano  $M$  e  $N$  i punti medi dei segmenti  $CD$  e  $AB$  rispettivamente.

Mostrare che sono equivalenti le seguenti proprietà:

- $(A, B; C, D) = -1$ ;
- $\frac{2}{AB} = \frac{1}{AC} + \frac{1}{AD}$ ;
- $MA \cdot MB = MC^2$ ;
- $CA \cdot CB = CD \cdot CN$ ;
- $AB^2 + CD^2 = 4MN^2$ .

3. Siano  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  due circonferenze *ortogonali* di centri  $O_1$  e  $O_2$  rispettivamente. Una generica retta passante per  $O_1$  interseca  $\gamma_1$  in  $A$  e  $B$  e interseca  $\gamma_2$  in  $C$  e  $D$ .

Mostrare che  $(A, B; C, D) = -1$ .

4. **[Conservazione del birapporto per inversione]** Assumiamo che  $A, B, C$  e  $D$  siano allineati o conciclici. Siano  $A', B', C'$  e  $D'$  (allineati o conciclici) le immagini dei precedenti punti tramite un'inversione circolare di centro  $O \notin \{A, B, C, D\}$  qualsiasi. Allora

$$(A, B; C, D) = (A', B'; C', D'). \quad (9)$$

Cosa succede se  $O \in \{A, B, C, D\}$ ?

5. Sia  $ABC$  un triangolo e  $M$  un punto sul segmento  $BC$ . Sia  $N$  preso sulla retta di  $BC$  dimodoché  $\angle MAN = 90^\circ$ .

Mostrare che  $(B, C; M, N) = -1$  se e solo se  $AM$  è bisettrice dell'angolo  $\angle BAC$ .

6. Sia  $ABC$  un triangolo scaleno e sia  $D \in AC$  tale che  $BD$  è la bisettrice di  $\angle ABC$ . Siano  $E$  ed  $F$  i piedi delle perpendicolari tracciate rispettivamente da  $A$  e da  $C$  sulla retta  $BD$  e sia  $M \in BC$  tale che  $DM \perp BC$ .

Mostrare che  $\angle EMD = \angle DMF$ .

7. **[Teorema della farfalla]** Sia  $MN$  una corda di una circonferenza  $\gamma$  e sia  $P$  il suo punto medio. Siano  $AB$  e  $CD$  due corde qualsiasi di  $\gamma$  che si intersecano in  $P$  dimodoché  $A$  e  $C$  siano nello stesso semipiano generato dalla retta su cui giace  $MN$ .

Mostrare che  $AD$  e  $BC$  intersecano la corda  $MN$  in due punti equidistanti da  $P$ .

8. Sia  $ABCD$  un quadrilatero circoscritto a una circonferenza e siano  $M, N, P$  e  $Q$  i punti di tangenza di  $AB, BC, CD$  e  $DA$  con la circonferenza rispettivamente.

Mostrare che  $AC, BD, MP$  e  $NQ$  sono concorrenti.

9. *[Copiato in GB]* **[Lemma della simmediana]** Sia  $ABC$  un triangolo inscritto in una circonferenza  $\gamma$ . Le tangenti a  $\gamma$  in  $B$  e  $C$  si intersecano in  $P$ .

Mostrare che  $AP$  è *simmediana* relativa a  $BC$ , i.e. simmetrica della mediana relativa a  $BC$  rispetto alla bisettrice dell'angolo  $\angle BAC$ .

10. Sia  $ABCD$  un quadrilatero ciclico. Le rette  $AB$  e  $CD$  si intersecano in un punto  $E$  e le diagonali  $AC$  e  $BD$  si intersecano in un punto  $F$ . Sia  $H$  l'intersezione delle circonferenze circoscritte ai triangoli  $AFD$  e  $BFC$ .

Mostrare che  $\angle EHF = 90^\circ$ .

11. Sia  $ABCD$  un quadrilatero armonico inscritto in una circonferenza  $\gamma$  di centro  $O$  con diagonali  $AB$  e  $CD$ . Sia  $M$  il punto medio di  $AB$ .

Mostrare  $MA$  è la bisettrice dell'angolo  $\angle CMD$ .

12. Usando gli argomenti della lezione **G2 - Medium** mostrare il **Teorema di Brocard** contenuto nella raccolta degli esercizi relativi alla lezione **G1 - Medium**.

13. Sia  $\omega$  la circonferenza inscritta in un triangolo  $ABC$  e sia  $I$  il suo centro.  $\omega$  interseca  $BC$ ,  $CA$  e  $AB$  rispettivamente in  $D$ ,  $E$  e  $F$ .  $BI$  interseca  $EF$  in  $K$ .  
Mostrare che  $BK \perp CK$ .
14. Sia  $ABC$  un triangolo la cui circonferenza inscritta, di centro  $I$ , tange  $BC$ ,  $CA$  e  $AB$  in  $D$ ,  $E$  e  $F$  rispettivamente. Siano  $N$  l'intersezione di  $ID$  con  $EF$  e  $M$  il punto medio di  $BC$ .  
Mostrare che  $A$ ,  $N$  e  $M$  sono allineati.

### 4.3 GM - 3, Esercizi

1. Sia  $ABCD$  un quadrilatero ciclico di circocentro  $O$ . Le rette  $AB$  e  $CD$  si intersecano in  $E$ , le rette  $AD$  e  $BC$  si intersecano in  $F$  e le rette  $AC$  e  $BD$  si intersecano in  $P$ . Sia  $K$  l'intersezione di  $EP$  e  $AD$  e  $M$  la proiezione di  $O$  su  $AD$ .

Mostrare che  $BCMK$  è ciclico.

2. **[Fatti su triangolo con mistilinea]** Sia  $ABC$  un triangolo iscritto in una circonferenza  $\Gamma$  e sia  $\gamma$  la circonferenza tangente ai segmenti  $AB$ ,  $AC$  e a  $\Gamma$  rispettivamente in  $E$ ,  $F$  e  $T$ . Sia  $I$  l'incentro di  $ABC$ . Sia  $M$  il punto medio dell'arco  $BC$  che non contiene  $A$ . Sia  $V$  l'intersezione di  $AT$  con  $EF$ .

Mostrare che:

- $I \in EF$  e  $IE = IF$ ;
- $MT$ ,  $EF$  e  $BC$  sono concorrenti;
- $\angle BVE = \angle CVF$ .

3. **[Teorema di Sawyama-Thébault]** Sia  $ABC$  un triangolo di incentro  $I$  e sia  $D$  un punto sul lato  $BC$ . Sia  $P$  (rispettivamente  $Q$ ) il centro della circonferenza che tange i segmenti  $AD$  e  $DC$  (rispettivamente  $DB$ ) e la circonferenza circoscritta ad  $ABC$ .

Mostrare che  $P$ ,  $Q$  e  $I$  sono allineati.

4. **[NUSAMO 2015/2016 - 5]** Sia  $ABC$  un triangolo,  $I_A$  l'excentro opposto ad  $A$  e  $I$  il suo incentro. Sia  $M$  il circocentro del triangolo  $BIC$  e sia  $G$  la proiezione di  $I_A$  su  $BC$ . Sia, infine,  $P$  l'intersezione fra la circonferenza circoscritta di  $ABC$  e la circonferenza di diametro  $AI_A$ .

Mostrare che  $M$ ,  $G$  e  $P$  sono allineati.

5. **[Copiato in GB]** Siano  $A$ ,  $B$  e  $C$  tre punti allineati e supponiamo che  $P$  sia un punto qualsiasi del piano distinto dai precedenti 3.

Mostrare che i circocentri dei triangoli  $PAB$ ,  $PAC$ ,  $PBC$  e  $P$  sono conciclici.

6. **[Copiato in GB]** Sia  $ABC$  un triangolo con ortocentro  $H$  e siano  $D$ ,  $E$  e  $F$  i piedi delle altezze che cadono sui lati  $BC$ ,  $CA$  e  $AB$  rispettivamente. Sia  $T = EF \cap BC$ .

Mostrare che  $TH$  è perpendicolare alla mediana condotta da  $A$ .

7. **[Teorema di Feuerbach]** **[Copiato in GB]** Mostrare che la circonferenza di Feuerbach è tangente alla circonferenza inscritta e alle circonferenze exinscritte.

*Suggerimento:* Sia  $M$  il punto medio di  $BC$  e  $D$  e  $G$  rispettivamente i punti in cui la circonferenza inscritta e quella ex-inscritta opposta ad  $A$  incontrano  $BC$ . Invertire in  $M$  con raggio  $MD$ .

8. La circonferenza inscritta nel triangolo  $ABC$  è tangente a  $BC$ ,  $CA$  e  $AB$  in  $M$ ,  $N$  e  $P$  rispettivamente.

Mostrare che il circocentro e l'incentro di  $ABC$  sono allineati con l'ortocentro di  $MNP$ .

## 5 Problemi Basic

### 5.1 GB - 1, Problemi

### 5.2 GB - 2, Problemi

### 5.3 GB - 3, Problemi

1. **Polish MO 2018 - 5** Sia  $ABC$  un triangolo acutangolo con  $AB \neq AC$  e siano  $E, F$  i piedi delle altezze su  $AC$  e  $AB$ . La tangente in  $A$  alla circoscritta interseca  $BC$  in  $P$ . La retta parallela a  $BC$  passante per  $A$  interseca  $EF$  in  $Q$ .

Dimostrare che  $PQ$  è perpendicolare alla mediana passante per  $A$  del triangolo  $ABC$

## 6 Problemi Medium

### 6.1 GM - 1, Problemi

1. **[BMO 2009 - 2]** Sia  $MN$  un segmento parallelo al lato  $BC$  del triangolo  $ABC$ , con  $M$  sul lato  $AB$  e  $N$  sul lato  $AC$ . Le rette  $BN$  e  $CM$  si incontrano in  $P$ . Le circonferenze circoscritte a  $BMP$  e  $CNP$  si incontrano in due punti distinti  $P$  e  $Q$ .

Mostrare che  $\angle BAQ = \angle CAP$ .

2. **[RMM 2012 - 2]** Sia  $ABC$  un triangolo non isoscele e siano  $D$ ,  $E$  e  $F$  rispettivamente i punti medi dei lati  $BC$ ,  $CA$  e  $AB$ . La circonferenza  $BCF$  e la retta  $BE$  si intersecano nuovamente in  $P$  e la circonferenza  $ABE$  e la retta  $AD$  in  $Q$ . Le rette  $DP$  e  $FQ$  si incontrano in  $R$ .

Mostrare che il baricentro  $G$  del triangolo  $ABC$  giace sulla circonferenza circoscritta al triangolo  $PQR$ .

3. **[USAMO 2016 - Day 2 - 2]** Un pentagono equilatero  $AMNPQ$  è inscritto in un triangolo  $ABC$  in modo che  $M \in AB$ ,  $Q \in AC$  e  $N, P \in BC$ . Sia  $S$  l'intersezione di  $MN$  e  $PQ$  e denotiamo con  $l$  la bisettrice di  $\angle MSQ$ .

Mostrare che, detto  $I$  l'incentro di  $ABC$ ,  $OI$  è parallelo a  $l$ .

4. **[IMO 2008 - 6]** Sia  $ABCD$  un quadrilatero convesso con  $BA \neq BC$ . Siano  $\omega_1$  e  $\omega_2$  le circonferenze inscritte ai triangoli  $ABC$  e  $ADC$  rispettivamente. Supponiamo che esista una circonferenza  $\omega$  tangente alla retta  $BA$  oltre  $A$ , alla retta  $BC$  oltre  $C$ , alla retta  $AD$  e alla retta  $CD$ .

Mostrare che le tangenti esterne comuni a  $\omega_1$  e  $\omega_2$  si intersecano su  $\omega$ .

5. **[BMO 2015 - 2]** Sia  $ABC$  un triangolo scaleno con incentro  $I$  e circonferenza circoscritta  $\omega$ .  $AI$ ,  $BI$  e  $CI$  intersecano  $\omega$  di nuovo nei punti  $D$ ,  $E$  e  $F$  rispettivamente. Le rette parallele a  $BC$ ,  $CA$  e  $AB$  condotte da  $I$  intersecano  $EF$ ,  $DF$  e  $DE$  rispettivamente nei punti  $K$ ,  $L$  e  $M$ .

Mostrare che  $K$ ,  $L$  e  $M$  sono allineati.

6. **[IMO 2012 - 1]** Dato un triangolo  $ABC$ , sia  $J$  il centro della circonferenza ex-inscritta opposta al vertice  $A$ , la quale tange  $BC$  in  $M$  e le rette  $AB$  e  $AC$  in  $K$  e  $L$  rispettivamente. Le rette  $LM$  e  $BJ$  si intersecano in  $F$  e le rette  $KM$  e  $CJ$  si intersecano in  $G$ . Sia  $S$  il punto d'intersezione fra  $AF$  e  $BC$  e sia  $T$  il punto d'intersezione fra  $AG$  e  $BC$ .

Mostrare che  $M$  è il punto medio di  $ST$ .

7. **[IMO SL 2011 - 4]** Sia  $ABC$  un triangolo acutangolo scaleno, e sia  $\gamma$  la sua circonferenza circoscritta. Siano  $A_0$  il punto medio di  $BC$ ,  $B_0$  il punto medio di  $AC$  e  $C_0$  il punto medio di  $AB$ . Sia  $D$  il piede dell'altezza uscente da  $A$ ,  $D_0$  la proiezione di  $A_0$  sulla retta  $B_0C_0$  e  $G$  il baricentro di  $ABC$ . Sia  $\gamma_1$  la circonferenza passante per  $B_0$  e  $C_0$ , e tangente a  $\gamma$  in un punto  $P$  diverso da  $A$ .

- Dimostrare che la retta  $B_0C_0$  e le tangenti a  $\gamma$  nei punti  $A$  e  $P$  sono concorrenti.
- Dimostrare che i punti  $D_0$ ,  $G$ ,  $D$ , e  $P$  sono allineati.

8. **[USA TST 2012 - December Test - 1]** In un triangolo acutangolo  $ABC$  si ha  $\angle A < \angle B$  e  $\angle A < \angle C$ . Sia  $P$  un punto variabile su  $BC$ . I punti  $D$  e  $E$  giacciono su  $AB$  e  $AC$  rispettivamente in modo che  $BP = PD$  e  $CP = PE$ .

Mostrare che al variare di  $P$  sul segmento  $BC$ , la circonferenza circoscritta al triangolo  $ADE$  passa per un punto fisso oltre  $A$ .

## 6.2 GM - 2, Problemi

1. [China NMO 2017 - 2] Siano  $\omega$  e  $\Omega$  di centro  $I$  e  $O$  rispettivamente la circonferenza inscritta e circoscritta a un triangolo acutangolo  $ABC$ . La circonferenza  $\omega$  interseca  $BC$  in  $D$  e le tangenti a  $\Omega$  passanti per  $B$  e  $C$  si intersecano in  $L$ . Siano  $AH$  l'altezza condotta da  $A$  a  $BC$  e  $X$  l'intersezione di  $AO$  con  $BC$ . Siano  $P$  e  $Q$  le intersezioni di  $OI$  con  $\Omega$ .

Mostrare che  $PQXH$  è ciclico se e solo se  $A, D$  e  $L$  sono allineati.

2. [IMO 2014 - 4] Siano  $P$  e  $Q$  punti su un segmento  $BC$  di un triangolo acutangolo  $ABC$  tali che  $\angle PAB = \angle BCA$  e  $\angle CAQ = \angle ABC$ . Siano  $M$  e  $N$  punti su  $AP$  e  $AQ$  rispettivamente tali che  $P$  è punto medio di  $AM$  e  $Q$  è punto medio di  $AN$ .

Mostrare che l'intersezione di  $BM$  e  $CN$  giace sulla circonferenza circoscritta di  $ABC$ .

3. [Iran TST 2007 - Day 2 - 3] Sia  $\omega$  la circonferenza inscritta ad un triangolo  $ABC$  che tange  $AB$  e  $AC$  rispettivamente in  $F$  e  $E$ . Siano  $P$  e  $Q$  su  $AB$  e  $AC$  rispettivamente in modo che  $PQ$  sia parallelo a  $BC$  e tangente ad  $\omega$ . Siano  $T$  l'intersezione di  $EF$  con  $BC$  e  $M$  il punto medio di  $PQ$ .

Mostrare che  $TM$  tange  $\omega$ .

4. [Iran TST 2009 - Day 2 - 3] In un triangolo  $ABC$  è inscritta una circonferenza  $\omega$  di centro  $I$  che interseca i lati  $BC, CA$  e  $AB$  rispettivamente in  $D, E$  e  $F$ . Sia  $M$  il piede della perpendicolare da  $D$  a  $EF$ . Sia  $P$  il punto medio di  $DM$  e  $H$  l'ortocentro del triangolo  $BIC$ .

Mostrare che  $PH$  biseca  $EF$ .

5. [Romania TST 2007 - Day 7 - 2] La circonferenza inscritta al triangolo  $ABC$  è tangente ad  $AB$  e  $AC$  in  $F$  ed  $E$  rispettivamente. Sia  $M$  il punto di  $BC$  e  $N$  l'intersezione di  $AM$  con  $EF$ . La circonferenza di diametro  $BC$  interseca  $BI$  e  $CI$  in  $X$  e  $Y$  rispettivamente.

Mostrare che  $\frac{NX}{NY} = \frac{AC}{AB}$ .

6. [IMO SL 2007 - G8] Sul lato  $AB$  di un quadrilatero convesso  $ABCD$  è preso un punto  $P$ . Sia  $\omega$  la circonferenza inscritta al triangolo  $CPD$  e sia  $I$  il suo centro. Supponiamo che  $\omega$  sia tangente alle circonferenze inscritte ai triangoli  $APD$  e  $BPC$  in  $K$  e  $L$  rispettivamente. Siano  $E$  l'intersezione delle rette  $AC$  e  $BD$  e  $F$  l'intersezione delle rette  $AK$  e  $BL$ .

Mostrare che  $E, I$  e  $F$  sono allineati.

### 6.3 GM - 3, Problemi

1. [USA TST 2007 - 5] Il triangolo  $ABC$  è inscritto in una circonferenza  $\Gamma$ . Le tangenti a  $\Gamma$  condotte da  $B$  e  $C$  si intersecano in  $T$ . Il punto  $S$  è sulla retta  $BC$  dimodoché  $AS \perp AT$ . Siano  $B_1$  e  $C_1$  sulla retta  $ST$  dimodoché  $B_1T = BT = C_1T$ .

Mostrare che  $ABC$  e  $AB_1C_1$  sono simili.

2. [IMO 2005 - 5] Sia  $ABCD$  un quadrialtero convesso con  $BC = DA$  e  $BC$  non parallelo a  $DA$ . Siano  $E$  e  $F$  su  $BC$  e  $DA$  rispettivamente tali che  $BE = DF$ . Siano  $P$  l'intersezione di  $AC$  e  $BD$ ,  $Q$  l'intersezione di  $BD$  e  $EF$  e  $R$  l'intersezione di  $EF$  e  $AC$ .

Mostra che, al variare di  $E$  e  $F$ , la circonferenza circoscritta al triangolo  $PQR$  passa per un punto fisso (oltre  $P$ ).

3. [?] Sia  $ABC$  un triangolo e siano  $D$  e  $E$  i piedi delle altezze relative ad  $A$  e  $B$ , rispettivamente, le quali si intersecano in  $H$ . Sia  $M$  il punto medio di  $AB$  e supponiamo che le circonferenze circoscritte a  $ABH$  e  $DEM$  si intersechino nei punti  $P$  e  $Q$  (con  $P$  e  $A$  sullo stesso lato di  $CH$ ).

Mostrare che le rette  $PH$  e  $MQ$  si incontrano sulla circonferenza circoscritta ad  $ABC$ .

4. [IMO SL 2006 - 9] Sui lati  $BC$ ,  $CA$  e  $AB$  di un triangolo  $ABC$  si scelgano tre punti  $A_1$ ,  $B_1$  e  $C_1$  rispettivamente. Le circonferenze circoscritte a  $AB_1C_1$ ,  $BC_1A_1$  e  $CA_1B_1$  intersecano la circonferenza circoscritta ad  $ABC$  in  $A_2$ ,  $B_2$  e  $C_3$  rispettivamente. Siano, inoltre,  $A_3$ ,  $B_3$  e  $C_3$  rispettivamente i simmetrici di  $A_1$ ,  $B_1$  e  $C_1$  rispetto ai punti medi dei lati del triangolo su cui giacciono.

Mostrare che i triangoli  $A_2B_2C_2$  e  $A_3B_3C_3$  sono simili.

5. [EGMO 2013 - 5] Sia  $\Omega$  la circonferenza circoscritta ad un triangolo  $ABC$ . La circonferenza  $\omega$  è tangente ai lati  $AC$  e  $BC$  e internamente alla circonferenza  $\Omega$  in un punto  $P$ . Una retta parallela ad  $AB$  che interseca l'interno del triangolo  $ABC$  è tangente a  $\omega$  in  $Q$ .

Mostrare che  $\angle ACP = \angle QCB$ .

6. [IMO SL 2003 - 4] Siano  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$ ,  $\Gamma_3$ ,  $\Gamma_4$  circonferenze distinte tali che  $\Gamma_1$  e  $\Gamma_3$  (così come  $\Gamma_2$  e  $\Gamma_4$ ) siano tangenti esternamente in  $P$ . Supponiamo che  $\Gamma_1$  e  $\Gamma_2$ ,  $\Gamma_2$  e  $\Gamma_3$ ,  $\Gamma_3$  e  $\Gamma_4$ ,  $\Gamma_4$  e  $\Gamma_1$  si intersechino in  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$  rispettivamente e che nessuno di questi punti sia  $P$ .

Mostrare che

$$\frac{AB \cdot BC}{AD \cdot DC} = \frac{PB^2}{PD^2}.$$

7. [IMO 2015 - 3] Sia  $ABC$  un triangolo acutangolo con  $AB > AC$ . Sia  $\Gamma$  la sua circonferenza circoscritta,  $H$  il suo ortocentro, e  $F$  il piede dell'altezza condotta da  $A$ . Sia  $M$  il punto medio di  $BC$ . Sia  $Q$  il punto su  $\Gamma$  tale che  $\angle HQA = 90^\circ$  e sia  $K$  il punto su  $\Gamma$  tale che  $\angle HKQ = 90^\circ$ . Assumiamo che  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $K$  e  $Q$  sono tutti distinti e giacciono su  $\Gamma$  in quest'ordine.

Mostrare che le circonferenze circoscritte ai triangoli  $KQH$  e  $FKM$  sono fra loro tangenti.

## Riferimenti bibliografici

- [1] Gunmay Anda, *Inversion on the fly*, <http://services.artofproblemsolving.com/download.php?id=YXR0YWNobWVudHMvNy85LzRiMmFiYzklNTgxNjQyZGNhNjEzZDkxOGQ0OTFmN2UyYWFlMDc3LnBkZg==&rn=SW52ZXJzaW9uLnBkZg==>
- [2] Dušan Djukić, *Inversion*, [http://memo.szolda.hu/feladatok/inversion\\_ddj.pdf](http://memo.szolda.hu/feladatok/inversion_ddj.pdf)
- [3] Paul Yiu, *Introduction to the geometry of the triangle*, <http://math.fau.edu/yiu/YIUIntroductionToTriangleGeometry121226.pdf>
- [4] Marko Radovanović, *Complex numbers in geometry*, <http://3A%2F%2Fservices.artofproblemsolving.com%2Fdownload.php%3Fid%3DYXR0YWNobWVudHMvOS9iLzZhNGM2M2Y0NzZiNGY3MWE3ZTI0ZTRiY2Y4OGIwMzhiN2IyNzFhLnBkZg%3D%3D%26rn%3DbWFya28tcmFkb3Zhbm92aWMtY29tcGxleC1udW1iZXJzLWluLWdlb21ldHJ5LnBkZg%3D%3D&usg=AFQjCNFBeoyb2eMJWQnC3Q7qMMS3okG1Kw>
- [5] Milivoje Lukić, *Projective geometry*, [http://memo.szolda.hu/feladatok/projg\\_ml.pdf](http://memo.szolda.hu/feladatok/projg_ml.pdf)
- [6] Ercole Suppa, *Divisione armonica*, [http://www.dma.unifi.it/~mugelli/Incontri\\_Olimpici\\_2010/19-Geometria-Testi/02-Ercole\\_Suppa-Divisione\\_Armonica.pdf](http://www.dma.unifi.it/~mugelli/Incontri_Olimpici_2010/19-Geometria-Testi/02-Ercole_Suppa-Divisione_Armonica.pdf)
- [7] Yufei Zaho, *Cyclic quadrilaterals – the big picture*, [http://yufeizhao.com/olympiad/cyclic\\_quad.pdf](http://yufeizhao.com/olympiad/cyclic_quad.pdf)
- [8] Yufei Zaho, *Circles*, <http://yufeizhao.com/olympiad/imo2008/zhao-circles.pdf>
- [9] *Mathlinks*, <https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php?title=MathLinks>