
(a) Subdiffusion Order α ($\alpha^\dagger = 0.70$)
Estimated α
0.74
0.72
0.70
0.68
0.66
0.64
Ground truth $\theta_j^\dagger = 0.7$
$\eta = 0\%$ $(n = 3)$
Selected ($\min J_{\text{total}}$)
$\eta = 5\%$ $(n = 5)$
$\eta = 10\%$ $(n = 5)$
Mean ± SD
(b) Viscoelastic Order β ($\beta^\dagger = 0.45$)
Estimated β
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
(c) Apparent Diffusivity D ($D^\dagger = 0.08$)
Estimated D
0.0875
0.0850
0.0825
0.0800
0.0775
0.0750
0.0725
0.0700
$\eta = 0\%$ $(n = 3)$
$\eta = 5\%$ $(n = 5)$
$\eta = 10\%$ $(n = 5)$
(d) Effective Young's Modulus E ($E^\dagger = 2.50$)
Estimated E
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
$\eta = 0\%$ $(n = 3)$
$\eta = 5\%$ $(n = 5)$
$\eta = 10\%$ $(n = 5)$