

# 高数基础班 (18)

18

多元函数的极值（无约束极值；条件极值）；最大最小值

P137-P141



还不关注，  
你就慢了



**主讲 武忠祥 教授**

中国大学MOOC

×

有道考神

# 第三节 多元函数的极值与最值

## 本节内容要点

### 一. 考试内容概要

(一) 无约束极值

(二) 条件极值与拉格朗日乘数法

(三) 最大最小值

## 二. 常考题型方法与技巧

**题型一 求极值 (无条件)**

**题型二 求最大最小值**

**题型三 最大最小值应用题**


# 考试内容概要

## (一) 无约束极值


定义7 若在点  $(x_0, y_0)$  的某邻域内恒成立不等式

$$\underline{f(x, y) \leq f(x_0, y_0)} \quad (\underline{f(x, y) \geq f(x_0, y_0)})$$

则称  $f$  在点  $(x_0, y_0)$  取得极大值 (极小值)，点  $(x_0, y_0)$  称为  $f$  的极大值点 (极小值点)，极大值与极小值统称为极值，极大值点与极小值点统称为极值点.



$(x_0, y_0)$



**定理5 (极值的必要条件)** 设  $z = f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  <sup>①</sup> 存在偏导数, 且  $(x_0, y_0)$  为  $f(x, y)$  的极值点, 则

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0.$$

(0,0) ✓  
驻点  $\xrightarrow{x, y}$  极值.  
|x|+|y|

**定理6 (极值的充分条件)** 设  $z = f(x, y)$  在点  $P_0(x_0, y_0)$

的某邻域内有二阶连续偏导数, 又  $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$   $f(x, y)$  可导

记  $A = f''_{xx}(x_0, y_0)$ ,  $B = f''_{xy}(x_0, y_0)$ ,  $C = f''_{yy}(x_0, y_0)$ , 则

(1) 当  $AC - B^2 > 0$  时, 有极值  $\begin{cases} A > 0 & \text{极小值;} \\ A < 0 & \text{极大值.} \end{cases}$

(2) 当  $AC - B^2 < 0$  时, 无极值.

(3) 当  $AC - B^2 = 0$  时, 不一定 (一般用定义判定).

可能极值点  $\left\{ \begin{array}{l} \text{驻点. } (*) \\ \text{① } f_x \text{ 与 } f_y \text{ 都不存在 } \checkmark \\ \text{② } f_x \text{ 存在, } f_y = 0 \\ \text{③ } f_x = 0, f_y \text{ 存在} \end{array} \right.$

## (二) 条件极值与拉格朗日乘数法

$$z = f(x, y)$$


1) 函数  $f(x, y)$  在条件  $\varphi(x, y) = 0$  条件下的极值.

令  $\underline{F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)}$


$$\begin{cases} F_x = f'_x(x, y) + \lambda \varphi'_x(x, y) = 0, \\ F_y = f'_y(x, y) + \lambda \varphi'_y(x, y) = 0, \\ F_\lambda = \varphi(x, y) = 0, \end{cases}$$

2) 函数  $f(x, y, z)$  在条件  $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$  条件下的条件极值.

令  $F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \underline{\lambda \varphi(x, y, z)} + \underline{\mu \psi(x, y, z)}$




### (三) 最大最小值



#### 1. 求连续函数 $f(x, y)$ 在有界闭域 $D$ 上的最大最小值

- 1) 求  $f(x, y)$  在  $D$  内部可能的极值点.
- 2) 求  $f(x, y)$  在  $D$  的边界上的最大最小值. \*
- 3) 比较



#### 2. 应用题

1)  $z = f(x, y)$  ✓

# 常考题型与典型例题

## 常考题型

1. 求极值
2. 求连续函数  $f(x, y)$  在有界闭区域  $D$  上的最大最小值;
3. 最大最小值应用题.



【例1】(2003年, 3) 设可微函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  取得极

小值则下列结论正确的是


(A)  $f(x_0, y)$  在  $y = y_0$  处的导数大于零.

✓ (B)  $f(x_0, y)$  在  $y = y_0$  处的导数等于零.

(C)  $f(x_0, y)$  在  $y = y_0$  处的导数小于零.

(D)  $f(x_0, y)$  在  $y = y_0$  处的导数不存在.

【解】



$$f(x_0, y) = \varphi(y)$$

$$f_y(x_0, y_0) = \varphi'(y_0)$$

✓ [解1]  $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$

$$\varphi'(y_0) = 0,$$

[解2]  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  取极小值.

$\varphi(y) = f(x_0, y)$  在  $y_0$  取极小值

$$\varphi'(y_0) = 0$$

【例2】(2009年, 2) 设函数  $z = f(x, y)$  的全微分为

$dz = \overset{z_x}{x}dx + \overset{z_y}{y}dy$ , 则点  $(0,0)$

$z_x = x, \quad z_y = y$

✗ (A) 不是  $f(x, y)$  的连续点.

①  $z_x(0,0) = z_y(0,0) = 0$

$(0,0)$

(B) 不是  $f(x, y)$  的极值点.

(C) 是  $f(x, y)$  的极大值点. ②  $A = z_{xx} = 1, \quad C = z_{yy} = 1, \quad B = z_{xy} = 0$

✓ (D) 是  $f(x, y)$  的极小值点.

$AC - B^2 = 1 > 0$  有极值.

$A = 1 > 0$ , 极小值.

【解1】

【例2】(2009年, 2) 设函数  $z = f(x, y)$  的全微分为

$dz = xdx + ydy$ , 则点  $(0, 0)$

- ✗ (A) 不是  $f(x, y)$  的连续点.  
(B) 不是  $f(x, y)$  的极值点.  
(C) 是  $f(x, y)$  的极大值点.  
✓ (D) 是  $f(x, y)$  的极小值点.

【解2】  $z = z(x, y)$

$z_x = x, z_y = y$

① 偏积分, ✓

直接法

$$z_x = x \quad z = \int x dx = \frac{1}{2}x^2 + \varphi(y)$$

$$z_y = y \quad + \quad z_y = \varphi'(y) = y, \quad \varphi(y) = \frac{1}{2}y^2 + C$$

$$\boxed{z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + C} \quad \text{极小值.}$$

② 凑微分, ✓

$$\begin{aligned} d\underline{z} &= \underline{x}dx + ydy = d(\underline{\frac{1}{2}x^2}) + d(\underline{\frac{1}{2}y^2}) \\ &= d(\underline{\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2}) \end{aligned}$$

$$z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + C$$

【例2】(2009年, 2) 设函数  $z = f(x, y)$  的全微分为

✓  
 $dz = xdx + ydy$ , 则点  $(0, 0)$

✗ (A) 不是  $f(x, y)$  的连续点.

✗ (B) 不是  $f(x, y)$  的极值点.

✗ (C) 是  $f(x, y)$  的极大值点.

✓ (D) 是  $f(x, y)$  的极小值点.

【解3】排除法

$$z = \underline{\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

【例3】(2017年3) 二元函数  $z = xy(3 - x - y)$  的极值点是 ( )

- (A) (0,0), (B) (0,3), (C) (3,0), (D) (1,1).

【解】由  $\begin{cases} z_x = y(3 - 2x - y) = 0 \\ z_y = x(3 - 2y - x) = 0 \end{cases}$  得驻点 (0,0), (0,3), (3,0), (1,1).

$$z_{xx} = -2y, z_{yy} = -2x, z_{xy} = 3 - 2x - 2y.$$

在 (0,0) 点  $AC - B^2 = -9 < 0$ , 无极值;

在 (0,3) 点  $AC - B^2 = -9 < 0$ , 无极值;

在 (3,0) 点  $AC - B^2 = -9 < 0$ , 无极值;

在 (1,1) 点  $AC - B^2 = 3 > 0$ , 有极值;

【例4】(2009年, 1, 3) 求二元函数  $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$

的极值.

$$x=0$$

$$y=\frac{1}{e}$$

【解】①  $f'_x(x, y) = 2x(2 + y^2)$ ,  $f'_y(x, y) = 2x^2y + \ln y + 1$ .

令  $\begin{cases} f'_x(x, y) = 0, \\ f'_y(x, y) = 0, \end{cases}$  解得唯一驻点  $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ . 由于

②  $A = f''_{xx}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 2(2 + y^2)\Big|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)} = 2\left(2 + \frac{1}{e^2}\right)$ ,

$$B = f''_{xy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 4xy\Big|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)} = 0,$$

$$C = f''_{yy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = \left(2x^2 + \frac{1}{y}\right)\Big|_{\left(0, \frac{1}{e}\right)} = e,$$

所以  $AC - B^2 = 2e\left(2 + \frac{1}{e^2}\right) > 0$   $A > 0$ . 极小值为  $f\left(0, \frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$ .

“先代后求”

【例5】(2008年2) 求函数  $u = x^2 + y^2 + z^2$  在约束条件  $z = x^2 + y^2 \geq 0$

和  $x + y + z = 4$  下的最大值和最小值.

求极值.

【解】

①  $F(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 4).$

令 
$$\begin{cases} F'_x = 2x + 2\lambda x + \mu = 0, \\ F'_y = 2y + 2\lambda y + \mu = 0, \\ F'_z = 2z - \lambda + \mu = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 - z = 0, \\ F'_\mu = x + y + z - 4 = 0, \end{cases}$$

$x(t\lambda) = y(t\lambda), \quad (x-y)(t\lambda) = 0$

① 若  $\lambda = -1 \Rightarrow u = 0 \Rightarrow z = -\frac{1}{2}, \quad \times$

② 若  $x = y, \quad z = 2x^2$

$2x^2 + 2x - 4 = 0$

解方程组, 得  $(x_1, y_1, z_1) = (1, 1, 2), (x_2, y_2, z_2) = (-2, -2, 8).$

$x^2 + x - 2 = 0$

$(x+2)(x-1) = 0$

$x_1 = 1, \quad x_2 = -2$

② 故所求的最大值为 72, 最小值为 6.

中国大学MOOC

有道考神

【例6】(2005年2) 已知  $z = f(x, y)$  的全微分  $dz = 2x dx - 2y dy$

且  $f(1, 1) = 2$ . 求  $f(x, y)$  在  $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$  上的最大最小值.

【解1】① 由  $dz = 2x dx - 2y dy = d(x^2 - y^2) = d(x^2 - y^2)$

可知  $z = f(x, y) = x^2 - y^2 + C$ .

再由  $f(1, 1) = 2$ , 得  $C = 2$ , 故  $z = f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$ .

令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = -2y = 0$ , 解得驻点  $(0, 0)$


② 在椭圆  $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$  上,  $z = x^2 - (4 - 4x^2) + 2$

即  $z = 5x^2 - 2 \quad (-1 \leq x \leq 1)$ ,

其最大值为  $z|_{x=\pm 1} = 3$ , 最小值为  $z|_{x=0} = -2$ . 再与  $f(0, 0) = 2$

比较, 可知  $f(x, y)$  在椭圆域  $D$  上的最大值为3, 最小值为 -2 .

$$\begin{aligned} 2x &= 0 \\ -2y &= 0 \end{aligned} \quad (0, 0)$$



$$y^2 = 4 - 4x^2$$

$$-1 \leq x \leq 1$$

化条件为无  
条件

中国大学MOOC

有道考神



【解2】 同解法一，得驻点 (0,0)

✓ 设  $L = x^2 - y^2 + 2 + \lambda \left( x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 \right)$  挖格.

令 
$$\begin{cases} L'_x = 2x + 2\lambda x = 0, \\ L'_y = -2y + \frac{\lambda}{2}y = 0, \\ L'_\lambda = x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0, \end{cases}$$

$x(1+\lambda) = 0$

①  $x=0, y=\pm 2$  X

②  $\lambda = -1 \Rightarrow y=0, x=\pm 1$

$y\left(\frac{\lambda}{2} - 2\right) = 0$

解得4个可能的极值点 (0,2), (0,-2), (1,0) 和 (-1,0)

①  $y=0 \Rightarrow x=\pm 1$  X

②  $\frac{\lambda}{2} - 2 = 0 \Rightarrow x=0$   
 $y=\pm 2$

又  $f(0,2) = -2, f(0,-2) = -2, f(1,0) = 3, f(-1,0) = 3$ ，再与  $f(0,0) = 2$  比较，得  $f(x,y)$  在  $D$  上的最大值为3，最小值为

-2. ✓

【解3】 同解法一，得驻点 (0,0)

椭圆  $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$  的参数方程为  $x = \cos t, y = 2 \sin t$ .


则  $z = f(x, y) = x^2 - y^2 + 2 = \cos^2 t - 4 \sin^2 t + 2$

$$= 3 - 5 \sin^2 t$$

故  $f_{\max} = 3, f_{\min} = -2$

化条件与元条件.

(参数式)



(0,0)

# 高数基础班 (18)

主讲 武忠祥 教授



还不关注，  
你就慢了



中国大学MOOC

×

有道考神