

Matrizes inversas

Professor Vitor Luiz de Almeida

Um processo prático para inverter matrizes

Objetivo Geral: Desenvolver um algoritmo prático para inverter matrizes.

Objetivos específicos:

- 1 Perceber que a forma escalonada reduzida por linhas de uma matriz invertível é a matriz identidade;
- 2 Verificar que toda matriz invertível pode ser expressa como um produto de matrizes elementares;
- 3 Aplicar a invertibilidade de matrizes na resolução de problemas;

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_k^{-1}$$

Teorema: As seguintes afirmações são equivalentes:

- (1) A é invertível;
- (2) O sistema linear homogêneo $AX = 0$ admite somente a solução trivial;
- (3) A forma escalonada reduzida por linhas de A é $I_{n \times n}$;
- (4) A pode ser escrita como produto de matrizes elementares.

Demonstração:

$$(1) \Rightarrow (2)$$

$$A \cdot X = 0 \Leftrightarrow A^{-1} \cdot (A \cdot X) = A^{-1} \cdot 0$$

$$\Leftrightarrow (A^{-1} \cdot A) \cdot X = 0 \Leftrightarrow I \cdot X = 0$$

$$(2) \Rightarrow (3) \quad \left\{ \begin{array}{rcl} x_1 & = & 0 \\ x_2 & = & 0 \\ & \vdots & \\ x_n & = & 0 \end{array} \right. \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & \vdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

Demonstração:

$$(3) \Rightarrow (4) \quad E_k \cdot \dots \cdot E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A = I \Rightarrow A = E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdot \dots \cdot E_k^{-1}$$

(4) \Rightarrow (1) A é um produto de matrizes invertíveis.

Algoritmo da inversão

Para obtermos a matriz inversa de A , aplicamos, sobre $I_{n \times n}$, a mesma sequência ordenada de operações elementares que transforma a matriz A na matriz $I_{n \times n}$.

Exemplo 01: Determine, caso exista, a inversa da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Resolução:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & \vdots & 1 & 0 \\ 1 & 2 & \vdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftrightarrow L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & \vdots & 0 & 1 \\ 0 & -1 & \vdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 + 2L_2]{\sim}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \vdots & 2 & 1 \\ 0 & -1 & \vdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow -L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \vdots & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \vdots & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo 02: Determine, caso exista, a inversa da matriz

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Resolução:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2 \cdot L_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad L_2 \leftarrow -\frac{1}{3} \cdot L_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad L_3 \leftarrow L_3 - 2 \cdot L_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{3} & -\frac{4}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right] \quad L_3 \leftarrow \frac{3}{7} L_3$$

Resolução:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \vdots & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -\frac{4}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \end{array} \right]$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - 2 \cdot L_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \vdots & \frac{3}{7} & \frac{2}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \vdots & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -\frac{4}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow L_2 + \frac{2}{3} L_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{4}{3} & \vdots & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \vdots & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -\frac{4}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \end{array} \right]$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - \frac{4}{3} \cdot L_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \vdots & \frac{3}{7} & \frac{2}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & -\frac{4}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \end{array} \right]$$

Exemplo 03: Determine, caso exista, a inversa da matriz

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

Resolução:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & \vdots & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & \vdots & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 & 3 & \vdots & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2 \cdot L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2 \cdot L_1 \\ \sim \end{array} \quad \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & \vdots & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & \vdots & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & \vdots & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftrightarrow L_4 \quad \sim \quad \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & \vdots & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & \vdots & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & \vdots & -2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2 \cdot L_2 \\ \sim \end{array}$$

Resolução:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & \vdots & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 1 & \vdots & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -8 & -1 & \vdots & -2 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right] \quad L_4 \leftarrow \underset{\sim}{L_4} + L_3 \quad \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & \vdots & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 1 & \vdots & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & -2 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

Exemplo 04: Determine todos os valores reais de c tais que

$$D = \begin{bmatrix} c & 1 & 0 \\ 1 & c & 1 \\ 0 & 1 & c \end{bmatrix}$$

seja uma matriz invertível.

Resolução:

$$\begin{bmatrix} c & 1 & 0 \\ 1 & c & 1 \\ 0 & 1 & c \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{bmatrix} 1 & c & 1 \\ c & 1 & 0 \\ 0 & 1 & c \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - c \cdot L_1} \begin{bmatrix} 1 & c & 1 \\ 0 & 1 - c^2 & -c \\ 0 & 1 & c \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & c & 1 \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 1 - c^2 & -c \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - (1 - c^2)L_2} \begin{bmatrix} 1 & c & 1 \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & -2c + c^3 \end{bmatrix}$$

Resolução:

Portanto,

$$-2c + c^3 \neq 0 \Rightarrow c \neq 0, \pm\sqrt{2}$$

Exemplo 05: Escreva a matriz

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

e sua matriz inversa como um produto de matrizes elementares.

Resolução:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \vdots & 1 & 0 \\ -5 & 2 & \vdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 + 5 \cdot L_1 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & \vdots & 1 & 0 \\ 0 & 2 & \vdots & 5 & 1 \end{bmatrix} \quad L_2 \leftarrow \frac{1}{2} \cdot L_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \vdots & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \vdots & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Resolução:

Portanto,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Assim,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo 06: Sabe-se que a sequência ordenada de operações elementares transforma a matriz A , de tamanho 2×2 , na matriz identidade $I_{2 \times 2}$:

- (i) $L_2 \leftrightarrow L_1$
- (ii) $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$
- (iii) $L_2 \leftarrow -L_2$
- (iv) $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$

Determine a matriz inversa de A .

Resolução:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftrightarrow L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - 2 \cdot L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow -L_2]{\sim}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 - L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Agora é com você!

Leia a teoria no livro-texto indicado e faça todas as atividades propostas em nosso planejamento de aulas.



PUC Minas
Virtual