Rapport Jour 3:

Meet : 21h00 – 23h00
Participants: Giversy MALONGA | M'PIKA Emmanuelle | AZIDAMA Belvine

Création et Calcul des Indicateurs Clés (KPIs) VIH pour le Congo (COG)

Ces indicateurs permettent d'étudier :

- la prévalence du VIH ;
- l'accès au dépistage et la connaissance du statut sérologique ;
- la couverture du traitement antirétroviral ;
- l'incidence des nouvelles infections;
- la mortalité liée au SIDA ;
- la répartition du VIH selon le sexe ;
- la structure des cas selon les tranches d'âge.

Indicateurs calculés

1. **Prévalence du VIH**

Objectif : Mesurer la proportion de la population vivant avec le VIH.

Méthodologie :

- Sélection des indicateurs associés à la prévalence du VIH, notamment : hiv_0000000001, anc_testing, hiv_prevalence et autres indicateurs similaires.
- Calcul de la moyenne annuelle des valeurs disponibles.
- Création de la tendance annuelle correspondante : **preva_trend.**

2. **Dépistage et connaissance du statut sérologique**

Objectif : Évaluer l'accès au dépistage ainsi que la proportion de personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut sérologique.

Indicateurs utilisés : hiv_statusknownhiv, anc_testing, number_plhiv_knowledge_of_status.

Méthodologie:

- Filtrage des indicateurs relatifs à la connaissance du statut sérologique.
- Calcul de la moyenne des valeurs pour chaque année.
- Création de la tendance annuelle : **testing_trend.**

3. **Prise en charge médicale et couverture antirétrovirale**

Objectif : Mesurer la proportion de personnes vivant avec le VIH bénéficiant d'un traitement antirétroviral (ART).

Indicateurs utilisés : percent_plwh, hiv_artcoverage.

Méthodologie :

- Sélection des données concernant les deux sexes (sex == 'both').
- Calcul de la moyenne annuelle des valeurs.
- Création de la tendance de couverture antirétrovirale : **art_trend.**

4. Incidence du VIH — nouvelles infections

Objectif : Suivre l'évolution du nombre de nouvelles infections par le VIH au fil du temps.

Indicateurs utilisés : new_infections, hiv_0000000026.

Méthodologie :

- Sélection des données relatives aux deux sexes (sex == 'both').
- Agrégation des valeurs par année (somme annuelle des nouvelles infections).
- Création de la tendance d'incidence : **incidence_trend.**

5. Mortalité liée au SIDA

Objectif : Mesurer le nombre de décès attribuables au SIDA.

Indicateurs utilisés : aids_deaths, hiv_0000000006.

Méthodologie :

- Sélection des données relatives aux deux sexes (sex == 'both').
- Agrégation des valeurs par année (somme annuelle des décès).
- Création de la tendance de mortalité : **deaths_trend.**

6. Répartition selon le sexe

Objectif : Analyser la répartition du VIH entre les hommes et les femmes.

Indicateurs utilisés : hiv_0000000001, plwh.

Méthodologie :

- Filtrage des données pour les catégories males et female.
- Agrégation des valeurs par année et par sexe.
- Calcul de la tendance selon le sexe : **gender_trend.**

7. Structure par tranche d'âge

Objectif : Analyser la distribution du VIH et des nouvelles infections selon les différentes catégories d'âge.

Indicateurs utilisés : plwh, new_infections.

Méthodologie :

- Exclusion des groupes d'âge agrégés : all, 0-14, 15-24, 15-49.
- Conservation des tranches d'âge détaillées.
- Agrégation des valeurs par année et par groupe d'âge.
- Création de la tendance par tranche d'âge : **age_trend.**