

## Part I

### 1 4. APLICAȚII LINIARE

#### 1.1 A. Teorie

Morfismele -de grupuri, de inele, etc.- sunt funcții compatibile cu structura -de grup, inel, etc. Similar morfismelor de grupuri ori de inele, definim noțiunea de aplicație liniară ca funcție între două spații vectoriale peste același corp, compatibilă cu cele două operații: cea internă (adunarea vectorilor) și cea externă (înmulțirea vectorilor cu scalari).

##### 1.1.1 4.1. Definiția aplicației liniare

Peste tot în cele ce urmează  $V$  și  $W$  sunt două spații vectoriale peste același corp  $\mathbf{K}$ .

**Definiția 4.1.1. Definiția aplicației liniare.** O funcție  $L : V \rightarrow W$  care verifică condițiile

- i.  $L(u + v) = L(u) + L(v)$  pentru orice  $u, v \in V$  (adică  $L$  este **aditivă**)
- ii.  $L(\alpha u) = \alpha L(u)$  pentru orice  $u \in V$  și orice  $\alpha \in \mathbf{K}$  (adică  $L$  este **omogenă**)  
se numește **aplicație liniară (sau transformare liniară)**. Notăm mulțimea aplicațiilor liniare definite pe  $V$  cu valori în  $W$  cu  $\mathcal{L}(V, W)$ .

Axioma i. din această definiție implică faptul că dacă  $L \in \mathcal{L}(V, W)$  atunci  $L$  este morfism între grupurile  $(V, +)$  și  $(W, +)$ . În consecință  $L$  transformă vectorul nul în vectorul nul și simetricul unui vector în simetricul imaginii acestuia, adică

**Propoziția 4.1.1.** Dacă  $L \in \mathcal{L}(V, W)$  atunci

- $L(\theta_V) = \theta_W$
- $L(-v) = -L(v), \forall v \in V$ .

**Exemplul 4.1.1. Aplicația nulă**  $\theta : V \rightarrow W$ ,  $\theta(v) := \theta_W$  este o aplicație liniară.

**Exemplul 4.1.2. Aplicația identică**  $id_V$  este o aplicație liniară. (Reamintim că  $id_V = 1_V : V \rightarrow V$ ,  $id_V(v) = v$ ).

**Exemplul 4.1.3.** Dacă  $L \in \mathcal{L}(V, W)$  atunci  $L'(v) := -L(v)$  definește o aplicație liniară, adică  $L' \in \mathcal{L}(V, W)$ .

**Exemplul 4.1.4.** Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

- a. Dacă  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , notând  $a := f(1)$  avem  $f(x) = f(x \cdot 1) = xf(1) = ax$  pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .
- b. Dacă există  $a \in \mathbb{R}$  astfel ca  $f(x) = ax$  pentru orice  $x \in \mathbb{R}$  atunci  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

Prin urmare  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  dacă și numai dacă există  $a \in \mathbb{R}$  astfel ca  $f(x) = ax$  pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .

**Exemplul 4.1.5.** Funcția  $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , definită prin  $L(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_2 - x_3)$  este o aplicație liniară (aici  $V = \mathbb{R}^3, W = \mathbb{R}^2$  și  $\mathbf{K} = \mathbb{R}$ ). Într-adevăr, dacă  $x = (x_1, x_2, x_3), y = (x'_1, x'_2, x'_3) \in \mathbb{R}^3$  și  $\alpha \in \mathbb{R}$  avem, ținând cont de expresia analitică a funcției  $L$  și de definiția operațiilor din  $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}$  și  $\mathbb{R}^2/\mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned} L(x + y) &= L(x_1 + x'_1, x_2 + x'_2, x_3 + x'_3) = (x_1 + x'_1 - x_2 - x'_2, x_2 + x'_2 - x_3 - x'_3) = \\ &= (x_1 - x_2, x_2 - x_3) + (x'_1 - x'_2, x'_2 - x'_3) = L(x) + L(y) \text{ și } L(\alpha x) = L(\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3) = \\ &= (\alpha x_1 - \alpha x_2, \alpha x_2 - \alpha x_3) = \alpha(x_1 - x_2, x_2 - x_3) = \alpha L(x); \text{ prin urmare } L \in \mathcal{L}(V, W). \end{aligned}$$

O funcție  $L : V \rightarrow W$  este o aplicație liniară dacă și numai dacă ea conservă combinațiile liniare. Următoarea propoziție dă condiții necesare și suficiente de liniaritate folosind această echivalență și, în consecință, oferă definiții alternative pentru aplicațiile liniare.

**Propoziția 4.1.2.** Fie  $L : V \rightarrow W$  o funcție. Următoarele afirmații sunt echivalente.

- (a)  $L \in \mathcal{L}(V, W)$
- (b)  $L(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 L(v_1) + \alpha_2 L(v_2) \forall v_1, v_2 \in V, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbf{K}$
- (c)  $L(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 L(v_1) + \alpha_2 L(v_2) + \dots + \alpha_n L(v_n) \forall v_1, v_2, \dots, v_n \in V, \forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbf{K}, \forall n \in \mathbb{N}^*$

**Exemplul 4.1.6.** Fie  $L \in \mathcal{L}(V, W)$  și  $S \subset V$ . Să arătăm că  $L(\text{span}(S)) = \text{span}(L(S))$

- a. Arătăm întâi că  $L(\text{span}(S)) \subset \text{span}(L(S))$ . Fie  $w \in L(\text{span}(S))$ . Atunci există  $v \in \text{span}(S)$  astfel încât  $L(v) = w$ . Dar  $v \in \text{span}(S)$ , deci există  $v_1, v_2, \dots, v_n \in S$  și  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbf{K}$  astfel încât  $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ . Prin urmare  $w = L(v) = L(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 L(v_1) + \alpha_2 L(v_2) + \dots + \alpha_n L(v_n) \in \text{span}(L(S))$  și incluziunea este demonstrată.
- b. Rămâne să arătăm incluziunea inversă. Fie, pentru aceasta,  $w \in \text{span}(L(S))$ . Atunci există  $w_1, w_2, \dots, w_n \in L(S)$  și  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbf{K}$  astfel încât  $w = \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \dots + \alpha_n w_n$ . Cum  $w_1, w_2, \dots, w_n \in L(S)$  înseamnă că există  $v_1, v_2, \dots, v_n \in S$  astfel încât  $w_1 = L(v_1), \dots, w_n = L(v_n)$ , deci  $w = \alpha_1 L(v_1) + \alpha_2 L(v_2) + \dots + \alpha_n L(v_n) = L(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) \in L(\text{span}(S))$ . Prin urmare am dovedit că  $\text{span}(L(S)) \subset L(\text{span}(S))$  și egalitatea este demonstrată.

O aplicație liniară transformă subspații în subspații, după cum rezultă din următoarea propoziție.

**Propoziția 4.1.3.** Fie  $L \in \mathcal{L}(V, W)$  și  $U \leq V$ . Atunci  $L(U) \leq W$ .

Aplicațiile liniare din  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$  au o expresie analitică simplă. Următoarea afirmație extinde modelul dat de exemplul 4.1.4.

**Propoziția 4.1.4.** Funcția  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  este o aplicație liniară (a spațiului  $\mathbb{R}^n/\mathbb{R}$  în spațiul  $\mathbb{R}/\mathbb{R}$ ) dacă și numai dacă există  $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$  astfel încât  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$  pentru orice  $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ .

Între aplicațiile liniare și matrice există o strânsă legătură. Fie  $L$  din exemplul 1.1.1. Putem da expresia analitică a funcției  $L$  matriceal astfel: notând

$$A := \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ avem } A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}, \text{ sau, echivalent}$$

$$Ax^T = (L(x))^T. \text{ În general:}$$

**Propoziția 4.1.5.** Dacă  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  și  $x \in \mathbb{R}^n$ , atunci  $L(x) := (Ax^T)^T$  definește  $L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ .

**Exemplul 4.1.6.** Să răspundem la întrebarea care dintre următoarele aplicații este liniară?

a.  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) := (x + y, x - a - 1), a \in \mathbb{R}.$

b.  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) := (x + y, x - ay^2), a \in \mathbb{R}.$

**Soluție.**

a. Să presupunem că  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ . Cum  $f(0, 0) = (0, 0)$  rezultă că  $(0, -a - 1) = (0, 0)$ , deci o condiție necesară de liniaritate este  $a = -1$ .

Să verificăm dacă această condiție este și suficientă, adică să vedem dacă

$$f(x, y) := (x + y, x) \text{ definește o aplicație liniară. Luând } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{avem } A(x, y)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ x \end{pmatrix} = (x + y, x)^T; \text{ con-}$$

fom propoziției precedente rezultă că  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ . În consecință  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$  dacă și numai dacă  $a = -1$ .

Arătați suficiența condiției găsite și prin definiție.

b. Să presupunem iar că  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ . Atunci  $f(-x, -y) = -f(x, y)$  pentru orice  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , de unde obținem că  $-x - ay^2 = -x + ay^2$  pentru orice  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Prin urmare o condiție necesară de liniaritate este  $a = 0$ . Suficiența condiției rezultă din punctul a. În consecință  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$  dacă și numai dacă  $a = 0$ .

**Exemplul 4.1.6.** Dacă  $n > 1$ , aplicația de derivare  $d : \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_{n-1}[x]$  definită prin  $d(f) := f'$  este liniară.

**Exemplul 4.1.7.** Fie  $C^0[a, b]$  spațiul (real) al funcțiilor continue pe intervalul  $[a, b]$  și  $I(f) := \int_a^b f(x) dx$ , pentru orice  $f \in C^0[a, b]$ . Atunci  $I \in \mathcal{L}(C^0[a, b], \mathbb{R})$ .

**Exemplul 4.1.8.** Fie  $n \in \mathbb{N}^*$  și  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ . Aplicația  $p_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  numită **proiecția de indice  $i$**  (sau **proiecția a  $i$ -a**) definită prin

$$p_i(x_1, x_2, \dots, x_n) := x_i$$

este liniară.

**Exemplul 4.1.9.** O aplicație liniară este complet determinată de acțiunea sa asupra vectorilor dintr-o bază. Să verificăm această afirmație. Presupunem că  $f \in \mathcal{L}(V, W)$ , că  $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  este o bază în  $V$  și că  $f(v_1) = w_1, f(v_2) = w_2, \dots, f(v_n) = w_n$ . Fie acum  $v \in V$ . Atunci există scalarii (unici)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  astfel ca  $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ . Dar  $f$  este liniară, deci  $f(v) = f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + \dots + \alpha_n f(v_n) = \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \dots + \alpha_n w_n$ .

Compusa a două transformări liniare este o transformare liniară:

**Propoziția 4.1.6.** Fie  $f \in \mathcal{L}(U, V)$  și  $g \in \mathcal{L}(V, W)$ . Atunci  $g \circ f \in \mathcal{L}(U, W)$ .

Mulțimea transformărilor liniare dintre două spații vectoriale (peste același corp) poate fi dotată cu o structură naturală de spațiu liniar.

**Propoziția 4.1.7.** a. Dacă  $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V, W)$  atunci  $L_1 + L_2 \in \mathcal{L}(V, W)$ , unde  $(L_1 + L_2)(w) := L_1(w) + L_2(w)$ ;

b. Dacă  $L \in \mathcal{L}(V, W)$  și  $\alpha \in K$  atunci  $\alpha L \in \mathcal{L}(V, W)$ , unde  $(\alpha L)(w) := \alpha L(w)$ ;

c.  $\mathcal{L}(V, W)$  este un spațiu vectorial peste corpul  $K$  în raport cu operațiile definite mai sus.

d. Dacă  $\dim V = n$  și  $\dim W = m$  atunci  $\dim \mathcal{L}(V, W) = m^n$ .

O aplicație liniară bijectivă stabilește, în esență, că spațiile vectoriale între care operează această transformare "coincid"

**Definiția 4.1.2. Definiția izomorfismului.** O funcție  $f : V \rightarrow W$  se numește **izomorfism** dacă ea este liniară și bijectivă. Dacă o asemenea funcție există spunem că spațiile  $V$  și  $W$  sunt izomorfe și scriem  $V \cong W$ .

**Exemplul 4.1.10.** Să arătăm că spațiile reale  $\mathbb{R}_n[x]$  și  $\mathbb{R}^{n+1}$  sunt izomorfe. Este suficient să definim acțiunea unei aplicații liniare bijective între vectorii bazelor canonice:  $f(1) := e_1, f(x) := e_2, f(x^2) := e_3, \dots, f(x^n) := e_{n+1}$  (vezi exemplul 4.1.9). Atunci  $f(a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n) := a_0 e_1 + a_1 e_2 + \dots + a_n e_{n+1}$  definește un izomorfism  $\mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ . Expresia analitică a inversei acestei transformări este definită prin  $f^{-1}(e_1) = 1, f^{-1}(e_2) = x, \dots, f^{-1}(e_{n+1}) = x^n$ .

**Exemplul 4.1.11..** Două spații vectoriale peste același corp sunt izomorfe dacă și numai dacă ele au aceeași dimensiune.

1. Fie  $f : V \rightarrow W$  este izomorfism și  $B_V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  o bază în  $V$ . Pentru a arăta că  $\dim V = \dim W$  este suficient să arătăm că  $B_W := \{f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)\}$  este bază în  $W$ .

**1.1.** Aratam ca  $B_W$  este un sistem de vectori liniar independent. Presupunem ca avem o combinație liniară nula a vectorilor din

$$B_W : \alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + \dots + \alpha_n f(v_n) = \theta_W.$$

Folosind liniaritatea aplicației  $f$  avem de aici:

$$f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) = f(\theta_V).$$

Cum  $f$  este injectivă, rezulta ca

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \theta_V.$$

Dar  $B_V$  este baza în  $V$ , deci  $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ . În consecință  $B_W$  este sistem de vectori liniar independent.

- 1.2.** Aratam ca  $B_W$  este un sistem de generatori în  $B_W$ . Fie  $w \in W$ . Cum  $f$  este surjectivă, rezulta ca există  $v \in V$  astfel ca  $f(v) = w$ . Atunci există scalarii  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  astfel ca  $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ , deci

$$w = f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + \dots + \alpha_n f(v_n)$$

adică  $w$  este combinație liniară a vectorilor din  $B_W$ .

2. Sa presupunem acum ca  $\dim V = \dim W = n$ . Fie  $B_V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  o baza în  $V$  și  $B_W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$  o baza în  $W$ . Ca în exemplul precedent se arată ca  $f(v_1) = w_1, f(v_2) = w_2, \dots, f(v_n) = w_n$  definesc un izomorfism între cele două spații. De aceea  $V \cong W$ .

**Exemplul 4.1.12.** Conform propoziției precedente, dacă  $V_n$  este un spațiu real atunci  $V \cong \mathbb{R}^n$ . Sa construim un izomorfism între cele două spații. Fie  $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  o baza în  $V_n$  și  $B_c = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  baza canonică din  $\mathbb{R}^n$ . Fie (vezi exemplul 4.1.9)  $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$  un vector din  $V_n$ . Definim  $f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) := \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$ . Se verifică imediat ca  $f \in \mathcal{L}(V_n, \mathbb{R}^n)$ . Analog, dacă  $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$  este un vector arbitrar din  $\mathbb{R}^n$  definim  $g(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n) = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ . Deoarece  $f \circ g = id_{\mathbb{R}^n}$  iar  $g \circ f = id_{V_n}$  rezulta ca  $f$  este bijectivă iar inversa sa este aplicația liniară  $g$ .

**Propoziția 4.1.8.** Dacă  $U \cong V$  și  $V \cong W$  atunci  $U \cong W$ .

### 1.1.2 4.2. Subspatii asociate aplicatiilor liniare

Aplicatiei liniare de la exemplul 4.1.5 ii putem asocia multimea tuturor vectorilor din domeniu a caror imagine este vectorul nul:

$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid L(x_1, x_2, x_3) = (0, 0)\} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = x_2 = x_3\} = \{(\alpha, \alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ . Acesta este un subspatiu important al domeniului de definitie: nucleul aplicatiei  $L$ .

**Definitia 4.2.1. Definitia nucleului.** Fie  $L \in \mathcal{L}(V, W)$ . Multimea

$$\ker L := \{v \in V \mid L(v) = \theta_W\}$$

se numeste **nucleul aplicatiei liniare**  $L$ .

Nucleul unei aplicatii liniare este subspatiu al domeniului de definitie.

**Propozitia 4.2.1.** Daca  $L \in \mathcal{L}(V, W)$  atunci  $\ker L \leq V$ . Dimensiunea nucleului aplicatiei  $L$  se numeste defectul acestei aplicatii.

**Exemplul 4.2.1.** Daca  $L$  este aplicatia definita la exemplul 4.1.5, atunci  $\dim \ker L = 1$ . Intr-adevar, cum  $L(x_1, x_2, x_3) := (x_1 - x_2, x_2 - x_3)$  avem consecutiv:

$$L(x_1, x_2, x_3) = (0, 0) \Leftrightarrow (x_1 - x_2, x_2 - x_3) = (0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_1 = x_2 = x_3.$$

Deci  $\ker L = \{(x, x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \{x(1, 1, 1) \mid x \in \mathbb{R}\} = \text{Span}\{(1, 1, 1)\}$ , iar  $\{(1, 1, 1)\}$  este o baza pentru  $\ker L$ . Prin urmare  $\dim \ker L = 1$ .

Reamintim ca daca  $f : A \rightarrow B$  este o functie, atunci **imaginea** sa este  $\text{Im } f = f(A) = \{b \in B \mid \exists a \in A : f(a) = b\}$ . Imaginea unei aplicatii liniare este un subspatiu al codomeniului sau.

**Propozitia 4.2.2.** Daca  $L \in \mathcal{L}(V, W)$  atunci  $\text{Im } L \leq W$ . Dimensiunea imaginii aplicatiei  $L$  se numeste **rangul** acestei aplicatii.

**Exemplul 4.2.2.** Daca  $L$  este aplicatia definita la exemplul 4.1.5, atunci  $\dim \text{Im } L = 2$ . Intr-adevar, cum  $L(x_1, x_2, x_3) := (x_1 - x_2, x_2 - x_3)$ , iar imaginea este

$$\text{Im } L = \{(x_1 - x_2, x_2 - x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\} = \{x_1(1, 0) + x_2(-1, 1) + x_3(0, -1)\} = \text{Span}\{(1, 0), (-1, 1), (0, -1)\}.$$

Prin urmare  $\{(1, 0), (-1, 1)\}$  este o baza a imaginii, deci  $\dim \text{Im } L = 2$ .

Din exemplele 4.2.1 si 4.2.2 observam ca dimensiunea domeniului de definitie al aplicatiei  $L$  este suma dintre defectul si rangul acestei transformari liniare. Proprietatea este valabila pentru orice aplicatie liniara.

**Teorema 4.2.1.** Daca  $L \in \mathcal{L}(V, W)$  atunci  $\dim \ker L + \dim \text{Im } L = \dim V$ .

**Exemplul 4.2.3.** Fie  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ ,  $f(x, y, z) := (x + y + z, x - z)$ . Sa determinam  $\dim \ker f$  si  $\dim \text{Im } f$ .

Avem  $\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x + y + z, x - z) = (0, 0)\} = \{(x, -2x, x) \in \mathbb{R}^3 \mid x \in \mathbb{R}\} = \text{span}((1, -1, 1))$ , deci  $\dim \ker f = 1$ . Din teorema precedenta avem  $\dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}^2 - \dim \ker f = 2 - 1 = 1$ .

**Propozitia 4.2.3.** Fie  $L \in \mathcal{L}(V, W)$ . Atunci

a.  $L$  este injectiva daca si numai daca  $\ker L = \{\theta_V\}$ .

b.  $V \cong W$  daca si numai daca  $\ker L = \{\theta_V\}$  si  $\operatorname{Im} L = W$ .

### 1.1.3 4.3. Matricea unei aplicatii liniare

Am vazut ca spatiile intre  $\mathbb{R}^{m \times n}$  si  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  exista o legatura (vezi propozitia 4.1.5). Aprofundam aceasta legatura esentiala dintre matrice si aplicatiile liniare.

**Definitie 4.3.1. Matricea unei aplicatii liniare.** Fie  $V/K, W/K$  doua spatii vectoriale,  $f \in \mathcal{L}(V, W)$ ,  $B_V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  o baza in  $V$  si  $B_W = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$  o baza in  $W$ . Stim ca expresia analitica a transformarii  $f$  este perfect determinata de actiunea acesteia pe  $B_V$ . De aceea vom atasa aplicatiei  $f$  o matrice care are pe coloane coordonatele vectorilor  $f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)$  in baza  $B_W$ , adica o matrice cu  $m$  linii si  $n$  coloane din  $K^{m \times n}$ . Prin urmare exista si sunt unici scalarii  $a_{ij} \in K$  astfel incat

$$\begin{cases} f(v_1) = a_{11}w_1 + a_{21}w_2 + \dots + a_{m1}w_m \\ f(v_2) = a_{12}w_1 + a_{22}w_2 + \dots + a_{m2}w_m \\ \dots \\ f(v_n) = a_{1n}w_1 + a_{2n}w_2 + \dots + a_{mn}w_m \end{cases}$$

Matricea

$$f_{B_V B_W} := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in K^{m \times n}$$

se numeste **matricea transformarii liniare  $f$  in perechea de baze  $B_V, B_W$** .

Expresia analitica a unei transformari liniare  $f$  se poate exprima elegant matriceal folosind matricea aplicatiei  $f$  intr-o pereche de baze.

**Propozitie 4.3.1.** Fie  $f \in \mathcal{L}(V, W)$  si  $f_{B_V B_W}$  matricea ei in perechea de baze  $B_V, B_W$ . Daca  $v = x_1v_1 + x_2v_2 + \dots + x_nv_n \in V$  si  $f(v) = y_1w_1 + y_2w_2 + \dots + y_mw_m$  atunci

$$f(v)_{B_W} = f_{B_V B_W} \cdot v_{B_V}$$

$$\text{unde } v_{B_V} := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ si } f(v)_{B_W} := \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}.$$

**Exemplul 4.3.1.** Fie aplicatia  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ ,  $f(x, y, z) := (x + y + z, x - z)$  de la exemplul 4.2.3. Sa construim matricea sa in perechea de baze canonice  $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ ,  $B' = \{e'_1 = (1, 0), e'_2 = (0, 1)\}$ . Deoarece

$$f(e_1) = (1, 1) = (1, 0) + (0, 1) = 1 \cdot e'_1 + 1 \cdot e'_2$$

$$f(e_2) = (1, 0) = 1 \cdot e'_1 + 0 \cdot e'_2$$

$$f(e_3) = (1, -1) = (1, 0) - (0, 1) = 1 \cdot e'_1 - 1 \cdot e'_2$$

înseamna ca

$$f_{BB'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sa verificam expresia analitica matriceala data in propozitia precedenta. Daca

$$v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ atunci } v_B = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \text{ Deoarece } f(v) = (x + y + z)e'_1 + (x - z)e'_2 \text{ avem } f(v)_{B'} = \begin{pmatrix} x + y + z \\ x - z \end{pmatrix} = f_{BB'} \cdot v_B.$$

Sa mai remarcam faptul ca rangul aplicatiei  $f$  coincide cu rangul matricei  $f_{BB'}$ :  $\text{rang}(f_{BB'}) = \dim \text{Im } f$ . De asemenea defectul aplicatiei coincide cu dimensiunea  $\dim \text{Null}(f_{BB'}) = \dim \ker f$ . Aceasta observatie este valabila intodeauna.

**Propozitia 4.3.2.** Fie  $f \in \mathcal{L}(V, W)$  si  $f_{B_V B_W}$  matricea ei in perechea de baze  $B_V, B_W$ . Atunci rangul aplicatiei  $f$  coincide cu rangul matricei  $f_{B_V B_W}$ , iar defectul aplicatiei  $f$  coincide cu  $\dim \text{Null}(f_{B_V B_W})$ .

**Exemplul 4.3.2.** Sa determinam defectul si rangul aplicatiei

$$f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[x], \mathbb{R}^2), f(c + bx + ax^2) := (a + b + c, c - a).$$

Deoarece matricea aplicatiei  $f$  in perechea de baze canonice  $B = \{1, x, x^2\}$   $B' = \{(1, 0), (0, 1)\}$  este  $f_{BB'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ , din exemplul 4.3.1 rezulta ca rangul aplicatiei este egal cu 2, iar defectul este egal cu 1 (vezi si exemplul 4.1.10).

Matricea compusei a doua aplicatii liniare coincide cu produsul matricelor celor doua transformari liniare:

**Propozitia 4.3.2. Matricea compusei si matricea inversei.** Fie  $f \in \mathcal{L}(V_1, V_2)$  si  $g \in \mathcal{L}(V_2, V_3)$ ,  $B_1$  o baza in  $V_1$ ,  $B_2$  o baza in  $V_2$  si  $B_3$  o baza in  $V_3$ . Atunci

$$(g \circ f)_{B_1 B_3} = g_{B_2 B_3} \cdot f_{B_1 B_2}.$$

Daca  $f$  este izomorfism, atunci matricea  $f_{B_1 B_2}$  este inversabila si

$$f_{B_2 B_1}^{-1} = (f_{B_1 B_2})^{-1}.$$

**Propozitia 4.3.3. Schimbarea bazelor.** Fie  $f \in \mathcal{L}(V_1, V_2)$ ,  $B_1, B'_1$  doua baze in  $V_1$  si  $B_2, B'_2$  doua baze in  $V_2$ . Atunci

$$f_{B'_1 B'_2} = T_{B_2 B'_2}^{-1} \cdot f_{B_1 B_2} \cdot T_{B_1 B'_1}$$

unde  $T_{B_1 B'_1}$  este matricea de trecere de la baza  $B_1$  la baza  $B'_1$ , iar  $T_{B_2 B'_2}$  este matricea de trecere de la baza  $B_2$  la baza  $B'_2$ .

**Exemplul 4.3.3.** Sa se determine matricea aplicatiei (de la exemplul 4.3.1)  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ ,  $f(x, y, z) := (x + y + z, x - z)$  in perechea de baze

$$B_1 = \{v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (0, 1, 1), v_3 = (1, 0, 1)\},$$



$$B_2 = \{w_1 = (1, 1), v_2 = (1, -1)\}.$$

Vom folosi rezultatul de la exemplul 4.3.1 si propozitia precedenta. Cum matricea de trecere de baza canonica  $B$  din  $\mathbb{R}^3$  la baza  $B_1$  este

$$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

iar matricea de trecere de baza canonica  $B'$  din  $\mathbb{R}^2$  la baza  $B_2$  este

$$T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

rezulta ca

$$f_{B_1 B_2} = T_2^{-1} f_{B B'} T_1 = T_2^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = T_2^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pentru ultimul produs aplicam tehnica transformarilor elementare pe linie:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 & -3 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 3/2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 & 3/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Prin urmare

$$f_{B_1 B_2} = \begin{pmatrix} 3/2 & 1/2 & 1 \\ 1/2 & 3/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

## 1.2 B. Probleme rezolvate

1. Stabiliți care din funcțiile de mai jos sunt aplicații liniare:

- (a)  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(x, y) = (x - y, 2x + 7y, 2x + 1)$
- (b)  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f(x) = (2x, x^2)$
- (c)  $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(x, y, z) = (x - 2y, x + 3y + 2z, 0)$ .

*Soluție:*

(a) O aplicație liniară  $f : V \longrightarrow W$  satisface relația  $f(\theta_V) = \theta_W$ . Deoarece  $f(0, 0) = (0, 0, 1) \neq (0, 0, 0)$ ,  $f$  nu este liniară.

(b)  $f(ax) = (2ax, a^2x^2)$ , pe când  $af(x) = (2ax, ax^2)$ ; așadar, pentru  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ ,  $f(ax) \neq af(x)$ , deci  $f$  nu este liniară.

(c) Avem de verificat că  $f(x + x', y + y', z + z') = f(x, y, z) + f(x', y', z')$  și  $f(ax, ay, az) = af(x, y, z)$ ,  $\forall (x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .

- $f(x + x', y + y', z + z') = ((x + x') - 2(y + y'), (x + x') + 3(y + y') + 2(z + z'), 0) = (x - 2y + x' - 2y', x + 3y + 2z + x' + 3y' + 2z', 0) = (x - 2y, x + 3y + 2z, 0) + (x' - 2y', x' + 3y' + 2z', 0) = f(x, y, z) + f(x', y', z')$
- $f(ax, ay, az) = (ax - 2ay, ax + 3ay + 2az, 0) = a(x - 2y, x + 3y + 2z, 0) = af(x, y, z)$ .

2. Determinați forma generală a unei aplicații liniare

(a)  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ , (b)  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ , (c)  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ .

*Soluție:*

(a) Notând  $f(1) = a$ , avem  $f(x) = f(x \cdot 1) = x \cdot f(1) = ax$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Reciproc, se verifică imediat că toate funcțiile de forma  $f(x) = ax$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , sunt liniare.

(b) Notând  $f(1, 0) = a$  și  $f(0, 1) = b$ , avem  $f(x, y) = f(x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1)) = x \cdot f(1, 0) + y \cdot f(0, 1) = ax + by$ . Reciproc, se verifică imediat că toate funcțiile de forma  $f(x, y) = ax + by$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ , sunt liniare.

(c) Notând  $f(1) = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ , avem  $f(x) = f(x \cdot 1) = x \cdot f(1) = x \cdot (a, b) = (ax, bx)$ . Reciproc, se verifică imediat că toate funcțiile de forma  $f(x) = (ax, bx)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ , sunt liniare.

3. Arătați că dacă  $f, g : V_1/K \longrightarrow V_2/K$  sunt aplicații liniare, iar  $\alpha, \beta \in K$ , atunci și  $\alpha f + \beta g$  este aplicație liniară.

*Soluție:*

Fie  $x, y \in V_1$  și  $a, b \in K$ , arbitrare. Atunci  $(\alpha f + \beta g)(ax + by) = \alpha f(ax + by) + \beta g(ax + by) = \alpha (af(x) + bf(y)) + \beta (ag(x) + bg(y)) = a(\alpha f(x) + \beta g(x)) + b(\alpha f(y) + \beta g(y)) = a(\alpha f + \beta g)(x) + b(\alpha f + \beta g)(y)$ , ceea ce arată că  $\alpha f + \beta g$  este liniară.

4. Fie  $V_1/K$ ,  $V_2/K$  și  $V_3/K$  trei spații vectoriale și  $f : V_1 \longrightarrow V_2$  și  $g : V_2 \longrightarrow V_3$  două aplicații liniare. Arătați că  $g \circ f : V_1 \longrightarrow V_3$  este o aplicație liniară.

*Soluție:*

Fie  $x, y \in V_1$  și  $a, b \in K$ , arbitrare. Atunci  $(g \circ f)(ax + by) = g(f(ax + by)) = g(af(x) + bf(y)) = ag(f(x)) + bg(f(y)) = a(g \circ f)(x) + b(g \circ f)(y)$ , deci  $g \circ f$  este liniară.

5. Determinați expresia analitică a aplicației liniare  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  dacă

(a)  $f(1, 0) = (1, 2)$  și  $f(0, 1) = (-1, 2)$ ;

(b)  $f(1, 1) = (2, 3)$  și  $f(3, 1) = (4, 5)$ .

*Soluție:*

(a) Pentru a determina  $f(x, y)$  pornind de la valorile lui  $f$  pe vectorii bazei canonice, folosim scrierea lui  $(x, y)$  în baza canonică:  $(x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1)$ . Astfel,  $f(x, y) = f(x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1)) = x \cdot f(1, 0) + y \cdot f(0, 1) = x \cdot (1, 2) + y \cdot (-1, 2) = (x - y, 2x + 2y)$ .

(b) Pentru a determina  $f(x, y)$  pornind de la valorile lui  $f$  pe vectorii bazei formate cu vectorii  $(1, 1)$  și  $(3, 1)$ , folosim scrierea lui  $(x, y)$  în această bază. Fie  $(x, y) = a(1, 1) + b(3, 1)$ , adică  $(x, y) = (a + 3b, a + b)$ . Rezolvând acest sistem (cu necunoscutele  $a, b$ ), obținem  $a = \frac{3y - x}{2}$  și  $b = \frac{x - y}{2}$ .

Folosind această scriere, avem  $f(x, y) = f\left(\frac{3y - x}{2} \cdot (1, 1) + \frac{x - y}{2} \cdot (3, 1)\right) = \frac{3y - x}{2} \cdot f(1, 1) + \frac{x - y}{2} \cdot f(3, 1) = \frac{3y - x}{2} \cdot (2, 3) + \frac{x - y}{2} \cdot (4, 5) = \left(\frac{3y - x}{2}, \frac{3y - x}{2} + \frac{x - y}{2}\right)$ .

$$2 + \frac{x-y}{2} \cdot 4, \frac{3y-x}{2} \cdot 3 + \frac{x-y}{2} \cdot 5 \Big) = (x+y, x+2y).$$

6. Scrieți matricea aplicației liniare  $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f(x, y, z) = (x + 2y, x + y - z)$  relativ la bazele  $B_1$  și  $B_2$ , dacă:
- (a)  $B_1 = \{(1, 2, 0), (1, 0, 0), (1, 2, 3)\}$ ,  $B_2 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ ;  
(b)  $B_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ ,  $B_2 = \{(1, 2), (1, 0)\}$ .

*Soluție:*

(a) Calculăm valorile lui  $f$  pe vectorii bazei  $B_1$ :  $f(1, 2, 0) = (5, 3)$ ,  $f(1, 0, 0) = (1, 1)$ ,  $f(1, 2, 3) = (5, 0)$ . Apoi exprimăm acești vectori în baza  $B_2$ :  $(5, 3) = 5 \cdot (1, 0) + 3 \cdot (0, 1)$ ,  $(1, 1) = 1 \cdot (1, 0) + 1 \cdot (0, 1)$ ,  $(5, 0) = 5 \cdot (1, 0) + 0 \cdot (0, 1)$ .

Matricea lui  $f$  relativ la bazele  $B_1, B_2$  este  $\begin{pmatrix} 5 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

(b) Calculăm valorile lui  $f$  pe vectorii bazei  $B_1$ :  $f(1, 0, 0) = (1, 1)$ ,  $f(0, 1, 0) = (2, 1)$ ,  $f(0, 0, 1) = (0, -1)$ . Apoi exprimăm acești vectori în baza  $B_2$ :

$(1, 1) = a \cdot (1, 2) + b \cdot (1, 0)$  implică  $a = b = \frac{1}{2}$ ;  $(2, 1) = c \cdot (1, 2) + d \cdot (1, 0)$  implică  $c = \frac{1}{2}$ ,  $d = \frac{3}{2}$ ;  $(0, -1) = e \cdot (1, 2) + g \cdot (1, 0)$  implică  $e = -\frac{1}{2}$ ,  $g = \frac{1}{2}$ .

Matricea lui  $f$  relativ la bazele  $B_1, B_2$  este  $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ .

7. Pentru fiecare din aplicațiile liniare de mai jos, calculați  $\ker f$  și deduceți dacă  $f$  este injectivă, apoi dacă  $f$  este surjectivă.

(a)  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}_1[X]$ ,  $f(a, b) = (a - b)X - (a + b)$

(b)  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(a, b) = (a + b, a + 2b, a + 3b)$

(c)  $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f(a, b, c) = (a + b, a + c)$

(d)  $f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(aX^2 + bX + c) = (a - b, b - c, c - a)$ .

*Soluție:*

(a)  $\ker f = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid (a - b)X - (a + b) = 0\}$ . Atenție, este vorba de o egalitate de polinoame, nu de o ecuație. Două polinoame sunt egale dacă au aceiași coeficienți, deci  $\ker f = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a - b = 0, a + b = 0\}$ . Rezolvând acest (banal) sistem, obținem  $a = b = 0$ , deci  $\ker f = \{(0, 0)\}$  ceea ce arată că  $f$  este injectivă. Deoarece  $\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim \mathbb{R}^2$ , deducem că  $\dim \operatorname{Im} f = 2$ . Cum  $\operatorname{Im} f$  este un subspațiu de dimensiune 2 al lui  $\mathbb{R}_1[X]$  care este un spațiu de dimensiune 2, rezultă că  $\operatorname{Im} f = \mathbb{R}_1[X]$ , deci  $f$  este și surjectivă, adică  $f$  este un izomorfism.

(b)  $\ker f = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid f(a, b) = (0, 0, 0)\} = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid (a + b, a + 2b, a + 3b) = (0, 0, 0)\}$ . Obținem, ca de obicei, un sistem liniar și omogen. De astă dată sistemul are 3 ecuații și două necunoscute,  $a$  și  $b$ . Găsim imediat că  $a = b = 0$  este unica soluție a acestui sistem, deci  $\ker f = \{(0, 0)\}$  ceea ce arată că  $f$  este injectivă. Deoarece  $\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim \mathbb{R}^2$ , deducem că  $\dim \operatorname{Im} f = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$ , deci  $f$  nu este surjectivă.

(c)  $\ker f = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid f(a, b, c) = (0, 0)\} = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid (a + b, a +$

$c) = (0, 0)\}$ . Ajungem din nou la un sistem liniar și omogen, de astă dată cu două ecuații și trei necunoscute:  $a+b=0$ ,  $a+c=0$ . Mulțimea soluțiilor acestui sistem este  $\ker f = \{(m, -m, -m) \mid m \in \mathbb{R}\} = \text{span}(1, -1, -1)$ , deci  $\dim \ker f = 1$ . Deducem mai întâi că  $f$  nu este injectivă. Apoi, deoarece  $\dim \ker f + \dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}^3$ , deducem că  $\dim \text{Im } f = 2 = \dim \mathbb{R}^2$ , deci  $f$  este surjectivă.

(d)  $\ker f = \{aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \mid f(aX^2 + bX + c) = (0, 0, 0)\} = \{aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \mid (a-b, b-c, c-a) = (0, 0, 0)\} = \{aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \mid a-b=0, b-c=0, c-a=0\} = \{aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \mid a=b=c\} = \{mX^2 + mX + m \in \mathbb{R}_2[X] \mid m \in \mathbb{R}\} = \text{span}(X^2 + X + 1)$ , deci  $\dim \ker f = 1$  (așadar  $f$  nu este injectivă). Din  $\dim \ker f + \dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}_2[X]$  deducem că  $\dim \text{Im } f = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$ , deci  $f$  nu este nici injectivă și nici surjectivă.

8. Stabiliți dacă aplicațiile liniare definite mai jos sunt sau nu izomorfisme.

- (a)  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}_2[X]$ ,  $f(a, b) = (a+b)X^2 - aX - b$ ;  
(b)  $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ,  $f(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} a-b & b-c \\ c-d & d-a \end{pmatrix}$ ;  
(c)  $f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(aX^2 + bX + c) = (a, a+b, a+b+c)$ .

*Soluție:*

(a) Faptul că  $f$  nu este izomorfism se poate demonstra în foarte multe feluri:

-  $\dim \mathbb{R}^2 = 2 \neq 3 = \dim \mathbb{R}_2[X]$ , deci între cele două spații nu poate exista niciun izomorfism

-  $f$  nu este surjectivă deoarece în imagine sunt numai polinoame care au suma coeficienților 0.

(b) Deoarece  $\dim \mathbb{R}^4 = 4 = \dim \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ,  $f$  este injectivă dacă și numai dacă ea este surjectivă. Pentru a studia injectivitatea, sau surjectivitatea, putem calcula  $\text{Ker } f$  (respectiv  $\text{Im } f$ ). În cazul de față, ar fi mai simplu să observăm că  $f(1, 1, 1, 1) = O_2 = f(0, 0, 0, 0)$ , deci  $f$  nu este injectivă, prin urmare  $f$  nu este izomorfism. În lipsa unei asemenea observații putem calcula  $\ker f = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid f(a, b, c, d) = O_2\} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a-b=b-c=c-d=d-a=0\} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a=b=c=d\} = \{(t, t, t, t) \mid t \in \mathbb{R}\} \neq \{(0, 0, 0, 0)\}$ , deci  $f$  nu este injectivă; alternativ, se poate determina  $\text{Im } f = \left\{ \begin{pmatrix} u & v \\ w & x \end{pmatrix} \mid u+v+w+x=0 \right\} \neq \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , deci  $f$  nu este nici surjectivă.

(c) Deoarece  $\dim \mathbb{R}_2[X] = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ , pentru a demonstra că  $f$  este izomorfism este suficient să arătăm că  $f$  este injectivă, adică  $\ker f = \{0\}$ . Avem  $f(aX^2 + bX + c) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow (a, a+b, a+b+c) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow a=b=c=0 \Leftrightarrow aX^2 + bX + c \equiv 0$  adică  $\ker f = \{0\}$ . Așadar  $f$  este injectivă, deci bijectivă, adică izomorfism.

### 1.3 C. Exerciții

1. Demonstrați propoziția 1.1.1.
2. Care dintre următoarele funcții sunt aplicații liniare?
  - (a)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax$ , unde  $a \in \mathbb{R}$ ;
  - (b)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax$ , unde  $a \in \mathbb{R}$ ;
  - (c)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = a$ , unde  $a \in \mathbb{R}$ ;
  - (d)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b$ , unde  $a, b \in \mathbb{R}$ ;
  - (e)  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x - y$ ;
  - (f)  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x - y^2$ ;
  - (g)  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x - y + 1$ ;
  - (h)  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = ax + by + c$ , unde  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ;
  - (i)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = (x, 2x)$ ;
  - (j)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = (x, 2x)$ ;
  - (k)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = (ax + b, cx + d)$ , unde  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ;
  - (l)  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y) = (x, y, a + y)$ , unde  $a \in \mathbb{R}$ .
  - (m)  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y) = (\sin x, \cos y, y)$

*Raspuns.* a.  $a \in \mathbb{R}$ ; b. pentru  $a = 0$ ; c. pentru  $a = 0$ ; d. pentru  $b = 0$ ; h. pentru  $c = 0$ ; i.; k. pentru  $b = d = 0$ ; l. pentru  $a = 0$ .

3. Demonstrați afirmația făcută la observația 1.1.1.
4. Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y) = (x - y, y, 2x + y)$ . Sa se arate ca aceasta funcție este aplicație liniară, apoi sa se determine nucleul și imaginea sa.

*Raspuns.*  $\{(0, 0)\}; \{(a + b, b, 2a + b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ .
5. Fie  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x)$ . Sa se determine dimensiunile nucleului și imaginii sale.

*Raspuns.* 1, respectiv 2.

6. Fie  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}), f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & x & x \\ x & y & z \end{pmatrix}$ .

- (a) Sa se arate ca aplicația definită este liniară.
- (b) Sa se determine o bază a imaginii aplicației  $f$ .
- (c) Sa se calculeze dimensiunea nucleului acestei aplicații.
- (d) Sa se scrie matricea aplicației în bazele canonice.

- (e) In baza canonica din  $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}$  interschimbam primii doi vectori, iar in baza canonica din  $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$  inlocuim al doilea vector cu suma primilor doi. Care este matricea aplicatiei  $f$  in noile baze?

*Raspuns.* b.  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$  c. 0; d.  $[f] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$

e.  $[f]_{B'_1 B'_2} = E_{(1,2)}(-1)[f]P_{(1,2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

7. Fie  $f : V \rightarrow W$  o aplicatie liniara. Sa se arate ca:

- (a)  $\ker f \leq V$ ;
- (b)  $\operatorname{Im} f \leq W$ ;
- (c)  $f(U) \leq \operatorname{Im} f$  pentru orice  $U \leq V$ .

8.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax$ , unde  $a \in \mathbb{R}$ . Sa se determine constanta  $a$  astfel incat functia  $f$  sa fie izomorfism.

*Raspuns.*  $a \in \mathbb{R}^*$ .

9. Este aplicatia  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x - y, x + y)$  un izomorfism de spatii liniare?

*Raspuns.* Da, deoarece dimensiunea nucleului este 0.

10. Sa se determine constantele  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  astfel incat aplicatia liniara  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = (ax + b, cx + d)$

- (a) sa fie izomorfism;
- (b) sa aiba, in bazele canonice, matricea  $\begin{pmatrix} 1 \\ 13 \end{pmatrix}$ .

*Raspuns.* a.  $a, b, c, d \in \emptyset$ . b.  $a = 1, b = 0, c = 13, d = 0$ .

11. Sa se determine constantele  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  astfel incat aplicatia liniara  $f :$

$$\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}), f(x, y, z, t) = \begin{pmatrix} ax & by \\ cz & dt \end{pmatrix}$$

- (a) sa fie izomorfism;

(b) sa aiba, in bazele canonice, matricea  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ .

*Raspuns.* a.  $a, b, c, d \in \mathbb{R}^*$  ; b.  $a = 1, b = 2, c = 3, d = 4$ .

12. Sa se determine constantele  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  astfel incat aplicatia liniara  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (ax+by, cx+dy)$  sa fie izomorfism, apoi sa se determine matricea acestei aplicatii in baza canonica.

*Raspuns.*  $ad \neq bc; \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ .

13. Aratati ca exista un singur operator liniar al spatiului real tridimensional care asigura urmatoarele transformari (vectorii sunt dati prin coordonatele lor intr-o anumita baza):  $(2, 3, 5) \mapsto (1, 1, 1), (0, 1, 2) \mapsto (1, 1, -1), (1, 0, 0) \mapsto (2, 1, 2)$ ; determinati matricea operatorului in baza in care sunt date coordonatele vectorilor.

*Raspuns.*  $\begin{pmatrix} 2 & -11 & 6 \\ 1 & -7 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

14. Sa se determine dimensiunea spatiului  $\mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R})/\mathbb{R}$ .

15. Sa se determine dimensiunea spatiului  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})/\mathbb{R}$ .

16. Sa se arate ca  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ , stiind ca  $f(x, y, z) = \begin{cases} (x, y), & \text{daca } z=13x-y \\ 0, & \text{daca } z \neq 13x-y \end{cases}$ .

17. Se stie ca o aplicatie liniara intre spatiile vectoriale  $\mathbb{R}_2[x]/\mathbb{R}$  si  $\mathbb{R}_3[x]/\mathbb{R}$  realizeaza transformarile:  $1 \mapsto 1+x, x \mapsto 1+2x, x^2 \mapsto 1+x^3$ .

(a) In ce se transforma vectorul  $1-13x+23x^2$ ?

(b) Care este matricea acestei aplicatii in bazele canonice?

(c) Determinati dimensiunea imaginii.

18. Fie  $B = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$  si  $B' = \{ e'_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, e'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \}$  baze in  $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}$ , respectiv  $\mathbb{R}^2/\mathbb{R}$ , iar  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$  astfel incat  $f(e_1) = e'_1 - e'_2, f(e_2) = e'_2, f(e_3) = -e'_1 + e'_2$ .

(a) Sa se scrie matricea aplicatiei  $f$  in perechea de bazele  $B, B'$ .

(b) Sa se determine  $f(e_1 - e_2 + e_3)$ .

(c) Sa se calculeze dimensiunea nucleului aplicatiei  $f$ .

(d) Sa se scrie matricea aplicatiei in bazele canonice.

19. Fie  $W/K$  si  $V/K$  doua spatii vectoriale. Sa se arate ca spatiile date sunt izomorfe daca si numai daca ele au aceasi dimensiune.
20. Fie  $V_1, V_2, \dots, V_n$  si  $W$  spatii vectoriale peste corpul  $K$ ,  $V = V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$  spatiul produs si  $f : V \rightarrow W$  o functie. Aratati ca  $f \in \mathcal{L}(V, W)$  daca si numai daca exista  $f_1 \in \mathcal{L}(V_1, W), \dots, f_n \in \mathcal{L}(V_n, W)$  astfel incat  $f(v_1, v_2, \dots, v_n) = f_1(v_1) + f_2(v_2) + \dots + f_n(v_n)$ .
21. Fie  $m \in \mathbb{N}^*$ . Sa se determine  $n \in \mathbb{N}$  pentru care exista  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}_n[x])$  a carei matrice in bazele canonice este matricea unitate.
22. Fie  $f$  o aplicatie liniara. Sa se arate ca functia  $f$  este injectiva daca si numai daca nucleul sau este subspatiul nul.
23. \*O aplicatie liniara intre doua spatii reale are matricea  $\begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \end{pmatrix}$ . Sa se determine numerele pozitive  $a, b, c$  astfel ca aplicatia sa fie surjectiva.  
*Raspuns.*  $a = b = c \in (0, \infty)$ .
24. \*Fie  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ ,  $f(x, y) = (x - ay, y - ax, y - x)$ . Sa se determine numarul natural  $a$  si  $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$  astfel incat  $g \circ f = 1_{\mathbb{R}^2}$ .  
*Raspuns.*  $a = 0$ ,  $g(x, y, z) = \begin{cases} (x, y), & \text{daca } z = -x + y \\ 0, & \text{daca } z \neq -x + y \end{cases}$ .

## 2