

CALCUL NUMERIC

TEMA 1

MACIUCA GLORIA - RUXANDRA

GRUPA 344

Exercitiul 1	1
Exercitiul 2	3
Exercitiul 3	6
Exercitiul 4	8
Exercitiul 5	9
Exercitiul 6	11
Exercitiul 7	15
Exercitiul 8	17
Functii de Verificare	23
Stilizare Plot - Explicatii24

Exercitiul 1

Folosind metoda bisectiei pentru $k = 2$, sa se aproximeze manual solutia ecuatiei $8x^3 + 4x - 1 = 0$ din intervalul $[0, 1]$. Sa se evalueze eroarea de aproximare.

$$(a_k, b_k, x_k) = \begin{cases} a_k = a_{k-1} & b_k = b_{k-1} & x_k = x_{k-1} & , f(x_{k-1}) = 0 \\ a_k = a_{k-1} & b_k = x_{k-1} & x_k = \frac{a_k+b_k}{2} & , f(a_{k-1}) \cdot f(x_{k-1}) < 0 \\ a_k = x_{k-1} & b_k = b_{k-1} & x_k = \frac{a_k+b_k}{2} & , f(b_{k-1}) \cdot f(x_{k-1}) < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 & f(a_0) &= -1 \\ b_0 &= 1 & f(b_0) &= 11 \end{aligned}$$

Aplicand formula pentru calculul lui x_0 , se obtine :

$$\text{pentru } k = 0 : (a_0, b_0, x_0) = (0, 1, 0.5)$$

$$\begin{aligned} f(x_0) &= 8 \cdot 0.5^3 + 4 \cdot 0.5 - 1 \\ f(x_0) &= 1 + 2 - 1 \\ f(x_0) &= 2 \end{aligned}$$

Cum $f(a_0) \cdot f(x_0) < 0$, atunci $a_1 = a_0$, iar $b_1 = x_0$ si se calculeaza x_1 aplicand aceeasi formula :

$$\text{pentru } k = 1 : (a_1, b_1, x_1) = (0, 0.5, 0.25)$$

$$\begin{aligned} f(x_1) &= 8 \cdot 0.25^3 + 4 \cdot 0.25 - 1 \\ f(x_1) &= 0.125 + 1 - 1 \\ f(x_1) &= 0.125 \end{aligned}$$

Cum $f(a_1) \cdot f(x_1) < 0$, atunci $a_2 = a_1$, iar $b_2 = x_1$ si se calculeaza x_2 :

$$\text{pentru } k = 2 : (a_2, b_2, x_2) = (0, 0.25, 0.125)$$

$$\begin{aligned} f(x_2) &= 8 \cdot 0.125^3 + 4 \cdot 0.125 - 1 \\ f(x_2) &= 0.0156 + 0.5 - 1 \\ f(x_2) &= -0.4844 \end{aligned}$$

Dupa trei aproximari, am obtinut $x_{Aprox} = 0.125$

Pentru calcularea erorii de aproximare, se va aplica urmatoarea formula :

$$N = \log_2 \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_k}$$

Cunoastem :

$$N = k = 2$$

$$\varepsilon_0 = b_0 - a_0 = 1$$

Atunci :

$$\log_2 \frac{1}{\varepsilon_k} = 2$$

$$\log_2 1 - \log_2 \varepsilon_k = 2$$

$$\log_2 \varepsilon_k = -2$$

$$\varepsilon_k = \frac{1}{4}$$

Am obtinut eroarea de aproximare $\varepsilon_k = 0.25$

Exercitiul 2

Fie ecuatia $8x^3 + 4x - 1 = 0$.

a. Sa se construiasca in Matlab o procedura cu sintaxa $[x_{Aprox}] = MetBisectie(f, A, B, \varepsilon)$.

MetBisectie.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/MetBisectie.m")

```
function [xAprox, N] = MetBisectie(f, A, B, epsilon)

    % Mai intai se verifica existenta unei solutii in intervalul [A, B]
    % prin aplarea functiei 'verificareIntersectie0x'.
    if verificareIntersectie0x (A, B, f) == 1
        a(1) = A;
        b(1) = B;
        x(1) = (a(1) + b(1)) / 2;
        N = floor (log2 ((B - A) / epsilon));

        % Se considera conditie de oprire un numar de iteratii efectuate = 'N'
        % sau o valoare nula a functiei 'f' evaluata in punctul 'xk-1'
        for k = 2 : N + 1
            if (f(x(k-1))) == 0)
                x(k) = x(k-1);
                break;
            elseif (f(a(k-1)) * f(x(k-1)) < 0)
                a(k) = a(k-1);
                b(k) = x(k-1);
                x(k) = (a(k) + b(k)) / 2;
            else
                a(k) = x(k-1);
                b(k) = b(k-1);
                x(k) = (a(k) + b(k)) / 2;
            end
        end

        xAprox = x(k);
    else
        return;
    end
end
```

Exercitiul 2

Fie ecuatia $8x^3 + 4x - 1 = 0$.

b. Intr-un fisier script sa se construiasca in Matlab graficul functiei $f(x) = 8x^3 + 4x - 1 = 0$ pe intervalul $[0, 4]$. Sa se calculeze solutia aproximativa x_{Aprox} cu eroarea $\epsilon = 10^{-5}$, apeland procedura MetBisectie pentru fiecare interval in parte: $[0, 1]$, $[1, 3.2]$, $[3.2, 4]$.

Ex_2b.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex_2b.m")

```

Definirea functiei 'f'
f = @(x) x.^3 - 7 .* x.^2 + 14 .* x - 6;

Memorarea intervalelor de lucru sub forma de matrice 'AB'
AB = [ 0, 1; 1, 3.2; 3.2, 4 ];

Declararea erorii de aproximare a solutiei 'epsilon'
epsilon = 1e-5;

for i = 1 : size(AB, 1)
    Apelarea functiei MetBisectie pentru fiecare interval
    [xAprox(i), N(i)] = MetBisectie(f, AB(i, 1), AB(i, 2), epsilon);
end

Salvarea solutiilor gasite pentru utilizari ulterioare
save aproximariEx2b xAprox N;

```

OUTPUT:

Solutia aproximata prin Metoda Bisectiei a ecuatiei $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$ pe intervalul $[0, 1]$ este $x = 0.5858$.

Solutia aproximata prin Metoda Bisectiei a ecuatiei $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$ pe intervalul $[1, 3]$ este $x = 3$.


Solutia aproximata prin Metoda Bisectiei a ecuatiei $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$ pe intervalul $[3, 4]$ este $x = 3.4142$.

Exercitiul 2

Fie ecuatia $8x^3 + 4x - 1 = 0$.

c. Sa se construiasca punctele $(x_{Aprox}, f(x_{Aprox}))$ calculate la b. in acelasi grafic cu graficul functiei.

Ex_2c.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex_2c.m")




Exercitiul 3

Fie funcțiile $y = e^x - 2$ și $y = \cos(e^x - 2)$.

a. Să se construiască graficele funcțiilor.

Ex.3a.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex.3a.m")



Exercitiul 3

Fie functiile $y = e^x - 2$ si $y = \cos(e^x - 2)$.

b. Sa se implementeze in Matlab metoda bisectiei pentru a calcula o aproximare a solutiei ecuatiei $e^x - 2 = \cos(e^x - 2)$ cu eroarea $\epsilon = 10^{-5}$ pe intervalul $x \in [0.5, 1.5]$.

Ex_3b.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex_3b.m")

```
Definirea functiilor ce intra in componenta ecuatiei
y1 = @(x) exp(x) - 2;
y2 = @(x) cos (exp(x) - 2);
f = @(x) y1(x) - y2(x);

Definirea erorii de aproximare
epsilon = 1e-5;

Definirea intervalului [A, B]
A = 0.5;
B = 1.5;

Calcularea solutiei approximate prin apelarea functiei 'MetBisectie'
[xAprox, N] = MetBisectie(f, A, B, epsilon);

Salvarea valorii gasite pentru utilizari ulterioare
save aproximariEx3b xAprox N;
```

OUTPUT:

Solutia ecuatiei $e^x - 2 - \cos(e^x - 2) = 0$ pe intervalul $[0.50, 1.50]$ este $x = 1.0076$.

Exercitiul 4

Sa se gaseasca o aproximare a valorii $\sqrt{3}$ cu eroarea $\epsilon = 10^{-5}$.

Ex_4.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex_4.m")

```
Definirea functiei pentru care cautam radacina
f = @(x) x.^2 - 3;
Definirea erorii de aproximare
epsilon = 1e-5;
Definirea intervalului [A, B] in care cautam solutie
A = 1;
B = 2;

Calcularea solutiei approximate prin apelarea functiei 'MetBisectie'
[xAprox, N] = MetBisectie(f, A, B, epsilon);
```


OUTPUT:

Valoarea aproximata prin Metoda Bisectiei pentru $\sqrt{3}$ este x = 1.7320.

Exercitiul 5

Fie ecuatia $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$. Se stie ca ecuatia are solutie unica pe intervalul $[0, 2.5]$. Justificati de ce sirul generat de metoda Newton-Raphson nu converge catre solutia din intervalul dat, daca valoarea de pornire este $x_0 = 2$. Alegeti o valoare pentru $x_0 \in [0, 2.5]$, astfel incat sirul construit prin metoda Newton-Raphson sa converga spre solutia din intervalul dat.

Ex_5.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex_5.m")



$$x_0 = 2$$


Calculand derivata intai pentru functia f in capetele intervalului dat, observam ca se afla pe pante diferite ale graficului (semn opus), adica exista un punct critic intre cele doua capete.

Mai departe, pentru punctul de pornire $x_0 = 2$, a doua derivata are valoare negativa, adica pe o panta concava a graficului functiei. Asadar, tangenta dusa prin acest punct va fi deasupra graficului si va intersecte axa Ox mult in partea dreapta, iesind astfel din intervalul dat.

De aceea, aplicand Metoda Newton-Raphson pentru punctul de pornire $x_0 = 2$, solutia obtinuta $x_1^* = 3$ nu va fi cea corecta.

O metoda de verificare a punctului de pornire este:

$$\underline{f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0}$$



$$x_0 = 1$$

Alegem punctul de pornire $x_0 = 1$.

Aplicand Metoda Newton-Raphson pentru acest punct de pornire, sirul generat va converge catre solutia $x_2^* = 0.58579 \in [0, 2.5]$.

Exercitiul 6

Fie ecuatia $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$.

a. Sa se construiasca in Matlab o procedura cu sintaxa $[x_{Aprox}] = MetNR(f, df, x_0, \varepsilon)$ conform algoritmului metodei Newton-Raphson.

MetNR.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/MetNR.m")

```
function xAprox = MtNR (f, df, x0, epsilon)
```

```
xi = x0 - f(x0) / df(x0);
```

```
    Se considera conditie de oprire valoarea absoluta a functiei 'f' evaluata  
    in punctul 'xi' <= eroarea de aproximare 'epsilon'
```

```
while abs(f(xi)) > epsilon
```

```
    x0 = xi;
```

```
    xi = x0 - f(x0) / df(x0);
```

```
end
```

```
xAprox = xi;
```

```
end
```

Exercitiul 6

Fie ecuatia $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$.

b. Intr-un fisier script, sa se construiasca graficul functiei $f(x) = x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6$ pe intervalul $[0, 4]$. Alegeti din grafic trei subintervale si valorile initiale x_0 corespunzatoare fiecarui subinterval. Aflati cele trei solutii apeland procedura MetNR cu eroarea de aproximare $\varepsilon = 10^{-3}$.

Ex_6b_Rezolvare.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex_6b_Rezolvare.m")

```
Definirea functiei 'f'
Definirea derivatei intai 'df'
Definirea derivatei a doua 'ddf'
f = @(x) x.^3 -7 .* x.^2 + 14 .* x - 6;
df = @(x) 3.*x.^2 - 14 .* x + 14;
ddf = @(x) 6 .* x - 14;

Definirea erorii de aproximare
epsilon = 10^(-3);

Memorarea intervalelor de lucru sub forma de matrice 'AB'
AB = [0, 1.2; 2, 3.2; 3.3, 4];

Memorarea punctelor initiale sub forma de vector 'x0'
x0 = [1, 2.5, 3.5];

for i = 1 : length(x0)

    A = AB(i, 1);
    B = AB(i, 2);
    x = x0(i);

    Verificarea indeplinirii conditiilor necesare aplicarii metodei NR
    if verificareNR (A, B, x, f, df, ddf) == 1

        Apelarea functie 'MetNR' pentru fiecare x0 verificat
        xAprox(i) = MetNR (f, df, x, epsilon);

    end
end

Salvarea solutiilor gasite pentru utilizari ulterioare
save aproximariEx6b xAprox;
```

OUTPUT:

Solutia ecuatiei $x^3 - 7 * x^2 + 14 * x - 6 = 0$ pe intervalul $[0.00, 1.20]$ este $x = 0.5858$.

Solutia ecuatiei $x^3 - 7 * x^2 + 14 * x - 6 = 0$ pe intervalul $[2.00, 3.20]$ este $x = 2.9995$.


Solutia ecuatiei $x^3 - 7 * x^2 + 14 * x - 6 = 0$ pe intervalul $[3.30, 4.00]$ este $x = 3.4147$.

Exercitiul 6

Fie ecuatia $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$.

b. Intr-un fisier script, sa se construiasca graficul functiei $f(x) = x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6$ pe intervalul $[0, 4]$. Alegeti din grafic trei subintervale si valorile initiale x_0 corespunzatoare fiecarui subinterval. Aflati cele trei solutii apeland procedura MetNR cu eroarea de aproximare $\varepsilon = 10^{-3}$.

Ex_6b_Grafic.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex_6b_Grafic.m")



Exercitiul 7

Fie ecuatia $8 \cdot x^3 + 4 \cdot x - 1 = 0$.

b. Sa se calculeze x_2 prin metodele Newton-Raphson, Secantei si Pozitiei False.

Ex_7b.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex_7b.m")

```

Definirea functiei 'f'
Definirea derivatei intai 'df'
Definirea derivatei a doua 'ddf'
f = @(x) 8 .* x.^3 + 4 .* x - 1;
df = @(x) 16.*x.^2 + 4;
ddf = @(x) 32 .* x;

Definirea erorii de aproximare epsilon = 1e-3;

Definirea intervalului [A, B]
A = 0;
B = 1;

Definirea punctului initial 'NRx0'
NRx0 = 0.5;
Aplicarea Metodei Newton-Raphson pentru valoarea initiala aleasa
x1NR = NRx0 - f(NRx0) / df(NRx0);
x2NR = x1NR - f(x1NR) / df(x1NR);

Definirea punctelor initiale 'Sx0' si 'Sx1'
Sx0 = 0;
Sx1 = 1;
Aplicarea Metodei Secantei pentru punctele initiale alese
x2S = (Sx0 * f(Sx1) - Sx1 * f(Sx0)) / (f(Sx1) - f(Sx0));

Apelarea Metodei Pozitiei False pentru intervalul ales
x0PF = (A * f(B) - B * f(A)) / (f(B) - f(A));
if f(A) * f(x0PF) < 0
    B = x0PF;
else
    A = x0PF;
end
x1PF = (A * f(B) - B * f(A)) / (f(B) - f(A));

if f(A) * f(x1PF) < 0
    B = x1PF;
else

```

```
A = x1PF;  
end  
x2PF = (A * f(B) - B * f(A)) / (f(B) - f(A));
```

OUTPUT:

Solutia x_2 aproximata prin Metoda Newton-Raphson a ecuatiei $8 \cdot x^3 + 4 \cdot x - 1 = 0$ pe intervalul $[0.00, 1.00]$ este $x = 0.2250$.

Solutia x_2 aproximata prin Metoda Secantei a ecuatiei $8 \cdot x^3 + 4 \cdot x - 1 = 0$ pe intervalul $[0.00, 1.00]$ este $x = 0.0833$.


Solutia x_2 aproximata prin Metoda Pozitiei False a ecuatiei $8 \cdot x^3 + 4 \cdot x - 1 = 0$ pe intervalul $[0.00, 1.00]$ este 0.1685 .

Exercitiul 8

Fie ecuatia $x^3 - 18 \cdot x - 10 = 0$.

a. Intr-un fisier script, sa se construiasca graficul functiei $f(x) = x^3 - 18 \cdot x - 10$ pe intervalul $[-5, 5]$.

Ex_8aSecantei.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex_8aSecantei.m")




Solutii aflate prin Metoda Secantei

Exercitiul 8

Fie ecuatia $x^3 - 18 \cdot x - 10 = 0$.

a. Intr-un fisier script, sa se construiasca graficul functiei $f(x) = x^3 - 18 \cdot x - 10$ pe intervalul $[-5, 5]$.

Ex_8aPozFalse.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex_8aPozFalse.m")



Solutii aflate prin Metoda Pozitiei False

Exercitiul 8

Fie ecuatia $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$.

b. Sa se construiasca in Matlab o procedura cu sintaxa $[x_{Aprox}] = MetSecantei(f, A, B, x_0, x_1, \epsilon)$ conform algoritmului metodei secantei.

MetSecantei.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/MetSecantei.m")

```
function xAprox = MetSecantei(f, A, B, x0, x1, epsilon)

    Mai intai se verifica existenta unei solutii in intervalul [A, B]
    prin aplarea functiei 'verificareIntersectie0x'
    if verificareIntersectie0x (A, B, f) == 1

        Se considera conditie de oprire valoarea absoluta a functiei 'f' evaluata
        in punctul 'x' <= eroarea de aproximare 'epsilon'
        while abs(f(x1)) > epsilon
            x = (x0 * f(x1) - x1 * f(x0)) / (f(x1) - f(x0));
            x0 = x1;
            x1 = x;
        end
        xAprox = x;
    else
        return;
    end
end
```

Exercitiul 8

Fie ecuatia $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$.

c. Sa se construiasca in Matlab o procedura cu sintaxa $[x_{Aprox}] = MetPozFalse(f, A, B, \varepsilon)$ conform algoritmului metodei pozitiei false.

MetPozFalse.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/MetPozFalse.m")

```
function xAprox = MetPozFalse(f, A, B, epsilon)
```

```
    Mai intai se verifica existenta unei solutii in intervalul [A, B]  
    prin aparea functiei 'verificareIntersectie0x'
```

```
if verificareIntersectie0x (A, B, f) == 1  
    x = (A * f(B) - B * f(A)) / (f(B) - f(A));
```

```
    Se considera conditie de oprire valoarea absoluta a functiei 'f' evaluata  
    in punctul 'x' <= eroarea de aproximare 'epsilon'
```

```
    while abs(f(x)) > epsilon  
        if f(A) * f(x) < 0  
            B = x;  
        else  
            A = x;  
        end  
        x = (A * f(B) - B * f(A)) / (f(B) - f(A));
```

```
    end
```

```
    xAprox = x;
```

```
else
```

```
    return;
```

```
end
```

```
end
```

Exercitiul 8

Fie ecuatia $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$.

d. Alegeti din grafic trei subintervale si aflati solutiile apeland procedura MetSecantei cu eroarea de aproximare $\varepsilon = 10^{-3}$. Construiti punctele $(x_{Aprox}, f(x_{Aprox}))$ pe graficul functiei.

Ex_8d.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex_8d.m")

```

Definirea functiei 'f'
f = @(x) x.^ 3 - 18 .* x - 10;

Memorarea intervalelor de lucru sub forma de matrice 'AB'
AB = [-5, -3; -2, 1; 3, 5];

Memorarea punctelor initiale sub forma de vectori 'x0' si 'x1'
x0 = [-4, -2, 3];
x1 = [-3, 0, 5];

Declararea erorii de aproximare a solutiei 'epsilon'
epsilon = 10 ^ (-3);

for i = 1 : length(x0)

    Apelarea functiei 'MetSecantei' pentru fiecare interval si valorile
    initiale corespunzatoare
    xAprox(i) = MetSecantei (f, AB(i, 1), AB(i, 2), x0(i), x1(i), epsilon);
end

Salvarea solutiilor gasite pentru utilizari ulterioare
save aproximariEx8d xAprox;

```

OUTPUT:

Solutia aproximata prin Metoda Secantei a ecuatiei $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$ pe intervalul $[-5.00, -3.00]$ este $x = -3.9315$.

Solutia aproximata prin Metoda Secantei a ecuatiei $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$ pe intervalul $[-2.00, 1.00]$ este $x = -0.5656$.

Solutia aproximata prin Metoda Secantei a ecuatiei $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$ pe intervalul $[3.00, 5.00]$ este $x = 4.4971$.

Exercitiul 8

Fie ecuatia $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$.

e. Alegeti din grafic trei subintervale si aflati solutiile apeland procedura **MetPozFalse** cu eroarea de aproximare $\varepsilon = 10^{-3}$. Construiti punctele $(x_{Aprox}, f(x_{Aprox}))$ pe graficul functiei.

Ex.8e.m ("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/Ex.8e.m")

```

Definirea functiei 'f'
f = @(x) x.^ 3 - 18 .* x - 10;

Memorarea intervalelor de lucru sub forma de matrice 'AB'
AB = [-5, -3; -2, 1; 3, 5];

Declararea erorii de aproximare a solutiei 'epsilon'
epsilon = 10 ^ (-3);

for i = 1 : length(AB)

    Apelarea functiei 'MetPozFalse' pentru fiecare interval
    xAprox(i) = MetPozFalse (f, AB(i, 1), AB(i, 2), epsilon);
end

Salvarea solutiilor gasite pentru utilizari ulterioare
save aproximariEx8e xAprox;

```

OUTPUT:

Solutia aproximata prin Metoda Pozitiei False a ecuatiei $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$ pe intervalul $[-5.00, -3.00]$ este $x = -3.9314$.

Solutia aproximata prin Metoda Pozitiei False a ecuatiei $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$ pe intervalul $[-2.00, 1.00]$ este $x = -0.5656$.

Solutia aproximata prin Metoda Pozitiei False a ecuatiei $x^3 - 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 6 = 0$ pe intervalul $[3.00, 5.00]$ este $x = 4.4971$.

Functii de verificare

Urmatoarele functii au fost folosite pentru verificarea indeplinirii conditiilor necesare aplicarii celor patru metode de aproximare a solutiei unei functii.

verificareApartenentaSolutie.m

("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/verificareApartenentaSolutie.m")

verificareConvergenta.m

("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/verificareConvergenta.m")

verificareIntersectieOx.m

("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/verificareIntersectieOx.m")

verificareNR.m

("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/verificareNR.m")

verificarePantaInterval.m

("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/verificarePantaInterval.m")

verificarePunctCritic.m

("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/verificarePunctCritic.m")

verificareX0_NR.m

("Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/verificareX0_NR.m")

Stilizare Plot

Pentru stilizarea aspectului figurilor plotate, am creat o paleta de culori 'wesColors.m', pe care am salvat-o sub forma de matrice 'wesColors.mat' pentru a folosi culorile definite in orice script.

wesColors.m

```
( "Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/wesColors.m" )
```

```
greyishTeal = [0.463 0.627 0.541];
greenishBeige = [0.808 0.804 0.482];
dullOrange = [0.8 0.545 0.235];
brownish = [0.639 0.369 0.376];
reddishGrey = [0.584 0.478 0.427];
gunMetal = [0.271 0.388 0.333];
paleGold = [0.988 0.82 0.42];
silver = [0.827 0.867 0.863];
pinkishGrey = [0.776 0.694 0.616];
sand = [0.859 0.694 0.396];
pinkishTan = [0.871 0.694 0.545];
pine = [0.18 0.376 0.29];
dark = [0.153 0.133 0.235];
fadedRed = [0.82 0.212 0.184];

wesColors = [greyishTeal; greenishBeige; dullOrange; brownish;
    reddishGrey; gunMetal; paleGold; silver; pinkishGrey; sand;
    pinkishTan; pine; dark; fadedRed];

save wesColors wesColors;
```

wesColors.mat

```
( "Tema#1_Maciuca_Gloria_Grupa344/wesColors.mat" )
```