

Dyp venetrombose (DVT)

Bakgrunn

Trombedannelse kan skyldes endringer i blodets sammensetning, i venevegg eller i blodets strømningsforhold (Virchows triade). Mange tromboser er subkliniske og forblir uoppdagede. Risikofaktorer for DVT er:

- **Medfødt disposisjon.** Arvelige defekter i koagulasjonssystemet (mangel på antitrombin, protein C eller protein S, resistens mot aktivert protein C). Trombofili. Antifosfolipidsyndrom. Obs – familiehistorie: Førstegradsslektning med trombose før fylte 50 år?
- **Immobilitet.** Lang flyreise. Langvarig sengeleie/ immobilisering.
- **Livsstil.** Fedme. Røyking.
- **Hormonforandringer.** P-piller. Postmenopausal hormonsubstitusjon. Graviditet og barseltid.
- **Reaktive.** Hypertensjon. Nylig gjennomgått operasjon eller traume. Kreftsykdom. Hjertesvikt. Hjerneslag. Forekomst av lupusantikoagulant eller fosfolipidantistoffer.
- **Alder**
- **Tidligere venøs tromboembolisme**

Symptomer og funn

Smerter, hevelse, rødme og temperaturøkning på affisert side. Palpatorisk ømhet i tykkleggen. DVT i bekkenet kan gi betydelig smerte i hofteregionen og hevelse i lår eller ankel.

Supplerende undersøkelser

- **D-dimer.** Hvis tilgjengelig. Ved liten klinisk sannsynlighet for DVT og negativ D-dimer kan DVT så godt som utelukkes.
- **Wells modifiserte sannsynlighetskår for DVT**

Tegn	Skår
Kreftsykdom (under behandling, behandling siste 6 md. eller palliativfase)	1
Paralyse/parese underekstremitet, ev. nylig gipset underekstremitet	1
Immobilisering i >3 dager eller kirurgi i løpet av de siste 3md.	1
Lokal ømhet langs området til det dype venesystemet	1
Hevelse i hele underekstremiteten	1

Legghevelse >3 cm sammenliknet med asymptomatisk side (måles 10cm under tuberositas tibiae)	1
Pitting ødem, hvis mest uttalt på aktuell side	1
Dilatasjon av overflatiske vener på aktuell side (ikke varikøse)	1
Tidligere dokumentert DVT	1
En alternativ diagnose er mer sannsynlig enn DVT	-2
Total Wells skår (sum)	
Tolkning:	
DVT sannsynlig	≥2
DVT ikke sannsynlig	0–1

Differensialdiagnoser

- [Overflatisk tromboflebitt](#)
- [Erysipelas](#)
- Akutte bløtdelsskader
- [Arteriell emboli](#)
- Bakers cyste (rumpert)
- Muskelbrist
- Posttrombotisk syndrom etter tidligere gjennomgått DVT

Tiltak

- **Innleggelse.** Pasienten innlegges for videre diagnostikk og behandling.

Komplikasjoner

[Lungeemboli.](#)